





Smithsonian  
Institution  
Libraries

Purchased from


CULLMAN  
ENDOWMENT











De pelle melleina 3ij diaphanibis magnis  
Ex transfusarij an 3ij m  
resine pini 3ij argenti vivi parat 36<sup>e</sup> synabry  
3ij sublimat 3ij m p<sup>r</sup> empl<sup>m</sup>.

Item plantaginis 2 appi an bl vol cam  
ell<sup>e</sup> p<sup>r</sup> 3ij 3ij resin<sup>e</sup> 3ij terobentim<sup>e</sup> 3ij  
mell<sup>e</sup> 3ij farine ordei 3ij // unguent<sup>e</sup> vt dicit

Recepte que por faire bon<sup>e</sup> bonne p<sup>r</sup>sechoison. A  
faire que id<sup>e</sup> ay<sup>e</sup> remeison rectitude de filation  
et commutation de beine.

noti q<sup>ue</sup> resolution test question d<sup>i</sup>mmen<sup>e</sup> en l<sup>e</sup>yeu

Si nomen pueri quid sit sciret  
 Virum p. m. co. cognovisset

*Ex libro N. m. l. m. f. m. t.*

# HISTORIA PLAN-

TARVM ET VIRES EX  
DIOSCORIDE, PAVLO AEGI-  
NETA, Theophrasto, Plinio, & recetio-  
ribus Græcis, iuxta elementorū ordinē.

PER CONRADVM GES-  
nerum Tigurinum.

Adiecta ad marginē nomenclatura, qua  
singulas herbas officinæ, herbarij, &  
vulgus Gallicum efferre solent.



PARISIIS

Apud Ioannem Lodoicum Tiletanum,

1541.

# HENRICO BILLINGO

Conradus Gesnerus.

S. D.

E. GO QUIDEM satis gnarus, Henrice charissimè, in quibus quantisq; negotiorum hoc imprimis tempore verferis, haud temperare tamè mihi potui, quin qualicumq; tandem indicio meum in te amorè, qui hætenus pectore latuit, palàm profiterer. Quod cū in præsentia qua fieret alia ratione non haberè, quod habui solum, superioribus diebus plantarum mihi congestam historiam ad te mittere volui. Aequissimū enim tibi ut ascriberetur existimaui, non modò tuorum erga me officiorum nomine, quāvis id maxime: sed etiam quod cum studiosorum omnium amator & admirator sis vnicus, occasionem tibi quoq; sine meliorum literarum lectione vllam effluere nō patiaris, comprimis quidem sacrarum, post quas, ut nec alios bonos authores, ita neque medicos inspicere aliquando piget. Accessit alia causa hæc tibi nuncupandi, ut si luctu nimio premerè tristioris sortis, qua te tuosq; per familię vestrę funera nuper exerceri Deo visum est, iucundiore hoc, si possem, argumento, inde auocarem. Huc facit etiam fortuna sua (quam hinc non ut vulgus, sed prouidentia



diuinæ œconomam, seu promā condāmque accipio) quę cū tibi hortos & prædia donaue- rit amplissima, simul agriculturæ & planta- rum studiū iniecit, quo quidē ipso inter ne- gotiosa huius vitę studia, vix dici vllū potest bonis viris coniunctius familiariúsq;. Philo- sophi quidem inter alia liberalisanimi signa recēsent, animalibus delectari, præcipuē pul- chri quippiā mirandiq; habentibus, idq; iu- cunditatis solum gratia. Ego verò longē ma- gis collaudauerim, qui pulcherrimis plantis ac peregrinis oblectantur. Nam & liberalitas in huiusmodi existit, qui dum non suæ, sed cōmunis vtilitatis rationem habent, sumpti- bus nullis parcunt, vndecūq; terrarum plan- tis peregrinis, pulchris, admirandis, iucūdis, salubribus, arboribus, fruticibus herbis ex a- lieno orbe magno studio, magnis sumptibus conquisitis, ornando ditandóque nostrū. Sed iam nostrę plantarū historiæ, vel potius tuę, rationē tibi explicabo. Cū superioribus men- sibus suauissimā patriam Tigurū inuisissem, salutandi gratia semel atq; iterū doctissimū virū Christophorum Clauserū vrbis nostræ archiatrum accessi. is cum varia colloquenti- bus nobis, medicinæ studiosis rem vtilem fa- cturū diceret, si quis simplicium medicami- num è Dioscoride quidem descriptiones, fa- cultates autē ex Aegineta cōscriberet: placuit mihi tum id cōsiliū, & iam prius in mentem

sæpe venerat . Mox igitur non hoc solū præ-  
stare conatus sum , sed ordinē alphabeti secu-  
tus , reliqua etiam Simplicia adieci , quę Dio-  
scoridi omiſsa in frequēti sunt ac celebri hu-  
ius temporis medicorum vſu , barbaris mon-  
strata primū , & à recentioribus Gręcis in suā  
linguā transfuſa , à quibus ego huc transcri-  
pſi , doctiſſimi viri Ruellii interpretatione  
plerunq; vſus . Fuit autem præcipuū ſcribendi  
inſtitutū , vt ſtudioſi medicinæ enchiridion  
haberent circumlatu facillimum , etiam ruri ,  
Dioscoride quem antehac circūferebatur , bre-  
uius , melius , locupletius , & quoniam ordina-  
tim ſcriptum commodius , laborioſo inquire-  
di tædio vacans , mole nulla , nō omiſſis mul-  
tis aliis præclaris apud Arabes medicinis ſim-  
plicibus . Melius autē dixi , quod ex Agineta  
plerunq; ( qui Galeni compendiū eſt , aut vt  
alii loquuntur , ſimia ) nonnunquam ex ipſo  
Galeno , aut Aëtio facultates aſcripſerim in  
genere primas , ſecundas , & tertias , vt illi vel  
omnes vel aliquas tantum memorauerunt .  
Hoc autē , priores dico & vniuerſales ceu par-  
ticulariū virtutum fontes quosdam deſcribere ,  
rationalis tātum artificis eſt : particulares  
verò tradere , magis empirici . Præterea ex his  
quidem generalia inuenire difficillimū : ex  
generalibus verò alias omnes inde manan-  
tes , cuius exercitato in Galeni methodo fa-  
cile fuerit . Porro hic ſolum plantarum hi-

storiā mitto , vt quā minimū sit enchiridion, & ruri præcipuè commodissimū. Mit tam proximis diebus reliqua etiam, quæ præter plātas sunt simplicia. in Marginibus Germanica, sicut Græca, non addidi, quod aliū, vt nosti, ex professo scripserim librū de plantarum nomenclaturis, nostra, Gallorū, Græcorum, & Romanorū linguis, sed nudis nominibus absq; viriū & ipsarum descriptionis historia. Liberet de aliis pluribus in primis vero pulcherrimi liberalissimiq; plantarum studii laudibus te affari, nisi vitio mihi dandum metuerē, quod breui libello promisso longiorem quā pro eius portione, neq; de necessariis rebus epistolam præfixissem: quāobré nihil amplius addam, quā vt animo, quo soles omnia, candidissimo his acceptis à Conrado tuo mortaliū omnium tui amantissimo, maiora in posterū expectes. Vale. Christus Opt. Max. te cum grauissimo viro patre tuo in Reipub. & bonorum studiorum salutem, incolumem quā diutissimè tucatur. Iterum vale. Lausannæ. i x. Augusti.

A. iii

# INDEX.

## A

<b>A</b> Gasyllis	14.28	Balsamum	33.6
Agnus	256.24	Barbula hirci	34.25
Alcibiadiō	17.23	Barba senilis	10.22
Alus	228.12	Bathypicron	2.6
Amaracus	180.29	Bdellium	34.29
Amaranton	91.20	Bellis	35.15
Anchusa	139.6.& seq.	Bellius	ibidem
Anarrhinon	22.5	Beta	35.18
Anaxyris	131.24	Betula	36.14
ανδραχνη ἀγρία	125.8	Betonica	35.28
Anthericon	114.27	Blattaria	39.27
Antirrhinon	22.5	Blitum	37.2
Anthyllion	13.23	Boleti	37.4
Antimalum	147.11	Botrys	37.16
Apiastrum	22.29	Bolchon	34.29
Arrhenogonum	187.21	Brassica	37.18
Aronia	151.16	Brassica	23.31
Arcturon	25.10	Bryon	56.10, & 158.13
Ascyroides	28.18	Bryonia	257.8
Asparagus	29.19	Brytanica	38.16
Astragalus	30.18	Bucheides	216.29
Atractylis	30.29	Bucinus	85.22
Atriplex	31.	Buglossus	38.22
Auena	31.10	Bulbina	39.2
	<b>B</b>	Bulbus esculentus	39.10
<b>B</b> Accharis	32.5	Bulbus vomitorius	39.15
Ballote	32.26	Belapathum	38.29
Balaustium	32.18	Bunium	39.22

# INDEX

Buphthalmum	40.6	Centunculus	71.6
Bupleurum	40.14	Chamaeact	212.26
Buselinum	41.3	Chamaecisso	57.6.64.14
Butomus	40.21	Chamaedrys	57.21.
Buxus	41.6	& 252.7	
C		Characias	246.13
CAcalia	41.11	Chironium	91.19
Caetus	41.22	Chrysanthemon,	ibide
Calamintha	42.17	Chrysolachanos	31.7
Calamus odoratus,	41.23	Cibotion	96.23
Calathiana	42.1	Cici	205.29
Calcifraga	42.9	Cichorion	60.27
Cachla	40.6	Circæa	147.13
Caltha	41.10.61.13	Citharon	69.13
Calthula	42.17	Cissaron	69.12
Calyx	17.17	Cissanthemon	64.4
Cammoron	5.21	Cissophyllon,	ibidem
Cancamon.	43.21	Clematitis	27.16
Canaria	43.6	Colocynthis	65.9
Cannabis	43.16	Coris	78.12
Canna Indica	51.3	Coriandrum	78.2
Canopon	44.11	Cornus	78.20
Cantabrica	44.12	Conferua	77.6
Caphura	44.20	Confiligo	77.12
Cardamina	230.3	Conuoluolus	77.24
Carnabum	27.2	Conyza	77.28
Carnabadium	ibidem	Corianum	78.2
Cassitas	51.22	Coronopus	79.2
Cedria	52.29	Corruda	29.21
Cedrides	53.9	Costus	29.8

# INDEX

Cotonea	80.1	Daucus	84.20
Crataegonum	80.4	Dictamnus	85.25
Crithmum	80.13	Delphinium	85.11
Crocodilion	82.28	Dicoccos	261.1
Crocus	81.7	Diospyros, vel diosporos.	
Cromphena	229.15	86.14	261.1
Croton	205.29	Dipsacus	86.17
Cucurbita	81.1	Dodecatheos	86.30
Cucumis	81.4	Dolichi	186.25
Cuminum	83.4	Donax	114.15
Cunila	77.28	Dorias	90.17
& 84.6, 170.7		Dorycnion	87.5
Cunilago	77.28	Dorypetron	136.6
Cupressus	83.27	Draba	25.1, & 87.23
Cymbalion	258, 20	Dracunculus	87.31
Cynocrabe	23.21, & 67.1	Dryophonum	88.16
Cynoctonon	6.2	Dryopteris	88.25
Cynomoron	24.2	Dulcis radix	89.1
Cynofarchis	169.5	E	
Cyparissias	246.10	EBenus	89.14
Cyrtinus	69.20	Ebulus	212.3
D		Elate	91.9, & 175.20
Dactylitis	27.9	Elaterium	81.20
Damascena	197.30	Elelisphacon	212.8
Damasoniõ, 10.23, & 85.1		Eleophyllum	187.15
Daphnitis	50.17, zikir	Eruca sylvestris	95.27
cognomine	cod.	Erysiceptron	29.6
Daphnoides	70.23,	Erytranon	69.23
& 77.30		Erytrodanum	208.1
Darca	50.23	Erythros	205.12



# INDEX

Erythronium ccxv, xxvi

## F

Faba pontica xcix.xi

Foeniculum sylvestre.

cii.xiii

Fumaria xlv.xix

## G

Gethyllis cviii.xx

Gethyon cviii.vi

Gladiolus cx.vii

Glandes Iouis, cx.xxiii

Glycyfide clxxiii.xviii

Gnochiles xvii.xxiii

Gordylon, cxxiii.xviii

## H

Halicacabō, ccxxxiii.3

Hedysaron, ccxxi.ii

Heliotropion cxvi.xiii

Helioscopius, ccxvi.ix

Helix cxv.viii

Hemionium, xxix.xxix

Heraclea ccxxvii.vi

Heraclia cxvii.viii

Herba pedicularis 237.11

Hippuris xciii.xxiii

Holoscœnos, cxxviii.x

Hypocistis lxix.xxiii

## I

Ibiscus xxx.xx

Illecebra ccxxv.viii

Incana

cxxv.xx

Irio

cxxvi.xiii

Iūcus Babylonius, 128, 21

Ixia

lvii.xxv

## L

Lachryma Aethiopica,

cxvi.vi

Lactoris cxxix.xviii

Lapathum cxxxi.xxiii

Lasar cxxxii.xii

Lepidion cix.xiii

Leontice xli.xi

Liceron cxxxvi.vi

Ligustrum cxl.xvi

Lilia cxl.vii

Limnesion liii.x

Limonion cxli.v

Lingua cxli.xix

Linozostis cli.i

Linum cxli.xvi

Lithospermon cxlii.v

Lolium cxlii.xviii

Lonchitis cxlii.xxi

Lopima cx.xxiii

Lotus cxliii.viii

Lupinus sativus cxliiii.x

Lupha xxvii.xxii

Lupus salictarius, 144.20

Lutea cxlv.vi

Lycoctonon vii.ii

# INDEX

Lychnis sylvest.	137.25	Melittæna	xxii,xxviii
Lychnitis	cclv.xvi	Mentha	cl.xx
Lygos	ccclvi.xxxiii	Menthastrum	ibidem
Lyfimachia	cxli,xx	Menthastra,	xlii,xxiii
Lythron	ibidem.	Meon	clii,i
M		Mespilus	cli.xvi
<b>M</b> Acer	cxlv,xii	Millefolium	cliii,xiii
Macheronion,	cx.vii	Milium	cliii.i
Machis	clviii.ii	Milium Indicum,	ibidē
Madelcon	xxxiii,xxx	Miliaria herba	clii,xxv
Magudaris	cxxxii,xxiii	Myos ota	xiii,xxiii
Malabathrum	cxlv,xx	Mioctonum	v.xxi
Malumpunicū,cxcix,xvi		Mithridation	clvi,xi
Mala,146,23, pſica,184		Mollugo	clvii,vi
Malacocissus	cxlvi,ix	Moly	clii,xxiii.ccx,v8
Malua	cxlvi,xiii		clvi,xxi
Mamiras	cxlvii.vi	Molybdæna	clvii,i
Mannathuris	ccxliiii,v	Morus	clvii,vii
Mandragora	cxlvii,xi	Moschocaryon	clvii,xvi
Marrubium	cxlix,i	Mosyliti	lxv,vi
Marrubiū nigrum,32.26		Muris auricula	xxxi,xxi
Marum	cxlix,xii	Muscus	clviii,xiii
Mastiche	cxxxv,viii	Muscus marinus,	ibidem
Maspeton	cxxxii.viii	Myagrus	clii,x
Medica	cxlix,xx	Myles	clii,xxi
Medion	cl.i	Myofotis	xxi.
Melampodion,	ccliiii.x	Myrsinoides	lxx,xxiii
Melampus	eodem	Myrrha	cliii,iii
Melampyron	clii.x	Myrica	cliii,xx
Melissophyllō,xxii,xxix		Myristica	clvii,xxiii

# INDEX

Myriophyllum cliii,xiii  
 Myrepfica clvii,xviii  
 Myrsinities ccxlii,viii  
 Myrtacantha ccix,xiii  
 Myrtidanum, clv,xxiii  
 Myrrhis clv,xv  
 Myrt<sup>9</sup> syluestris ccix,xiii  
 Myrtus satua clv,xxi  
 Myxa clvi,xiii

N

Nacaphthum clix,iii  
 Napi 158,26.&229,19  
 Narcaphthum clix,iii  
 Narcissus clix.xi  
 Nardus clix,xxiii  
 Nardū syluestre xxviii.vi  
 Nastos cxiii,i  
 Nasturtium clx,ix  
 Nepa ccxx,iii  
 Nepeta xlii,xx  
 Nerion clxii,xvi  
 Nigella clxii,xxviii  
 Nux Indica clxiii,xi  
     pontica cxxxv.viii  
 Nuceauellanae 163,23  
     iuglandes ibidem  
 Nymphæa clxii,xxvii

O

Ocimum clxv,iii  
 Ocimoides,clxiii,25

Oenanthe clxv,xi<sup>x</sup>  
 Olea, clxvi,i  
 Ocimastrum clxiii,xxv<sup>i</sup>  
 Onagra clxvi,xxi  
 Onitis clxx,xii  
 Onobrychis clxvi,xxx  
 Onoclia xvii,xviii  
 Ononis xx,xxvi  
 Onosma clxvii,viii  
 Onothera clxvi,xxi  
 Onuris ibidem  
 Ophioscorodon xi,xxvi  
 Opium clvii,viii  
 Opopanax clxvi,xi  
 Opulus clxviii,xxv  
 Oreoselinum clxix,xxvi  
 Origanum clxx,viii  
 Ornithogalum clxxi,xi  
 Orneoglosson clxxi,i  
 Ornus clxxi,xx  
 Orobanche clxxii,xiii  
 Oryza clxx,xxvi  
 Osyris clxxii,xxiii  
 Osteocollon clxxiii,i  
 Othonna clxxiii,x  
 Oxalis cxxxiii,xxiii  
 Oxya clxxiii,xxx  
 Oxyx clxxiii, xviii  
 Oxylapathū cxxxi,xix  
 Oxymyr sine ccix,xiii

# INDEX

<b>P</b>		<b>Periclymenon</b>	181.19
<b>PAederota</b>	3.30	<b>Peristereon</b>	183.7
<b>Pæonia</b>	174.18	& 211.18	
<b>Paliurus</b>	175.11	<b>Persea</b>	183.17
<b>Palma</b>	175.20	<b>Perficæ</b>	183.29
<b>Panacea</b>	139.29	<b>Persion</b>	235.13
<b>Panaces Asclepiō</b>	177.18	<b>Personata</b>	184.4
<b>Heraclion</b>	170.18	<b>Pes gallinaceus</b>	45.29
<b>Panaces</b>	177	<b>miluinus</b>	114.11
<b>heracleum</b>	176	<b>Petasites</b>	184.14
<b>Pancratium</b>	178.10	<b>Petilius</b>	184.21
<b>Panicum</b>	178.16	<b>Peroselinum</b>	184.30
<b>Papauer</b>	178.20	<b>Peuce</b>	129.1
<b>Papyrus</b>	180.20	<b>Peucedanum</b>	185.9
<b>Pardalianches</b>	5.20	<b>Phalangium</b>	186.6
<b>Paralius</b>	146.9	<b>Phalangites</b>	ibidé
<b>Paronychia</b>	180.23	<b>Phalaris</b>	186.17
<b>Partheniō</b>	117.8 & 180.2	<b>Phascon</b>	56.10
<b>Pastinacia</b>	181.4	<b>Phasgonon</b>	110.7
<b>Pecten</b>	228.18	<b>Phascelli</b>	186.25
<b>Pelecinus</b>	221.2	<b>Phasiolon</b>	127.21
<b>Pepanus</b>	199.7	<b>Phasioli</b>	186.25
<b>Peplion</b>	381.18	<b>Phellandrium</b>	187.3
<b>Peplis</b>	181.17	<b>Philetæria</b>	194.13
<b>Peplos</b>	181.28	<b>Phlomidès</b>	255.15
<b>Pentameron</b>	174.28	<b>Phloön</b>	188.4
<b>Pentoboron</b>	174.18	<b>Phlox &amp; phlogion</b>	219
<b>Pepon</b>	182.9	<b>Phlum</b>	188.13
<b>Perdicium</b>	117.8	<b>Phoenix</b>	175.20
<b>Pericarpum</b>	182.14	<b>Phormio</b>	188.22

# INDEX

Phragmites, seu uallato- ria 114.15		Polygonoides	70.25
Phu	189.7	Popul' alba nigra	196.10
Phyllitis	187.6	Porrum	196.17
Phyllum	187.15	Portulaca syluest.	181.18
Phyrama	15.4	Poterium	196.2
Phyteuma	187.29	Pothos	107.1
Picea	189.23	Potamogeton	196.24
Picris	222.24	Prunum	197.24
Pinus	189.24	Pfura	198.6
Piper	200.14	Psyllion	198.10
Pisum	202.19	Ptarmica	198.19
Pistacia	202.7	Pulegium	198.30
Pistulochia	202.14	Pulmonaria	199.7
Pithyantes	7.4	Pycnocomon	200.60
Pityides	200.3	Pyrethrum	201.22
Pityusa	193.4	Pyrina	7.3
Plantago	193.13	Pyrum	202.3
Platanus	194.4.	Q	Vercus 200.1
Platyphyllos	96.24		
247.28		Quinquefolium	199.28
Plumbago	157.1	R	
Polemonia	154.13	R Adicula	200.18
Polium	195.28	R Radix	200.22
Polycnemon	194.23	Ranunculus	201.12
Polygonatū	195.4	Rapum	201.30
Polygonium	173.3	Refina liquida	202.14
Polygonū 195.19, 213 18		Rha	204.1.18
Polygala	194.29	Rhamnus	204.11
Polytrichon	195.26	Raphanus	206.23
		Rhaponticum	204.18

# INDEX

Rheum	ibidem	Satureia	ccxvii.iii
Rhæas xx.xx & clxxvii.		Satyrrium	ccxv.xix
xxvii.		Satyrion basilicū	ccxvi.iii
Rhodia radix	ccv.v	Saxiphraga, seu faxiphra-	
Rhododendron	clxii.xv	gos	ccxvi.xviii
Rhus	ccv.xii	Scammonia	ccxvii.xix
Recinus	ccv.xix	Scandix	ccxviii.xxi
Rodora	ccvi.i	Sciiffima	clxxiii.i
Rosa	cclxxvi	Scorpius	ccxx,iii
Rosmarinus	cclx.xix	Scorpioides	ccxix,xxviii
& cclxx.xix		Scorpiurum	cxvi.xv
Rubus canis	ccviii.xvii	Scolopédriō	xxix.xxviii
Rubus.Idæus	Ibidem	Scolymon	xlvi,xi
Rufcus	ccix,xiii	Scopa regia	ccxviii,xxix
S		Scordium	ccxix,xiii
Abina	ccxi.i	Scorodoprasum	ccxx,xvi
Sacra herba	ccxi.x	Scylla	ccxviii,xxvi
Sagapenum	ccxi.vii	Secale	ccxx.xxv
Saliunca	clx.xxx	Securidaca	ccxxi,ii
Salix	ccxii.i	Selago	ccxxi,xii
Saluio	ccxii.viii	Semperuiuum	ccxxi,xvi
Sambucus	ccxii.i	Seuecio	ccxxii,xiii
Samsuchus	ccxiii.vii	Serapias	clxix, xiii
Sanguinaria	ccxiii,xviii	Serpillum	ccxxiii,ii
Santalum	cuxiii.v	Seris lx, 27, ccxxii, xxiii	
Santonicum absinthium		Sertula campana	cl,xiii
cc.xxiii		Sesama	ccxxiii,xviii
Sarcocolla	ccxiii.xxv	Sesamoides	ibidem
Sardoa vel sardonias		Seseli creticum	ccxxiii,
ccxv.iii.		xiii,	



# INDEX

māssiliense	ibidem	Stachys	ccxxxvi, xxvii
Seutlomalachō	ccxxv, xii	Staphis agria	ccxxx, xi
Side	ccxxvi, x	Staphyodendros	237, 6
Sideritis	ccxxvi, xvii, cxvii, viii	Sthœcas	ccxxxviii, xxi
Siler	ccxxvii, xix	Schœbe	ccxxxviii, xiiii
Siligo	ccxxviii, ii	Stratiotes	ccxxxviii, 28
Siliqua	ccxxviii, ix	Struthium	cc, xviii
Silphion	cxixii, vi	Styrax	ccxxxvii, xix
Silibos	ccxxvii, xxvii	Sycaminus	ccxxv, xvii
Sinapi	ccxxix, xix	Sycomorus	ibidē
Siō	cxixii, xxi, ccxxx, iii	Symphona	ccxxix, xv
Sium	ccxxx, xxii	Symphyton petraon	ccxxviii, xii
Siler	ccxxix, xxv	Syringias	cxiiii, xiiii
Sison	ccxxx, xv	T	
Sisymbrium	ccxxix, xxix	TAlantium	clxxiii, iiii
Smilax	ccxxx, xxv	Tamarix	cliii, xx
Smyrniū	ccxxxii, viii	Taxus	ccxxx, xxv
Solanum	237.27 & seq.	Telephium	ccxxxix, xxi
Somphus	ccxxxiii, ix	Terebinthus	ccxl, vi
Sonchus	ccxxxiii, xviii	Teriophonon	v, xxi
Sorba	ccxxxiii, xxv	Testiculus	clxix, v
Spanacia	ccxxxv, iiii	Teucrion	ccxl, xv
Sparganion	ccxxxv, vii	Tapfia	ccxl, xxviii
Spartion	ccxxxv, xiii	Talietron	ccxl, xxi
Spatha	clxxv, xxv	Thelygonū	clxxxvii, xvii
Spōdylū	ccxxxv, xxii	Thelyphomon	v, xxi
Spina 25. 12. acuta	ccxxvi	Therionarca	ccxli, xxviii
vii, alba	ccxxxvi, vi	Thlaspi	ccxlii, xxvi
Splenion	xxix, xxix	Thrausma	xv, ii

Thus ccxlii.xiii  
 Thylacitis clxxviii.xxiii  
 Thymelæa ccxlii.xi  
 Thymus ccxlii.xx.  
 Tilia ccxlv.i  
 Tithymalus ccxvi.iiii  
 Tragacantha ccxlviii.  
 xviii  
 Tragium ccxlviii.xxviii  
 Tragos ccl.ix  
 Tragoriganum ccxlix.  
 xxix,  
 Tragopogon ccxlix.xiii  
 Tribulus ccl.xxi  
 Trifolium ccli.xii  
 Tripolion cclii.i  
 Triticum cclii.xvii  
 Trifago cclii.vii  
 Tubera ccli.xxvi  
 Tussilago ccliii.i  
 Typha ccxlv,xxi

**V** **V**  
 Eneris peçtē ccliii.xii  
 Veratrum ccliii,xxi  
 Verbasum cclv.iii  
 Verbenaca clxxxiii.vii  
 Vetonica xxxviii.xvi  
 Vmbilicus Veneris  
 cclviii.vii  
 Vnedo xxv.ii  
 Vrticula syluestris cclix.i

**X**  
 X Iphidion ccxxxv.  
 X Xylocinnamomum  
 lxvi.x  
**Z**  
 Z Arnabum 27.2  
 Z Zarnabadium xxvii.ii  
 Zingiber lxvi.x  
 Zuzia. xlix.xix  
 Zygis ccxxiii.viii

**FINIS.**

# HISTORIA PLANTARUM

ET VIRES EX DIOS-  
coride, Paulo Aegineta, Theo-  
phraſto, Plinio, & recēti-  
oribus Græcis, iuxta ele-  
mentorum or-  
dinem.

PER CONRADVM GESSNER-  
um Tigurinum.

## A

**BROTONVM** duorum est *ἄβροτον*  
generum: fœmina, quadam ar-  
boris specie fruticans, candi-  
cat, circum ramulos foliis, se-  
riphi modo, minutim incisis.

A

*rov.*  
Cypres

floribus referta est, comantibus in summo,  
fulgore auri, corymbis. quod per æstatem  
prodiit, suauiter olet, cū grauitate quadam  
& amaro gustu. id genus Siculum esse cōstat.  
Alterum mas vocatur, sarmentosum, gracili-  
bus ramulis vti absinthium. Plurimū in Cap-  
padocia gignitur, & Galatia Asiatica, atq; in  
Syriæ Hierapoli. Aegineta, Calefacit & sic-  
cat in tertio abscessu, digerendi incendiq; fa-  
cultate præditum, modicè enim astringit. ro-

*Auronē*

ti corpori cū oleo infricatū rigores circuitu remeantes perfanat. Stomacho inimicū est. Crematū eo magis siccāt, quod ignem haud expertum est. Alopecias sanat cū aliquo tenuium partium oleo.

ἀλυσθιον  
aluisne

ABSINTHIUM, aliqui bathy picron, herba vulgò cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Aegineta. Cal. 1. sic. 3. Astringit cum amarore acrimoniâque. Humores ventriculi biliosos aluo & vrina pellit: quibus autem pituita redundat, eos propter astrictiōne nihil iuuat. Succus ipsius, herba multo calidior est.

σισιφλον  
Barboti-  
nâ &  
mors de  
vers

ABSINTHIUM marinum, quod aliqui seriphum vocāt, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur, quo Isiaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba est tenuis, abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauiter olet, & cū quadam calfactione adstringit. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpihus finitima scatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, verum subamarum est, non adeò seminis foecundum. Eadem quæ seriphium potest. Aegineta, Seriphium calefacit 2. siccāt 1. Consimile absinthio, minus tamen eo astringit, magis calefacit. animalia vëtris oc-

cidit, mediocriter stomacho aduersatur. ἀκάνη

**ACACALIS** fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadā tenuis similis. Aegin. Eius dilutum collyriis claritate oculorum efficacibus miscetur.

**ACACIA** in Aegypto nascitur spina infestā arboris, fruticosa, non se in rectum attolens, florem habet cādidum, & semen lupino simile in folliculis. ex quo succus expressus ficcatur in vmbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, vt in hac arbore esse potest. aliqui exprimunt ex foliis & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Alterum acaciæ genus in Cappadocia Pontoque prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile. aculeorū vallo munitur, folia habens rutæ. semen lenticula minus fertur autumno, in loculis cōnexis, terpūm quaternūve capacib. Succus eius adstringit viribus inferiorib. & ocularib. medicamētis inutilis. Aegineta. Sic. 3. frig. 1. elota autem 2. Acerba & terrestris est.

**ACANTHIUM** albæ spinæ simile, foliis aculeatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis. ex qua collecta & neta vestes bōbycinis similes texūt. Folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur. Aeg. Calidæ naturæ, & tenuiū partiū est. Conuulsis auxiliatur.

**ACANTHVS**, Rom. paderotā vocāt. nasci- ἀκάνθιον

**brancha** tur in hortis, petrosis, & riguis. folia habet  
**visina-** multo lactucaceis latiora, & longiora, crucæ  
 diuisura, nigricantia, pingua, læuia. caulem  
 binum cubitorum, digitali crassitudine, læuē,  
 prope verticem ex interuallis circumdatum fo-  
 liolis, ceu nucamēta quædam oblonga refe-  
 rentibus, spinosis: è quibus flos prodit albus,  
 semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie.  
 radicibus nititur longis, mucosis, rubris, &  
 glutinosis. Nascitur & sylvestris acanthus,  
 scolymo similis, aculeatus, breuior quàm sa-  
 tius, & is qui in hortis prouenit. cuius radix  
 ad eadem ad quæ superior efficax. Aeg. Alii à  
 nigro foliorum colore melamphyllon appel-  
 laut. discutit & siccant.

\* **erable** A C E R arbor est tiliæ nõ ab similis forma  
 & magnitudine, verum cortice paulo scabri-  
 ori, subliuidoque, crasso, & flexi cōtumace.  
 Radicib. paucis, sublimib. crispis. materie ve-  
 nis longiorib. fluctuante, molli, macilēta, gra-  
 cili. Summa soli facie gaudet, facileq; cape-  
 sit incrementum, in riguis potissimum. De flo-  
 re nasci aiunt fructum paliuro similem, verum  
 oblongiorem. R eperiuntur hac in arbore duo  
 tubera, vnū brusci nomine, intortius, crispū:  
 alterum molusci, sparsum, simplicius, sed ex-  
 cellentius priori. Aceris montanum genus cris-  
 pius duriusq; est, etiamnū è mascula crispus  
 ad lautiora opera. De campestri, id est, galli-  
 ca, & zigia, id est, caprino alibi loquemur.



**Aceris radix** contusa iocineris doloribus utilissimè imponitur.

**ACHILLEA**, quibusdam Achillea fideritis, dodrantes aut maiores gerit scapos, ἄχ. ἰα. 10  
 fusorū effigie, quasi minutulis foliis circūdatos, crebris in latere foliorū sectionibus, coriandri similitudine, subfuluo colore, odore multo nō insuavi, medicato & glutinoso. umbellæ in cacumine rotūda, floribus candidis, purpureis, & aurū emulantibus. prouenit læto solo. Aeg. Consimilis est fideritidi Heracliae, sed magis astringit, eoque fluidis affectibus conuenit. mille-  
feuilles

**ACINOS**, aut acanos à Græcis dicitur, tenui siccoque ramulo herba, ocimo similis odorata, sed hirsutior. qua coronæ factitantur. à nonnullis olitoribus colitur. Aegin. Menses & aluum pota sistit. illita ignemq; panos facrum sanat. mediocriter astringit. ἄκινος

**ACONITON**, aliqui pardalianches, alii ἄκονιτον  
 cammoron, alii thelyphonon, alii myoctonon, alii theriophonon vocāt. folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta, caulē palmo altum. radix scorpii caudam æmulatur, & alabastris modo splendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones admota radice, stupentq; qui rursus hellebori contactu, excitantur. oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur. enecat pantheras, sues, lupos & feras omneis in

**luparia** carnibus obiectum. Est & alterum aconitum, quod aliqui cynoctonon, alii lycoctonon appellant. Huius genera sunt tria. vnum, quo vtuntur venatores: alia duo in vsum suum vertere medici. è quibus tertium, quod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, motibus Iustinis exilit, à priore distas, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multò nigriora: caulem filicis, læuem styllum, cubitali altitudine, aut ampliorem. semen in siliquis oblongis recondit. radices in modum squillæ marinæ circum fororum nigrescunt. Quibus ad venationem luporum vtuntur insertæ siquidem crudis carnibus, & deuoratis, lupos enecant. Aegineta. Aconitum pardalianches exedentem lethalemque vim habet, quàm ob causam intro non assumitur: extrinsecus tamen in carnibus quas exedi oporteat, vti licet. Lycoctonon similes vires sortitù priuatim lupos, vt illud pantheras enecat.

*ἀκόνιτιον.*  
Flamme  
batarde,  
ou glai-  
eul deri-  
uiere ou  
de mar-  
res.

**A C O R V M** folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimum est densum, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Aegineta. Calefacit, ficit 3. Radice ad

ciendam vrinam lienémque induratum vti-  
mur. Corneæ oculorum membranæ crassi-  
tatem extenuat,

ACUTASPINA, quàm pirinam aut pi- *ὄξυκανῶν*  
tyanthen aliqui vocant. arbor est pyraestro si- *θα.*  
milis, spinosa valde & minor. baccas profert Berberis  
myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nu- *offi. spi-*  
cleum: radicem multifidam, altè descenden- *niune-*  
tem. Aegineta. Viribus quoque pyro sylue- *tū rūra.*  
stri æqualis est. habet & subtile quippiam  
coniunctum. Fructus ipsius myrti baccis re-  
spondet.

ADIANTON, polytrichon, pusilla ge- *ἀδίαν-  
τον.*  
rit folia similia coriandri, in summo incisur- *capillus*  
is diuisa. cauliculi, quibus exoriuntur, nigro *veneris.*  
colore nitēt prætenues, palmum alti: radice  
superuacua: neq; caulem, neq; fructum, neq;  
florem profert. Seritur gratia vtilitatis peco-  
rum, circa ouilia. Vmbrosis, & palustribus,  
circa parietum aspergines, & fontium specus  
enascitur. Aeg. Siccat, extenuat, modicè discuti-  
tit. Calore ac frigiditate medium est. Alopec-  
ciis medetur, tumores digerit, calculos potui  
cōfringit, reiectiones pulmonis desiccatur, alui  
profluvium sistit.

ÆGILOPS herbula folia tritici habens *ἄγίλος*  
sed molliora, in summo capite semina bina *Aurō ou-*  
ternave rubra, quibus aristæ quasi capilla- *Cognio-*  
cæ exeunt. Aegin. Discutit, indurescentibus *le.*  
inflammationibus, & ægilopi, quæ oculo,

tum fistula est, opitulatur.

**ÆTHIOPIS** folia habet verbasco similia, perquam hirsuta densaque, in orbem circa radicem imā redacta caulem quadrangulum, scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis cōcauum alis: semen crui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccæ nigrescūt duranturque, vt cornua possint videri. plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Aeg. Radicis decoctum potu datur ischiadicis, pleuriticis, & sanguinē excreatib. item faucium asperitates cum melle lenit.

ἄγανος

ἄγανος

Indicū li  
gnū Pau  
lo, offic.  
lignum  
alocs,

**AGALLOCHVM**, lignum est quod ex India atque Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute verius quàm cortice vestitur, aliquantulū verficolorē. Aegineta. Mansum animæ suauitatem commendat. in suffitum adhibetur. Radix eius pota denarii pondere languidum ex humore ventriculum resolutumque confirmat. Iocinorosis, dysentericis, pleuriticisq; opitulatur.

ἄγανος

aganc

**AGARICVM** radix fertur laserptii similis, sed facie summa solutior, & rariore fungosoq; tota cōtextu. Duo eius genera. foemina, quæ præfertur, rectis intus venarū discursibus constat. mas rotundus est, & vndique

compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit. gignitur in Sarmatiæ regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affirmant. alii vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. gignitur in Galatia Asiæ, & Cilicia, in cedris, sed friabile & infirmū. Ae. Mixta est aërea terrestrique substantia. Vis eius est digerere, & crassos humores incidere. Viscerū maxime obstructions purgando tollit.

**AGERATON** fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origano maximē similis. umbellam gerit in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniā diutissimē flos in sua coloris specie cōseruetur. Vis decocti feruēs. huius vstæ, nidor urinam cit, & vuluæ duritias emollit. Aeg. Digerit, & inflammationes modicē arcet. ἀγρηστόν

**AIVGA** herba in terra repens, incurua similis folijs serperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circumramos densis, odore pinus, flore tenui, luteo, Iba seu Iba offi. & herb. vel candido: radicibus cichorij. Alterum est muscha: genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, pretenuibus, coma supra dictæ: flore candido: semine nigro. hæc etiā pinum redolet. Tertia mas nominatur, parua, foliis exilibus, albis scabris: caule aspero, cādido: luteis floribus, semine iuxta alas. χαμαιπύτυς

Resipit & hæc pinum. Hæc duæ vim superio-  
ris obtinent, sed non vsque adeo efficacem.  
Aegineta. Calid. 2. sic. 3. Purgat & abstergit  
viscera potissimū iccur. vrinas mensesq; tra-  
hit. magna vulnera conglutinat. Putredinē  
expertis medetur, duritias discutit. decoctū  
ipsius etiā coxendicū doloribus salutare est.

ἀλκαία.

A L C E A syluestrium maluarū generi assi-  
gnatur. folia habens diuisa, verbenacę proxi-  
ma: caules treis aut quatuor, cortice cannabi-  
no vestitos: florem rosę, paruū: radices albas,  
latas quinq; aut sex, cum plurimum cubita-  
les. quæ cum vino aut aqua potę, dysentericis  
ruptisq; medentur. Eadem sunt apud Aegi-  
netam, nisi quod pro ῥήξας, id est rupta, legi-  
tur δήξας, id est erosiones.

ἀλεκτορό-  
λοφος.  
Oruale  
ou toute  
bonne.

A L E C T O R O L O P H O S folia habet  
similia cristę gallinacę, caulem tenuem, &  
semen nigrū in siliquis. Solidum semen in o-  
culum coniicitur, nec turbat, sed in se caligi-  
nem contrahit. Mutat enim colorem, ex ni-  
gro albicare incipit, & in tumescit ac exit.

ἄλισμα.  
fistula pa-  
storis &  
plātago  
aquatic⁹.

A L I S M A, alii damafonion, appellant, fo-  
lia ei plātaginis, nisi angustiora essent, lacini-  
osa, cōnexaq; in terrā; caule simpliciter tenui  
cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui,  
candido, pallescēte: radicibus, tenuibus, vt ve-  
ratri nigri, acribus, odoratis, modicē pingui-  
bus, aquosos amat tractus. Aeg. Absterforiā  
quādam vim obtinet, qua calculos conterit.

& per vrinas e ducit in ventre contenta.

**A L Y P O N** surculosa herba est, subrubra: *ἄλυπον*.  
 gracilibus ramulis: tenuib<sup>9</sup> foliis: flore mol- Paulo  
 li, læui, & copioso: radicæ, betæ, tenui, refer- alypias  
 ta acri succo: semine epithymi. gignitur in aëuario  
 maritimis, maxime Libyæ, quàm largissima. turbet al  
 quanquã alibi quoq; plurima prouenit. Aeg. bum.  
 Eius semen bilem atram purgat pari epithy-  
 mo mensura sumptum cum sale & aceto: ve-  
 zuntamen intestina leniter exulcerat.

**A L Y S S O N** fruticosa herbula est, vnicaui *ἄλυσσον*  
 lis, subaspera, rotundis foliis: fructu dupliciũ rubia mi  
 scutorum effigie, in quo est semen, quadam- nor offi.  
 tenus latum. in mōtibus & asperis locis emi-  
 cat. Aegi. Quod à cane rabido morsos libe-  
 ret, sic appellatum est. siccatur, discutitur, abster-  
 git, renũ meatus aperit: ephelidẽ, quẽ aspera  
 discolorq; cutis est, exherit.

**A L L I V M** quoddam satium atq; hortẽ *σκόρο-*  
 sium habetur. quod in Aegypto, singulari, vt *δον.*  
 porrum, capite constat: dulce, in purpureum Ail.  
 vergens paruum. reliqua verò magna & can-  
 dida, ex pluribus coagmentantur nucleis,  
 quos aglitas, id est spicas, Græci nominant.  
 aliud est syluestre, quod ophio scorodon, id  
 est anguinum, vocant. Aeg. Calefacit, siccatur.  
 4. Syluestre, domestico valentius est.

**A L N V S** arbos est sterilis, caudice recto, li *κλήθεα.*  
 gno medullaq; molli, adeò vt graciliores Aulne.

virgæ concauentur. folio pyri, sed ampliore ac neruofiore, quadamtenus orbiculato virgatoque. Cortice squaroso, foris albicante, intus rufo, qua de causa coria tingit. fructu nullo, cū nihilominus floreat. Radice summa, nec quā in laurus maiore, tenui. in plana descendit, aquosisque gaudet, quanquam ancipitem agat vitam. Infoelix habetur ceu scopis tantum nata: verum ad naualia quoque materies eius commédatur. Non potest extra terram paulum tēpus edurare, sed in humore obruta permanet ad diuturnitatem. Suppurationes folia discutere tradunt.

ἄλός.  
perro-  
quet & sc  
peruiū  
marinū

A L O E S folium scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum, folia vtrinque gerit ex obliquo spinosa, rariusculè striata, breuia & curta. caulis emittitur nō dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regiæ cognatus. graui tota est odore, & gustu amariss. radice vna, ceu palo, in terram depacta. Plurima præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nasceitur etiā in Asia & Arabia, in locis quibusdā maritimis: & in insulis, vt in Andro. non valdè succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quā vtilis si detrita illinatur. Duo succi genera. quoddam arenosum, quod sedimentum purissimè esse videtur. alterum ad iocionoris imaginē vergit. Eligi debet boni odo-

Caballi.  
nū offic.  
succotri-  
num.



ris, sincera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis, ac iocino-  
ris modò coacta, facile liquefcens, eximie a-  
maritudinis. improbatur nigra & fractu con-  
tumax. Gummi eam adulterant. quod depre-  
henditur gustu, amaritudine, & valido odo-  
re: eoq; argumento, quòd digitis friata non  
ad minima vsque frustra resoluitur. Nec de-  
sunt qui acaciam immisceant. Aeg. Cal. 1. sic.  
3. Stomacho utilis est. abstergit, discutit. Ven-  
tris excrementa subducit. Lota quidem deter-  
git minus, sed magis stomacho cõfert, & in-  
flammationem prohibet, vlceribus cicatricẽ  
inducit, præsertim sedem & naturalia infe-  
stantibus.

**A LOPECYROS** specie tota similis est ἀλοπίνα-  
critico, verum folio latiore. spica plantaginis <sup>por</sup>  
hirsuta, molli, lanugine densa, nullis acerib<sup>9</sup> frumētū  
aut aristis armata, nõ dissimili vulpium cau- caudatū  
dis, vnde ei nomen. Radix est articulata, ex  
cuius nodis emicant folia pinnata.

**A LSINEN**, aliqui anthyllion, nonnulli ἀλσίνη.  
myosota vocant, quoniam musculorum au- μουρον.  
res folia imitantur. Lucis opacisq; gaudet,  
vnde alsine dicta est. Hæc erat eadem quæ  
helxine, nisi humilior esset, & folijs longio-  
ribus, nec hirsuta. cum teritur, odorem cucu-  
mis reddit. Aeg. Refrigerat & humectat vt  
helxine, ad feruentes inflammationes utilis.

**ALTHAEA**, quam alij ibiscum vocant,

ἄλθαία. in syluestrium maluarum genere est, cui fo-  
 Mauluc lia vt cyclamino, rotūda, lanugine canescūt:  
 fauluage flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta,  
 offic. bis intus alba. Althēa appellatur, quòd inter pri-  
 malua, mas sit vtilis, & pluribus polleat remediis.  
 vulgo Aeg. Discutit, laxat, inflammationē abigit,  
 maluaui lenit, phymata concoquit. Radix & semē re-  
 sce & gui liqua sanē intēsa habent, & vitiligines quoq;  
 maulues. abstergūt. Prēterea semen calculos cōfringit.

ἄμβρο-  
 σία. A M B R O S I A tenuis frutex est, ramosus,  
 trium ferē palmorum: foliis rutæ, circa imū  
 caulem exiguis. cauliculi seminibus, perinde  
 Hęc est quasi racemulis grauidi, qui nunquam florē  
 herbario pariūt, odore vinoso, suauis, radice tenui, ses-  
 rum est quipedali. Coronātur ea Cappadoces. Aeg.  
 polemo- Vis eius reprimere ac repellere, & illitu ad-  
 niū non stringere humores, qui in aliquam partem  
 ambro- incumbunt.  
 sia.

ἄμμι.  
 offi. am- A M M I, Aethiopicum cuminum appel-  
 meos. lant. Plerique hoc natura diuersum esse ab il-  
 lo existimant. Vulgò notum est: semen exile  
 multo minus cumino, organū respiciens. Eli-  
 gendum est purū, minimē surfurosum. Aegi-  
 neta, Calefacit, siccat 3. Particulas habet te-  
 nues, discutit, vrinam mouet, prēcipuē semē.

ἄμμωνί-  
 ακον A M M O N I A C V M ferulę succus est, quā  
 Gumme iuxta Cyrenen Aphrica gignit, cuius fruticē  
 ammo- cum radice agasillim vocant. Probaturne  
 niac. coloratum, ligni & calculorum expers, thu-  
 ris similitudine, minutis glebis, densum, sin-

cerū, nulla forde spurcatum, castoreū odore imitās, gustu amarū. hoc genus thrausma, id est, friaturā appellant: quod verò terrā & calculos collegit, phyrāma. gignitur in a phrica iuxta Ammonis oraculum, succum, stillante ferulacea arbore. Aeg. Adeo mollit vt scirros & top hos discutiat.

AMOMVM, exigue fruticat, ex ligno se cōuoluēs in racemi modū: flore, seu cadidē violē, paruo: foliis vitis albę similibus. Laudatur q̄ maximē Armeniacū, fuluo auri colore, ligno subrufo, valde odorato. Medicū, quoniā in cāpestribus & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est autē magnū, subuiride, tactu tenerū frutice venoso, odore origani. Ponticū verò subrufum, paruū, fragile, racemosū, fructu turgēs, & odore nares feriēs. Deligito recēs, candidū vel subrubrū, quod nec astrictū cohereat, nec cōuoluatur: sed solutū diffundatur, seminis plenū, vuis paruis simile, graue, odoratū, modò caricē non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore nō euariāte. Adulteratur herba amomo simili, quæ amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem quæ ab vna radice integros surculos emittunt. Aeg. Acoro virtute respondet, minus eo tamē siccatur, ampliusque maturatur.

ἀμωμον  
non est  
offic. pes  
colūbin<sup>9</sup>

ἀμπέλο-  
πρασον. **AMPELOPRASVM** stomacho magis  
porreau, aduersatur.& plus porro exalfacit. urinā &  
ouail sau, menses vehementius ciet.id contra serpentiū  
uage, morsus esse conuenit. Aeg. Porrum hoc syl-  
aux vi- uestre acerrimum calidissimumque est, exul-  
gues cerat, incidit, viscerum meatus recludit, sto-  
macho inimicum.

ἀμύγδα-  
λα **AMYGDALA** quæ quidem amara sunt  
Amâdes. extenuant, viscosos crassosque humores al-  
tius herentes meatus recludendo educunt, tū  
in cutem erumpentes abstergunt. Arbor ean-  
dem vim repræsentat. At dulcia amygdala  
moderato calore donata sunt. Aeg.

ἀνανάρ-  
διον. **ANACARDIVM** recentiori Græciæ,  
Anacar- nam vetus non meminit huius, arbor est In-  
di offici. dis familiaris. prouenit quoq; in Siciliæ mon-  
tibus, qui flammæ ignis eructant, fructu au-  
culæ corculo non dissimili, vnde nomen pu-  
tatur inditum: rubente intus cruore, quo ve-  
luti sanguine scatet. Calidum. sic. 3. Me-  
morix iacturam refarcit. Labantes sensus re-  
fricat. Mentem exacuit. morbis cerebri, quos  
frigida vel humida causa attulerit, opitula-  
tur. Nervorum resolutioni auxilio est. Sani-  
es quæ in fructu condita manet, verrucas de-  
let, cæterū cutē exulcerat. Scabiem vsu creat.  
Iuuenibus & biliosis ob caloris vim eo in-  
terdicitur.

ἀνάγαλ-  
λιν **DUO ANAGALLIDIS** genera, quæ tā-  
tum flore distant. nam quæ cæruleo flore est,  
fœmina

ſcœmina dicitur: mas, quę phœniceo. frutices Morgell  
ſunt parui, in terra iacētes, folijs in quadran- ne non  
gulo caule puſillis, ſubrotundis, ad helxing mouron  
folia accedentibus: ſemine rotundo. Aegin. ou paue-  
Vtraq; vim habet abundē abſtergentē, ſubca rine.  
lidam & attrahicem nonnullam, vt etiam  
aculeos euellat. Succus naribus inſtillatus ca  
put purgat.

ANAGYRIS, frutex eſt arboris inſtar, ἀνάγυρις  
grauis odore: folijs agni, virgiſque: flore boispuat  
braſſicæ. ſemen in corniculis non breuibus  
gignit, ſubrotundum, firmum, verſicolori  
facie, ſimile renibus, quod dureſcit vna ma-  
tureſcente. Aegineta, Acris eſt, calefacit, di-  
ſcutit. Semen tenuiorum partium, & vomiti  
ciendo eſt.

ANCHYSA, quę alio nomine calyx, aut  
onoclia appellatur, folia habet lactucæ in a-  
cumen ſaſtigiata, hiriſuta, aſpera, nigra, mul-  
ta, quoquoerſum humi, ſpinis horrida: ra-  
dici craſſitudo digitalis. quę æſtate prouenit  
manuſ inficit ſanguineo colore. læto ſolo na-  
ſcitur. Eſt & altera, quam aliqui alcibiadion,  
aut onochiles appellarunt. hæc à priore di-  
ſtat, quod minora habeat folia, ſed ſimili  
modo aſpera: ramulos exiles: ſorem purpu-  
reum in puniceum vergentem: radices ru-  
bras, oblongas, quæ meiſibus ſanguineum  
ſuccum fundunt. in ſabuloſis naſcitur. Eſt &  
alia huic haud diſſimilis, ſemine puniceo,

ἀρχυσα  
Orcha-  
nette.

minore. Aegineta, Onocleæ radix astringendi vim habet, & quiddam subamarum, ad lenis renumque dolores efficax. Cum polenta illita erysipelatis succurrit. Folia radice minus refrigerant desiccantque, ad alui profluvium bibuntur. Onochelos seu alcibiadios medicatior quodammodo, viperarum moribus succurrit in cibo potuque, & alligata. Tertia reliquis breuior sine nomine fere, amarior alcibiadio. Latis alui lumbricis instar acetabuli pota benefacit.

A N C H V S A lycopsis alio loco sequetur.

ἀνδρόσακ.

1456.

A N D R O S A C E S herba est amara, tenues spargens iuncos, sine foliis, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. gignitur in Syriæ maritimis. Aegineta. Amara & acris est, discutit, siccat. Vrinam potu promouet vel herba, vel ipsius fructus.

ἀνδρόσακ.

1457.

A N D R O S A E M O N ab hyperico, ascyroque differt, quod fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubentibus virgis: & foliis rutæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita vinoso succo manant. complureis alas habet in cacumine, vtrinque expansas, pinnatasque: circa quas, flores pusilli, lutei: & in calyculis semē papaueris nigri, insigne lineis. Aeg. Androsæmon genus alterum ascyron, vel ascyroides nominatur specie hyperici, al

terum dionysias. fructus ipsorum purgat, folia autem magis desiccant.

Duo ANEMONES genera, vnum sylvestre, alterum in cultis nascens. Cuius multæ species. vna phœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. harum folia coriandro similia, tenuioribus propè terram diuisuris, caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermèque geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo prorsus maior, latioraque folia, & duriora: oblongius capit: flore puniceo, tenuibus, & multis radicum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Sunt qui errore ducti, argemonen nominari eupatorium putet: quoniam à sylvestri anemone, argemonen & papauer quod rhœada appellant, de quo inter papaueris genera referemus, propter colorum cognitionem in floribus, distinguere non possunt. verum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtraque tardius floret. quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrem. in super anemone & rhœadi capitula sylvestris papaueris similia insunt. sed in anemone supernè crassiusculū, in rhœade subangustius. Anemones ge

ἀνέμωνες  
herbe au  
vent. eius  
flores, co  
cles & co  
quelour  
des.

nera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. in aruis illa sæpius enascuntur. Aegineta, Anemonæ omnes vim habent acrem absterforiamq; , extrahunt, ora vasorum recludunt, pituitam per hos purgant, lepras tollunt appositu, & lactis faciunt vbertatem.

*Passe.  
fleur.*

Anemone, apud Theophrastum, flos coronarius sylvestrium bulborum, post Narcissum vere exit.

*ἄνθος.  
Anct.*

**A N E T H V M** calefacit & exiccat in secundo ordine intenso, siccatur paulo remissius, quod in oleo excoctum digerit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat. Vstum tertij calefacientium siccantiumq; ordinis efficitur, humentibus vlceribus utiliter illinitur. Viride quoniam humidius minusq; calidum est, non ita maturat.

*ἄνισον.  
Anis.*

**A N I S M M** melius semper recens, plenum, non fursurosus, odore præstans. inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium. Aegineta, Eius semine acrius est. Cal. sic. 3. hinc & urinam mouet, & flatus discutit.

*ἄνις.  
Arreste  
beuf, ou  
bugrauc  
& bugrā.  
de.*

**A N O N I S**, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauissimarum multarum, capitibus rotundis, foliis lenticularum, pusillis, ad rutæ aut pratensis loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non



iniucundè olentibus. Muria conditur, antè quàm spinosa fiat. cibus gratissima. rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. radicem mittit candidam. quæ excalfacit, & extenuat. Aeg. Succus cum vino potus vrinam ducit, calculos cõterit, crustas rumpit, & dentes mitigat.

**ANTHEMIDIS** genera tria, tantũ flore distantia: rami dodrantaes, fruticosi, alis multis concavi: tenuibus foliolis, parvis, numeroſis: rotũdis capitulis: floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rutę. nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur vere. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. hanc propriè heranthon vocant. Ea cui leucanthon nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, vehemētius vrinā ciunt. Aegineta, Calefacit siccātque in primo ordine. Virtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata constat.

ανθιμίδης  
Nielle.

**ANTHYLLIS** duplex est, quædã enim lentissimilla, foliis mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parva, tenui. Nascitur in salis terris, & à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est foliis ramulisq; iugæ similis, hirsutioribus tamen, brevioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris ad-

ανθυλλίς  
Salsola &  
sel alkali

modum grauis:radice cichorii. Aeg. Vtraq;  
vlcera perficcat. Quę vcrò chamępityi respō  
det,tenuior est, comitialibus comperit, effi-  
caciū abstergit.

ἀντίρρινον  
vov

Oil de  
chat ou  
moron  
violet.

A N T I R R H I N O N, alii anarrhinon vo-  
cant, herbam caule & foliis anagallidi simi-  
lem: flore albę violę, purpureo. ideoq; sylue  
ftris anagallis nominata est: semine vituli na-  
rium simili. Aeg. Perfimilem Inguinarię siue  
Asteri Attico vim obtinet, sed minus effica-  
cem. itaque ex illo hoc quoque cognosces.

ἀπαρίνη.  
Grateron  
offi. asp-  
gula, &  
tuella.

A P A R I N E ramis multis & paruis fru-  
ticat, asperis, quadrangulis, per interualla or-  
biculato foliorum ambitu, vt in rubia. flos  
albus: semen durum, rotundum, concauum,  
album, vmbilici figura, asperitate vestiū te-  
naci. Ea pastores coli vice vtuntur, ad eximē-  
dos ē lacte pilos. Aeg. Hanc alii philanthro-  
pon, alij omphalocarpon appellant, modicē  
abstergit & deficcat, aliquam partium tenui-  
tatem habet.

ἀφάκη.  
vessefaul-  
nage.

A P H A C A in aruis nascitur, altior lente,  
tenuibus foliis. filiquas lēticula maiores fert,  
in quibus terna quaternāve semina nigra, lē-  
te minora, continētur. Aeg. Lenticulę modo  
astringit: sed manducata egrius cōcoquitur,  
valentius ficcāt, mediocriter calefacit.

μελισσό-  
φυλλον.  
Mc lisse.

M E L I S S O P H Y L L O N siue melittēna,  
id est, apiastrum, id sibi nomen vsurpauit,  
quoniam apes ipsa herba delectantur. cauli,

culi & folia balloræ, de qua paulo antè dixi- quanquã  
 mus, similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nõ sithoc  
 nec ita hirsuta spectarentur. citreum malum apiastrũ  
 olent. Aeg. Viribus marrubio per omnia re- Ruellio  
 spondet, sed multo infirmius est.

**A P I O S** iuncos duos siue tres spargit, ru ἄπιος,  
 bros, tenues, qui à terra parum attolluntur: ἰσχὰς,  
 foliis rutę, oblongioribus tamẽ, & angustio-  
 ribus, herbaceis: semine paruo, radice hastu-  
 læ regiæ, in formã pyri turbinata, rotundio-  
 re tamen, succi fœcunda, intus habet corpus  
 candidum, extrà cortices nigros. Superior  
 pars eius vomitione bilem pituitásque ex-  
 trahit, inferior per aluum. tota vtrinque  
 purgationes mouet. (Aegineta. non me-  
 minit.)

Hortensis **A P I I** herba ad eadem ad que σέλινον.  
 corianum conuenit. Aeg. Tanti caloris est vt Persil.  
 vrinas & menses eliciat. flatus discutit, præ-  
 fertimque eius semen.

**A P O C Y N O N**, siue cynocrãbe, braf- ἀπόκυνον  
 fica canina, frutex est paruis viticulis con-  
 stans, male olentibus, lentis, vitiliũmque mo-  
 do obsequiosis, fractu ferè inuietis: folio he-  
 deræ, molliore tamen, & per extremum acu-  
 tiore, lento, graui odore. id luteo succo tur-  
 get. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie,  
 digiti lōgitudine protēduntur. semine intus  
 albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes co-  
 acta, canes, lupos, vulpes, & pãtheras enecāt

in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt. Aeg. Dicitur & cynomoron quod celerrimè canes enecet, hominì etiam venenosa. Calida citra ficcitatem est, vnde etiam digerendi facultatem illita repæsentat.

*ῥοκκία*.

*μωρ.*

Apollina

ris lat. of

fic. iusq̃a-

me ou ha

nebanc.

HYOSCYAMVS, frutex est caules emittens crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta. flores è latere caulis, ordine prodeunt, ut quædam puniceorum cytini, scutulis septi fœfici. iusq̃a- minum plenis, ut papaueris. Tres eius differentiae: vna semine nigro, floribus penè purpureis, similacis foliis, cytinis præduris, & spinosis. alterius semen subflauum, ut irionis: flores lutei. folia, & silique simpliciores. ambo infaniam gignunt & soporem, ideo in communi vsu damnantur. tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici recipere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminifque, in maritimis rudibusque nascens, cuius occasio si non adsit, rufum vsurpari oportet. niger, ut deterrimus, improbatur. Aeg. Quorum semen nigrum aut flauum est, venenosa sunt. accommodatissimum verò curationibus quod & semen & florem candidum habet ex tertio refrigerantium ordine.

APPENDIX spina Plinio dicitur, quoniam baccae in rutilo colore pendeant, appendicæsq; vocentur. Hæ crudæ, per se, & aridæ in vino decoctæ aluum citant, & tormina compescunt. (Pro citant melius legetur citant.)

ARABIS eadem quæ Draba.

μόμαρος

ARBUTUS siue vnedo arbor est coto- Pomme  
neæ malo nõ dissimilis, tenui folio. cuius fru de bo-  
ctus pruni magnitudinẽ implet, nullo intus chet ou  
nucleo. huic memæcylo cognomen est. ma de boys  
urus aut flauet, aut rubescit. in esu acerosus.  
Aegineta. Stomacho aduersatur, capitisque  
dolorem mouet. acerbæ qualiratis est & ar-  
bor, & fructus.

ARTION, aliqui potius arcturon vo- ἀρκύριον  
cant, similis est verbasco folius, nisi quod hir Lappa  
futiora & rotundiora sunt: caule longo, mol- minor,  
li: semine cumini, paruo. radice tenera, alba,  
dulcique Aeg. Vis eius est tenuis, siccans &  
mediocriter adstringens.

ARGEMONE in totum syluestri papa- ἀργεμόνη  
ueri similis est. folia habet anemones, diuisa: Non est  
florem puniceũ: caput in cauliculo papaue- agrimoi-  
ris rhœadis, oblongius, & summis partibus ne vulg.  
latum: radicem rotundam. succum croci co-  
lore, acré, dimittit. Argema & nubeculas ex-  
purgat. folia illitu inflammationes cõpescũt.  
Aeg. Abstergit simul & discutit.

ARISARVM exigua herbula est, cuius ἀρίσαρ  
radix oleæ magnitudinem implet, longè ma ρομ.  
ioris quàm aron acrimoniæ. Vnde illitu no-  
mas sistit. fiunt colyria ex ea, ad fistulas effi-  
cacia. illitu radice, genitale animalis cuius-  
cunq; in perniciem agitur.

κρίτολο

ARISTOLOCHIA nomen ex eo sibi χία.

De sarra-  
fine. Pl.  
niomalū  
terræ.

q. d. sar-  
mentaria

ἀμυρια-  
κῆ.

Abricoz

adoptauit, quòd existimetur optime puerpe-  
ris opitulari. Tria eius genera traduntur. ro-  
tunda, quæ fœmina vocatur, foliis hedera-  
ceis, præstanti odore, cum acrimonia, molli-  
bus, subrotundis, multis ab vna radice germi-  
nibus, prælongisq; palmitibus: floribus cā-  
didis, pilei similitudine, in quibus quod ru-  
brū est, grauter olet. Longa, mascula appel-  
latur, nonnullis dactylitis, longiore q̄ rotun-  
da folio: tenuib. ramulis, dodrantalibus: flo-  
re purpureo, grauter olente, qui marcescens  
in pyri similitudinē turbinatur. radix rotun-  
dæ, in orbem conglobata, rapi modo. longè  
verò radix digiti crassitudinem, & dodrantis  
longitudinē implet, nonnunq̄ paulò maiore  
ambæ colore intus buxco, gustu amaro, &  
grauī. Est etiamnum tertia longa, quæ cleva-  
titis vocatur, ramulos habēs tenues, refertos  
foliis subrotundis, minori semperuuo simi-  
libus: flores rutæ: radices longiores, tenues,  
crasso cortice odoratoq; vestitas, priuatim  
vnguentorum spissamētis cōuenientes. Aeg.  
Aristolochia omnis calida, tenuis, abstergēs,  
amara, & subacris, ad medicinas utiliss. Ro-  
tunda, partibus tenuior, & in omnibus effica-  
cior est. Clematitis, odorata quidem, sed im-  
becillior. Longa verò in aliis media harū est,  
sed non minus calida quàm rotunda.

ARMENIACAE mali fructus, quæ  
nunc vocant mala præcocia, consimileis per-

ficis vires refert. Galenus.

ARNABO (aliis carnabum vel carnabadium, item zarnabum vel zarnabadium) ex aromatis habetur, ob quod vnguentis potissimum temperatur. Calfacit, ficit. 3. Casiæ & carpesio simile est. Vnde Possidonius, Vbi cinnamomi copia non datur, hoc vtendum esse censet.

ARTEMISIA magna ex parte in maritimis nascitur, absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus foliis, ramisque huius quidem genera duo. vnum lätius habitiúsque: foliis virgisque latioribus. alterum tenuius flore paruo, tenui, candido, graeuolente. æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellent, tenuë herbulam, simplici caule & minuto, floribus scattente, flauo colore. hæc iucundiolem quàm præcedens efflat odorem. Aegineta. Vtraque Cal. 2. sic. 1. Tenuis ad cõ substantiæ est vt renum calculos comminuat, & vteri fõmentis rectè accommodetur.

ARON, apud Syros lupha vocitatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpureum, dodrantalem, pistilli speciei. à quo croceum semen exit. radice dracunculi alba. quæ decocta estur, vt pote cū minus acris sit. Folia ad esum cõdiuntur. & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen & folia,

ἀρνάβω.

ἀρτεμισία.

Armoise

ἄρον.

Pied de  
veu ou  
serpetai-  
re petite.

dracūculi vires habent. Aegineta. Cal.fic.i.  
Substantia cōpositum est, terrestri calida &  
adstringente, radices ipsius calidiores sunt,  
dracunculo inferiores.

A R V N D O. vide Harundo.

ἄσκαρινι  
Bacara  
ou caba-  
ret nō ta-  
men est  
bacchar

A S A R V M, quod & ipsum aliqui sylue-  
stre nardum appellant, hederæ foliis, minori-  
bus multò rotūdioribusque, floribus cytini,  
hyoscyami, purpureis, inter folia proximè  
radicem emicantibus, odoratis, in quibus se-  
men acinosum. Cauliculos habet angulosos,  
asperos, & molles: radices numerosas genicu-  
latas, tenues, obliquas, gramine non dissimi-  
les, longè tamè graciliores, odoratas, excal-  
facientes, & quæ linguam vehementer mor-  
dent. Vmbrosis montibus prouenit, sed pluri-  
mū in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italiæ Iu-  
stinienfi agro. Aegineta, Similem acoro vir-  
rutem obtinet, sed magis intensam.

ἄσκλη-  
πιάς.  
Hedera-  
lis simili-  
tudine.

A S C L E P I A S, ramos emittit longos. fo-  
lia hederæ, longa: radices numerosas, tenues,  
odoratas. floris virus graue. semen securidia-  
cæ. nascitur in montibus. Aeg. Callida, sicca,  
& tenuium partium, torminibus cū vino po-  
ta competit. Venenatorum moribus, & ma-  
leficis mammarum muliebriumq; locorum  
vitiis illinitur.

ἄσκηρον.

A S C Y R V M siue ascyroides, hyperici ge-  
nus est, magnitudine distans, fructicosius  
maiores habens ramos, surculosiores, ruben-



tesque: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non abfimile. cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa androsæmum vocauere. Aegineta, Facultas eius in androsæmo prædicta est.

**ASPALATHVS**, aliis eryficeptron, frutex est furculofus, multis spinis horrens. nascitur in Iftro, Nifyro, Syria, & Rhodiorum infula. quo ad vnguentorum spiffamenta pigmentarij vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram vergès, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignofum, sine odore, quod deterius habetur. Aegineta, Diffimili constat virtute, acri & astringente, & vtraque ficcante: iccirco & putredini, & fluxionibus vtilis est.

**ALTILIS** asparagus multis ramis fruticat, foliis fœniculi, longis, numerosis: radice rotunda, grandi, spongiam habente. Cor-ruda siue fylueftreis asparagus vulgaris est notitia. Aegineta, Asparagus petræus aut myacanthinus abftergit vtique, sed calore, & frigidityte medius est, renes & iecur obftu-ctionibus liberat, præsertimque radices & semen. item dentium doloribus medetur.

**ASPHODELVS**. Vide hastula regia.

**ASPLENVN**, aliqui scolopendrion vocant, alij splenion, alij hemionium, folius est multis, scolopendre animali fimilibus, ab ra-

ἀσπάλα-  
θος.  
Rodium  
lignū, ou  
Rodoē  
offic.

ἀσπάρ-  
γος.  
offic. spa-  
ragus, af-  
parge.

ἀσπληνός  
Cercrah  
ou citha-  
rac, offi.

dicē vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque filiceis, & opacis. caulem, nec florem, nec semen habet. folia filiculæ modo diuiduntur, subter flauescētia hirsutæque, supernè viridia. Aegineta. Substantia quidem est tenui, nō tamen calidum, qua ratione calculos confringit, & lienes cōsumit.

ἄσθηρ ἄτ  
τικὸς.  
βανβώ-  
νιον.

Aspergu-  
la minor  
aliquib⁹.

A S T E R Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habēs purpureum luteūmve, & in ambitu diuisum, anthemidis modo capitulum sed ea quæ caulem ambiunt folia stellæ modo radiata, oblōga, hirsuta. Aegin. Inguinalem vocant, quia bubonibus prodesse creditur, non tantum emplastri modo imposita, verum adalligata etiā. Mixtæ est virtutis, digerentis & refrigeratoriæ.

ἄσραγα-  
λος.  
Cices  
faulua-  
ges.

A S T R A G A L V S paruus à terra frutex, foliis & ramis ciceri similis: flore purpureo paruo, radice rotundas raphani modo grādi, quæ ad natas appēdices firmas habet. nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. nascitur in ventosis, opacis, & in niualibus, eo Memphis Arcadia scatet. Radix agrè propter duritiam tunditur. Agin. Non ignauiter desiccatur, radices habet astringentes: vlcera vetusta ad cicatricem perducit. aluum fluētē radix in vino potassit.

ἄτρακτυ-  
λίσ.

A T R A C T Y L I S, spina est cnico similis, folia multo lōgiora ferens in summis virgis,

magna parte nuda asperaque, qua foeminae Cartam<sup>9</sup> pro fusis vtuntur. capitula in cacumine spinis sylvestris horrent. flos luteus: quibusdam in locis pur- offic. pureus inuenitur. radix tenuis, superuacua. Agineta. Vocatur & cnicum sylvestre, vi sic- cante & mediocriter calida. ἀγρίφα-

A T R I P L I C E M aliqui chrysolacha · ξίς. · non vocant. cognitum olus est. Duo eius ge- Atroche nera, sylvestre, & satium. coctum estur vt o- lus. Aeg. Hum. 2. fri. 1. Ventrē mollit, semen ipsius vi pollet abstersoria, vnde ictericis ex iecinoris obstructione accommodatum est. (De Chrysolachano vide infra.

A V E N A genicula quaedam habet. folio βρώμος. & stipula triticum imitatur. & in cacumini- Auoyne. bus dependentes paruulas veluti locustas bi- pedes gerit, in quibus semen cōtinetur. Aeg. Similem hordeo obtinet facultatem. Siccatur & modicē citra corrosione discutit. astrictio- nis quoq; cuiusdam compos est, vnde & alui profluuiis subuenit.

M V R I S auricula, quā myoshotida vocāt, μύσῳτα herba est caulibus pluribus ab vna radice, a- liquatenus ab imo rubētibus, & concavis: fo- liis angustis, oblongis, dorso acuto, elato, ni- gricātibus, per interualla assidue geminatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flo- re, vt anagallidis, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata.

**Vt vult** Radix illita ægilopia sanat. Sūt qui alfinen,  
**tucllius** muris auriculam vocitent. (Aegineta: nō re-  
 recenset aliam quàm alfinen suprā dictam.

B

**Βαχα-  
 ρισ.**

**Gans de  
 nostre  
 dame.**

B

**A C C H A R I S** herba frutico-  
 sa, quæ in coronas additur. cu-  
 ius folia aspera sūt, media vio-

læ & verbasci magnitudine: caulis angulo-  
 sus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum  
 asper, nō sine appendicib<sup>9</sup> adnatis: flore pur-  
 pureo. subalbicante, odorato: radicibus vera-  
 tro nigro similibus quib<sup>9</sup> odor inest cinna-  
 momo proximus. Asperū squalidumq; solū  
 amat. Aegin. Herba est acris. radicis decoctū  
 meatus obstructos aperit, vrinā & menses ci-  
 tat. folia ipsius cum sint astringentia fluxio-  
 nibus opitulantur.

**Βαλαύ-  
 σιον.**

**Des ba-  
 laustres**

**B A L A V S T I V M** sylvestris punici flos  
 est, cytino similis. Cuius cōplura genera re-  
 periuntur, candidum, fuluū, colore rosaceo.  
 succus ex eo exprimitur, hypocistidis mo-  
 do, cui adstrictoria vis inest, eadem faciens  
 quæ hypocistis, & cytinus. Aeg. Valde altrin-  
 git, sicca & frigida facultate præditum. Sum-  
 mæ cutis vlcera ad cicatricē perducit, & de-  
 stillationes cohibet.

**Βαλλοτῆ.  
 Bubloete  
 offic.**

**B A L L O T E N**, nomine alio nigrū mar-  
 rubium vocant, caules edit quadrangulos,  
 nigros, subhirsutos, complures ex vna radi-  
 ce: foliis maioribus quàm marrubij hispidis,  
 intercedente spatio, subrotūdis, graue olen-

tibus, apiastro proximis, vnde aliqui apiastrū marrubii-  
eam vocauerunt. candidi flores vniuersi ver- astrū ou-  
ticillato ambitu caulē coronāt. Aeg. Acris est nigrum  
& absterforiæ facultatis, imposita cū sale ra- marru-  
bidi canis moribus medetur. bium

BALSAMVM, arbor albę violę, licij, si-  
ue pyracanthæ magnitudine cōspicitur. Fo- βάλας  
liū rutę proximū, longē candidius, perpetuō μον.  
virens: in Iudæa solū quadam valle & Aegy- Basme  
pto nascens, his differēs modis, scabritia, p-  
ceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & ca-  
pillacea coma est, theristum vocāt, quasi de-  
messile. forassis quoniā ob gracilitatē facile  
demetatur. Aestiuus sub ortu Canis ardorib;  
arbos vnguibus ferreis inciditur, magnāq; ē  
plaga succus, quem opobalsamū vocant: sed  
tam exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plu-  
res quidē quān seni septē mve congrui cōgan-  
tur, inibiq; pondus duplo repēditur argēto.  
Succi probatio est, vt sit recēs, validi odoris,  
sincerus: non ad acorē vergens, dilui facilis,  
læuis, astringens, ac modicē mordens gustu.  
Sed variē vitiat, misto ab aliquibus terebin-  
thi, cypri, lentisci, balani vnguento: item su-  
fino, metopio, melle, aut Cypria cera liqui-  
da. quod maleficiū facilē deprehenditur.  
Namq; merus in laneam vestem fusus, neq;  
maculā facit, neq; si eluatur notā relinquit:  
vitiatus autem inhæret. & lac instillatus coa-  
gulat, quod adulteratus non efficit. Quine-

tiam sincerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloréque lactescit: vitiatuſverò olei modo innatat, ſe conuoluens, aut in ſtellæ modum diffundens. Sinceruſ ſenſcens craſceſcit, deteriorque redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum peſſum ire, & ad ima ſidere arbitrantur, poſtea diſſipatum ſupernatant. E ligni genere, quod xylobaſamũ vocant, probatur recēs, ſarmēto tenui, fulium, odoratum, quadam tenuſ opobaſamum ſpirans. Neceſſariuſ etiã ſeminis erumpit uſuſ. quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderoſum, mordens guſtu, feruens in ore, modicè opobaſamũ olens. Adulteratur ſemine hyperico ſimili, quod à Petra oppido defer-  
tur. Sed coarguit magnitudine, inanitate, vi-  
zium ignauia, ſapore piperis. Aeg. Baſami,  
quod veluti lignum eſt ſiccatur & cal. 2. Subti-  
lem habet ſubſtantiam. liquor autem multo  
tenuior eſt: fruſtuſ proximè hunc virtute ac-  
cedit, ſed minus tenuiſ eſt.

τραπωλό

γεν.

Herbarij

ab hac a-

lia oſten-

dūt, nō ſi

ne errore

Βελ-

λίου.

**B A R B V L A** hirci, quæ ab aliis come vo-  
catur, breui eſt caule: foliſ croci: radice lon-  
ga, dulci ſupina: magno ſuper caulem caly-  
ce, è cuiuſ ſummo ſemen nigrum dependet,  
vnde nomen inditum eſt. herba eſu apta eſt.  
(Aegineta nō memorat.) Vide plura in Tra-  
gopogone.

**B D E L L I V M** alij bolchon appellāt, alij  
madelcon lachryma eſt ſaracenica arboriſ,

Probaturn gustu amarũ,translucidum,taurini glutinis in morẽ.intus pingue,liquefcẽs facillẽ,ligni ac sordis expers suffitu odoratũ, vnguĩ simile. Est etiamnũ bdellij genus sordidum,nigrũ,vberiorib.glebulis in offas cõuolutum,aspalathi odõre,ex india aduectũ.defertur etiam à Petra oppido siccũ,resinosum liuescens, sed facultate secũdum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatũ non perinde gustui amaritudinẽ representat, nec vsq; adeò suffitionibus odoratũ. Aeg. Tum Scythicũ, tum Arabicũ scirros emollit, præsertimq; recentia. Arabicum verò vrinẽ ciendæ est, calculos comminuit, maturatque.

**BELLIS**, qui & bellius dicitur, flos est pratenfis, pastilicãtib; quinquagenis quinis barbulis coronatus. Plinius.

**BETA** duorũ generũ est. è quibus nigra coquitur cũ lenticula, vt ventrem sistat. quod magis radice eius præstatur. cãdida aluo utilis est, vtraq; tamen propter nitrosum humorem, quẽm habet in se noxii succi est. Aegin. Nitrosam vim habet, qua abstergit, discutit, per nares purgat. Alba elixa plenius, inflãmationi arcẽdæ fit idonea, modicũmq; discutit.

**CESTRON** psychotrophon vocitatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini betonicam appellant. herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, quadratũ: folia quercus mollia, longa, in ambitu

βέλλιον  
Marguerites

πιβύλλον  
Bette ou  
iotte ou  
poree

βιτονική  
Betõgne  
ou be-  
toine

diuisa, odorata, prope radicem maiora, in summis caulibus, semen veluti satureiæ spicatum inest. Aegin. Betonica herba est ramulis exilibus, pulegio similibus: sed tenuioribus, & propemodum si gustes, nullam qualitatem referentibus. Nas citur potissimum locis petrosiss, qua & in renum medicinis vtutur. Est autem apud Romanos alia quædam betonica dicta, quam Dioscorides nominat cestron, alij verò ptychotrophon, eò quod frigidis locis gaudeat, nihil simile cum prædicta habet, præter actionem. Vrinam ciet, & aliis multis benefacit, potissimumq; radix ipsius cum hydromelite pota vomitionem mouet, folia aluum subducunt.

*ἄμυγς.*  
Bouleau

B E T V L A Gallica est arbor, folio fagino, paulò angustiori, cortice versicolore, materie læui, non nisi ad baculos vtili, mirabili candore atq; tenuitate, terribilis magistratuū virgis, eadem circulis flexibilis: ite corbium sportis & ligaturis vtilis, scopisq; Bitumen ex ea Galli excoquunt. gaudet frigidis. Scutis item faciundis apta, quod plaga contrahit se protinus, clauditq; suum vulnus, & ob id contumacius trāsmittit ferrum. vsus eius inter medicos adhuc nullus est.

B L A T T A R I A adeò similis verbasco est, vt sæpe fallat pro ea capta, foliis minus cādidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta blattas in se contrahit, ideoq; Rom.



blattariam vocant. Plin.

BLITVM estur oleris modo. aluo vtile est, βλίτονι  
nullius in medicina vsus. Aeg. Hum. frig. 2. Blette ou

BOLETI fungorū generis sunt, reliquis espinars  
minus nocentes, qualitatis expertes, si probè Potiron,  
coquantur, secus periculi occasionē præbēt. champi-  
Amanitę dicti secundum ab his ordinē obti- gnon  
nent. Aliis fungis abstinendum, pleriq; siqui-  
dem ipsorum lætales. Aegineta.

BOTRYS fructicosa herba est, lutea tota, βότερε  
& in multas alas sparsa. semen circa totos ra- Du py-  
mulos provenit: folia cichorio similia. tota men  
suauem odorem spirat: quare vestimentis in-  
terponitur. inuenitur in torrentium ripis, &  
conuallibus. Pota orthopnœas mulcet. Hæc  
Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemi-  
siam. (Idem apud Aeginetā, nec plura.)

BRASSICA quæ edendo est ficcata, & κράμβη  
māducata, & à foris imposita, nō tamen acré Choulx  
cōspicue vim ostendit, eoq; vulnera glutin-  
at, & dolosa malignaque vlcera, ac tumores  
solui contumaces perfanat. habet & iam nō-  
nihil absterforiū, quo lepras exterit. Semen  
ipsius potum lumbricos occidit, præsertim  
Aegyptiæ. Caulium crematorum cinis ad-  
urente vi constat, cum adipe longis laterum  
doloribus vtilis. Aegineta.

Marina BRASSICA à fatiua prorsus ab- κράμβη  
horret, quod folia ferat rotundæ aristolochię, θαλαρία  
prælonga, tenuia. singula à ramulis rubētibus Soldana  
vulgo. vulgo.

excūt, singulari vt hedera, pediculo. albo sue-  
co prædita est, sed paucō, falso gustu, & ali-  
quantum amaro, pingui concretu. Herba in  
totum stomacho inimica, acris vehementissī  
mē aluum ciet, in cibo cocta. coquitur pro-  
pter acrimoniam cū pingui carne. Aeg. Sub-  
salsa leuiterque amara aluum soluit.

αἰσάμβη  
ἀγρία,

Syluestris **B R A S S I C A**, maritimis præ-  
ruptisq; locis, magna ex parte gignitur: fati-  
uæ similis, sed candidior, hirsutiorq; amara,  
cuius cyma in lixiuia cocta ori nō insuauis.  
Folia illitu vulnera conglutinant, & inflam-  
mationes tumorésque discutunt. Aegin. Sa-  
tius in omnibus validior est, vnde nec intra  
corpus citra noxam sumitur.

βρίτανι.

κη.

Quibus-  
dā lapa-  
thū acu-  
tū, qbus  
dam bi-  
storta

**B R I T A N I C A** aut vetonica, folia habet  
syluestris lapathi: sed nigriora, & densiora,  
gustu adstringentia, radicē tenuem & breuē,  
caulem parū emittit. Foliis exprimitur suc-  
cus, qui igni aut sole cogitur. Aeg. Astringit  
& conglutinat, succus ipsius putredines os  
infestantes persanat.

βούλωσ  
σος.

Bocache  
ou lague  
de beuf

**B V G L O S S V M** nascitur in cāpestribus,  
& sabulosis. Iulio mense colligitur, verbasco  
simile est, foliū in terra sparsum, nigrius, aspe-  
rum, bubulas imitans linguas. Aeg. In vinum  
deiectum, animi voluptates auget. Humidū  
calidūque temperamento est.

βουλάπα  
θου.

**B V L A P A T H V M** à reliquis radicis tantū  
altitudine differt, efficacis erga dysentericos

effectus, si bibérint ex vinò.

oil de

**BULBINA** foliis est porraceis, flore violæ purpureo, siue ferrugineo in spicis, nigro semine foris, rubicundo radicis bulbo, in-  
tus candido, squamis carente. Bulbinas Di-  
philus tradit meliorem bulbis creare suc-  
cum, non tamen ita gratas utilisque stoma-  
cho, quod dulcescentem in se quadam crassi-  
tiem contineant.

beuf

Βολβίνη

Buberi-

gim

Esculentus **BULBUS** vulgò cognitus, à nobis estur. stomacho & aluo utilis rufus, qui & ex Aphrica defertur. amarus verò & scillinus, stomacho aptior est, & concoctio-  
nem adiuuat.

Βολβός

ἰδιώδης

μος.

Eschalo-

te.

**BULBUS** quem vomitoriū vocant, folia habet lentiora multo & longiora quàm bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctū eius potū, vesicæ malis medetur. vomitiones mouet. Aegineta. Multo calidiorem vim quàm esculentus repræsentat.

Βολβός

ἰμερικός.

**RVNIVM** caulem emittit quadrangu-  
lum, (aliàs additur procerum, digiti crassitu-  
dine) & in eo foliosos ramulos, tenues, præ-  
tenuibus foliolis & flosculis scatêtes, longi-  
tudine digitali: folia propter radicem, apio  
similia, sed multo tenuiora, & quæ modo  
quodâ folia tribuli (aliàs coriandri) imiten-  
tur: flores anethi: semē odoratū, minus hyos-  
cyamo. Alibi sic describitur, Pseudobunion

Βούνιον.

herbe ou

charpen-

tier.

palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferēs, acri gustu. Aeg. Bunion, quod alij arctiū appellāt, calidum est, vrinae & mensibus educendis accommodatum. Huic respondetur & pseudobunium.

Βούφθαλ-

μους.

Oil de  
beuf ou  
pisse en  
liq̃.

B V P H T H A L M O N, quidam cachlam vocant, tenues emittit cauliculos, mollēsque. folia foeniculi: luteū florem, anthemide maiore, oculi similitudine, vnde nomen traxit. circa oppida nascitur, & in campestribus. Aegineta. Acriorem anthemide florē gerit, ideo & discutientem, adeo vt cerato mixtum duritias remolliat.

Βλούπλιω

ρως

B V P L E V R V M olus est, sponte nascēs, caule cubitali, foliis multis longisq; muscario anethi. Laudatur in cibis Hippocrati, & Nicandro in medicina. Semen cōtra serpētes valet, item radix in vino, ampliusq; vrinae ciundae. folia ad secundas foeminarum vel succū ex vino linunt, & strumis cū sale & vino.

Βούτο-

μος.

Iuncaca  
bas.

B V T O M V S frutex est palustris, caule, in offensissimo, peculiari quodam laeuore, folio arundinis, angulari, fructu nigro, mali magnitudine, fide proximum: sexu duplici, mas, foecūdus: foemina vitiliū ad nexus utilis, pars ab radice tenera manditur, puerorū cibo grata, vbiq; ferē in paludibus nascitur, quanquā humore & terra gaudeat. in Orchemenico lacu plurimus. Democritus ei folia irinis, p̃xima tribuit, ex vna radice nō singu-

latim, sed vt frutices scaturientia, quibus bo-  
ues iucundè vescantur, vnde nomē ei datum.

**B V S E L I N V M** differt breuitate caulis à *Βουσίλειον*  
satiuo apio, & radicis colore rufo, peculiare *νον*.  
contra serpentes potum & litum.

**B V X V S** arbor nota est, eius granum car *πίξος*.  
thego vocant. Nullū in medicina vsum præ. *Βοίχ*.  
bet: folio tantum cum materiei scobina, & li  
xiuo capillum rufant.

## C

**A C A L I A**, quę leontice vocatur, fo *κακαλία*  
**C** lia fert magna, alba, è quib<sup>9</sup> medi- *Carui*  
us caulis emicat, rectus, albus, florē *faulage*

ferens robori aut oleū similē. nascitur in mon-  
tibus. Grana quę post excussū florem inna-  
scuntur, trita & cum cerato illita faciem eru-  
gant, & cutem extēdunt. Aeg. Viribus & vsu  
cum cancano cōuenit. Cancani autem radix  
modicē siccatur, & sine morfu illitionibus ac-  
cōmodata, cum vino subacta linctāq;, arte-  
rię scabriciem iuuat.

**C A C T V S** est cinara, siue carduus altilis. *κάκτος*

**C A L A M V S** odoratus in India nascitur, *artichaut*  
melior est fuluus, dense geniculatus, & qui *κάλαμος*  
assulose frangitur, plena araneorum fistula *άρωματ*  
albicans, lentus in mandendo, & astringens, *κός*.  
accum aliquanta acrimonia amarus. Aegin. *calamus*  
Cal. sic. 2. inest ei quippiam subtile, & astringens. *offic*.  
Vrinam ciet. Stomachicis, tum quę vte-  
ro & iocinori faciunt medicinis temperatur.

Ancho-  
lies.

CALATHIANA munus autumnū,  
violę ceterę veris. ea minuto est folio, violę  
albę non est dissimili, in totum sine odore ca-  
lathi similitudine, autumnno tantum proue-  
niens, tanta coloris pulchritudine, vt cęru-  
leum ipsum, quod imitatur, prouocet. in pra-  
tis post æstatē emicat, autumnalem violam  
nominant. Plin.

Percepi-  
erre.

CALCIFRAGA empetrum est.

Soulcy.

CALTHA proxima calathianę est cū  
colori amplitudine, vincit numero foliorum  
marinam quinq; folia non excedentem. Ea-  
dem odore superatur. est enim grauis caltha  
non leuior ei quam scopam regiam vocant,  
quāquam folia eius oleant. Vergil calthā lu-  
teolo cecinit colore tinctam. nec Plin. ab eo  
dissentit. Hinc & calthula, vestis gen<sup>9</sup> dicitur.

αλαμίν  
θη.

calamēt.

Poliot

sauiage

Offi. ne

peta vul

go h rbe

au chat.

Ex CALAMINTHAE generibus  
quedā mōtibus familiaris, folia ocini habēs  
incana, surculos aridos, & caules angulosos,  
purpureū florē. Altera pulegio similis est, sed  
maior, quā syluestre pulegium ideo appella-  
rūt, q̄ odore ipsum æmuletur. nepetā Latini  
vocatāt. Tertia mēthastrea cognata est, foliis  
oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄  
superioris, sed viribus inefficacior omniū fo-  
lia gustu impensē feruentia & acria, radix su-  
peruacua, nascitur in cāpestribus, asperis &  
aquosis. Aeg. Cal. sic. 3. Tenuis & acris est, mē-  
tha longē valentior. Siquidē est veluti sylue-

stris méthæ. E profundo attrahit, sudores mouet, totum corpus digerit. Rigores febrium qui circuitu remeāt finit extrinsecus cū oleo infricata strenuè. Coxarum dolores soluit vitiosos humores in cutē erūpētes abstergit.

CANARIA humilis est herbula, foliis κύνωψ  
tritici, multo minoribus, calamulo tenui, herbe au  
niculis pyxidatim cohærentibus, articulado, chien.  
internodiis modo tiliarū in se infarctis, quæ  
tracta suis è vaginulis exerūtur, euanida spi-  
cæ loco panicula, ita vt folio & culmo triti-  
cū, cacumine arundinē æmuletur. Hanc in-  
uenerunt canes qua fastidiū deducant, eamq;  
in nostro cōspectu mandunt, sed ita, sicut est  
Plinius author, vt nūquam intelligatur quæ  
sit: etenim depasta cernitur. Notata est ani-  
malis huius malignitas in alia herba maior.  
Percussus enim à serpente mederi quadam si-  
bi dicitur, sed illam hominine inspectante  
non decerpit.

CANCAMVM Arabici ligni lachry. κάννα  
ma est, myrrhæ quodammodo similis, virosi μυρ  
gustus, quam ad suffimenta vsurpant. Vestes  
eo ex styrace & myrrha suffiūtur. Aeg. Odo-  
ris est grati, vis eius obesos extenuare abster-  
gere, & aperire obstructa.

CANABIS fatiua planta magni in vita κάνναβις  
vsus ad robustis. funes factitādos: foliis fra- Chanure  
xini, graui odore caulib. proceris, inanib<sup>9</sup>, se-  
mine rotūdo. Aeg. Semē flat<sup>9</sup> discutit, ad cōq;

ficcat vt largiore cibo genituram extinguat. Succus ex ea recente, conuenienter aurium doloribus instillatur. Syuestris cannabis virgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem equantes: folio fatiua, nigriores & asperiores, flore lychnidis, subrubro: semine & radice althææ. decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorum dissipat. huius cortex torquendis funibus accommodatus.

CANOPON sambuci flos est.

herbe ou  
couleu-  
ure.

CANTABRICA in Hispania inuenta est, per Diui Augusti tēpora à Cantabris reperta. Nascitur vbique, caule iunceo, pedali, in quo sunt flosculi oblongi velut calathi, in iis semen perquam minutum. Cantabriam Hispaniæ regionem hodie Biscaiam vocant. Eius radice drachma in vini hemina sæpius bibenda contra serpentium morsus.

καφουρα  
offi. cam-  
phre.

CAPHURA arbor in India tanta magnitudine visitur, vt sub eius vmbra hominū centuriæ cōdi possint. Nascitur in montibus ini bi mari vicinis, materiæ leui, ferulacea, quæ gummi aut lachrymam fundit, eiusdem quo arbor nominis Ex hac caphurelæum fit quo verum mentiri balsamum audent. Caphuræ multa genera, vnum impurius in interueniis ligni modo lamellarum impactum figitur: aliud foras emergit, & arboris corticibus hæret, maculis inter initia rubentibus, postmo-



dum vel calore solis extoſtum, vel ignium vi candescit, Riachinam indigenæ vocant. cæteris bonitate & tenuitate præſtat longiorique durat tempore: nam & atra ei fuſca reperiuntur. Rudis eſt, nullam vim ignis experta, elaborata verò, quæ ignium ardore album contrahit colorem, in laminas pelluentes diſta. Caphura frig. ſic. 3. Capitis ex calore dolores, & incandefcentes inflammationes reſtinguit, præſertim quæ iecur male habeant. Renes & ſeminaria vaſcula refrigerat, ſanguinemque cogit Addunt aliqui ſomnū conciliare: ſed cauendus eius nimius uſus, quoniam peruigilia tandem adferet. Sanguinem naribus profluentē ſiſtere cū ſucco vuæ acerbæ impositam ventrē ſupprimere. Canitiem erebro uſu accelerare: ægrotationes parere frigidas.

**FUMARIA** fruticoſa herbula eſt, prætere καπνος  
nera, coriandri ſimilis, foliis candidioribus, Fume  
vndique numeroſis, cineracei coloris: flore terre.  
purpureo. Aeg. Fumaria inde nomen ſortita eſt, quod ſuccus ipſius copioſas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem. Acris amarâque eſt, vnde vrinas bilioſas liberaliter prouocat, iocinoris obſtructioni languorique medetur, ſtomachum cōfirmat & aluum emollit.

**CAPNOS** alia Plinio deſcribitur, quam Pied de  
pedes gallinaccos vocant, naſcens in parieti- gelinc.

nis & sepibus, ramis tenuissimis sparsisque,  
flore purpureo, viridis, succo caliginē discu-  
tit, itaq; in medicamēta oculorū additur. Si-  
milis & nomine & effectu alteri iam dictæ.

καππα-  
ρις.  
Capres.

CAPPARIS aculeatus frutex est, qui in  
terra stratus, magis in orbē euagatur. spinas,  
ut rubus, habet, in hami modū adūcas: folia  
mali cotoneæ, rotunda: fructū oleæ similem.  
qui cū dehiscens pādatur, florē candidū pro-  
mit: quo excusso, nō nihil glandis oblongæ  
figura inuenitur, quod apertum grana acinis  
punicorum similia ostendit, parua, rubicun-  
da. radices lignosas spargit, grādes numero-  
sæq;. Tenui solo, asperisq; locis, in insulis &  
iuxta rudera nascitur. caulis & fructus, cibi  
gratia condiuntur. Aeg. Radix extergit, pro  
bè purgat, incidit, discutitq; tum amaritudi-  
ne, tum acrimonia: acerbitate verò cōtrahit,  
stringit, & dēfat. Lienes induratos pota & ex-  
trinsecus imposita iuuat, menses promouet,  
pituitam per os educit, maligna vlcera sanat,  
dentium dolores sopit, tumores digerit, & vi-  
tiligines, quas alphos dicunt: aurium vermes  
enecat. folia autem & fructus similem quidē  
sed imbecilliorē vim possident.

καψικόν.

CAPSICON Arabici cardamomi genus  
videtur, recentioribus Græcis appellatum,  
quod semina in ordinē digesta, quibusdam  
thecis inuoluentibus cōgerantur ceu capsis.  
Actuarii, Distēdentes spiritus discutit, cru-

ditates concoquit.

CARDAMOMVM optimum est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoróque deuehitur. In India quoq; & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, farctumq; . quod enim huiusmodi nō est, exoletum iudicatur, & gustu acre, subamarū, & odore caput tentans. Cardamomum frutex est amomo non dissimilis, odoratus, oblongo semine & anguloso. Quatuor eius fastigia, viridissimum ac pingue, acutis angulis, contumax frianti, quod maximè laudatur. Proximum è rufo candicans. Tertium breuius atq; nigrius. Degenerat variū, friabile, odorisq; angustū. quod verius est vicinius esse costo debet. Aeg. Acre quidē & ipsum est, verum nasturtio inualidius. Compos est etiam nonnullius amaritudinis, qua lumbricos ingerimit, & scabiem cum aceto exterit.

CARDAMOMVM aliud hodie Mauritaniae proditum habemus duplici differentia. Maius alabastris rosę corticeis tradūt, in quibus semina lētis magnitudine, angulosa, pingua, odorata, suo mordaci gustu linguā vellicātia. Minus inuolucris seminū minoribus & siliquulis, cādida intus carne, minore odoris fragrātia, granulis obnigri ciceris amplitudine. Frutex ipse cubitalis est caule quadrāgulo, leniter striato prodeuntibus, geniculatim & surculis & frondibus, hortensi solano

καρδάμωμον.  
Graine  
de paradis.

Carda.  
momum  
& syluestre caros  
Corda  
persis.

non dissimilibus flore luteo, dependent ab alarum sinu alabastrum rosarum crassiore pediculo, in mucronem sensim turbinati, per initia virētes, maturi quātm ruberrimi, vetustate punicei, cute leui relucente, quæ femina includit candida, in vix modum cōvoluta, lenti similia: ea per se cū valvulis gustata igneum feruorem repræsentant. Vtrunque calfacit, roborat, discutit, extenuat. Sacolla apud Arabes maius, hilbane minus.

σκόλυ-  
μος.  
artichaut  
sauuage

C A R D V V S, Græci scolymon vocant folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. caulem longum edit, foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graucolentiam alarum totiusque corporis emēdat. item si decocta in vino bibatur. copiosam autem vrinam fœtidāque expellit. herba cum recens tenescit, in olea, asparagi modo, transit. Aeg. Cal. sic. 2. Reliqua sunt eadem Dioscoridi.

κάρπα-  
σον

C A R P A S I succus soporem epotus, citāque stranguationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicuræ remediis. Dioscorid.

καρχή-  
σιον.  
cubebe  
ou cōbe-  
be offic.  
Carpier

C A R P E S I V M odoratum est & tenue, viscera obstructionibus liberat, vrinās mouet, & renes calculo laborantes purgat. Aeg.

C A R P I N V S tractabilis est, aptaque iugis, vnde Græcis *ζυγίαν* appellare libuit.

Hanc

Hanc aliqui aceris generibus ascribunt, sepa-  
rant alii. In montibus nascitur, flaua crispâq;  
materie. Et ipsa & acer amplæ sunt, platano  
in findêdo similes: sed carpinus est gracilior  
macilentiorq;e, longior atq;e mollior, venis  
in longitudinem fluctuantibus, vndosa, fissi-  
lis, segmētis omnibus in acutum compressis:  
minus tamen quàm pro magnitudinis ratio-  
ne neruis exūdat. Auctu facillima, paulo an-  
tè æquinoctium germinat: post messem & ar-  
cturū cæditur. Durissima eius materies spif-  
saq;e. Itaq;e postquam terebrum experiatur,  
macerant, quo facilius mollescens perforari  
queat, lectis & sumptuosioribus fabricis iu-  
gisq;e nascens. Nullum eius in medicamen-  
tis vsum legi.

CARYM semen est vulgaris notitiæ. ra-  
dix cocta, pastinacæ modo, manditur. Aegi. καρύος.  
Carui.  
Cari semen calefacit, siccatur 3, ferè gradu, fla-  
tus digerit, vrinam mouet, idque non semen  
duntaxat, sed etiam tota planta.

CARYOPHYLLON frutex in oriente καρύο-  
φυλλον  
Clou de  
giroffle.  
nascitur sambuci forma, semine grano pipē-  
ris grandiori fragilioriq;e, ex atro rufescente  
in clauī modum capitato. Sunt qui represen-  
tent buxi caudice, lauri folio, sed rotundio-  
re. Aeg. Non eam habet naturam quæ nomi-  
ne prætenditur, sed ex India veluti flores cu-  
iusdam arboris festucacei & nigri sunt, longi-  
tudine ferè pollicis, odorati, acres, subamari.

Cal. sic. 3. ferè gradu (vel vt Aëtius, 2.) Multus eorum erumpit vsus, non ad obsonia modò, sed ad multa quoque medicamenta. (Sic enim legit Ruel. Græca autem æditio habet, ἀπολύχρησά ἐστιν ἐν ὅψατε καὶ ἐτέροις φαρμάκοις)

κασσία,  
Casse.

CASSIA, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiã gignitur, crassi corticis sarmento, foliis piperis, eligenda est fuluescens, pulchri coloris, corallii æmula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquãto feruore astringēs, aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis, achî appellatur: ab Alexãdriæ negociatorib. daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Museletico blasto, id est, germi ni cognomen est. Reliquæ viles, & quæ apheum dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca & citto vocitatur barbaro nomine. Similior huic est, pseudocasia, quæ vt explicari possit. quæ gustu coarguitur, cū nec acris, nec odorata sit, heretẽmquẽ medullæ corticẽ habeat. Inuenitur etiã lata quædã fistula, mollis, lævis, surculosa. quæ antedictæ præfertur. Damnatur cãdicās, scabra, hircinũ virus redolens, & quæ tenui fistula ea scabra cute sit. Aeg. Cal. sic. 3. ferè abscessu, tenuis a-

bundè, acris & modice astringēs. incidit igitur simul & discutit, robúrque instrumentis adiicit, postremò & menses euocat.

CASSIA fistularis seu nigra recentioribus Græcis appellatur, quibusdam indica canna arbor magna, iuglâdis folio, fistulis prælongis ac teretibus, vtrinque fastigiatis, colore rubro nigricantibus, duùm ferè pedum proceritate, nigra intus carne, gustu prædulci, ossibus filiquarum, ligneis distinguētibus membranis. Partim in India, partim in Aegypto nascitur, iam Asiæ communis facta. Deligere oportet pōdērosam, collucētē, per plenā, quā si concusseris, inclusa intus grana non obstrepant. Cal. hum. 1. flauā bilem per aluum detrahit. intemperati iocinos calores ea refrigerantur. prodest eis, qui per naturam pallore decolorantur, anginis, laterum doloribus, & pulmonariis.

CASSAMYM aliqui fructum balsami interpretantur. Aeg.

CASTANEA. vide Glandes Sardonæ.

CASSYTHA Græcis recentioribus Plinio Syriaca voce cassytas dicta videtur, herbosus fruticibus circumuoluitur, opere topiario per vertices rotata, proxima quæque veluti clauiculis implicat, sine radice, foliis vidua, flore albo, semine scatens tenui, cirris purpureis. Cal. 1. siccat 2. Subamara est iniecta vino, temulentia causa traditur. abster-

κακίαι  
συριγγώ  
δης.  
Cassie fi-  
stule off.  
lignea

κακύντας  
off. cuscutha. gou-  
te de lin  
vulg.

git, substringit, roborat. iecoris & lienis impedimenta laxat. flauam bilem per aluum exigit.

*καταναΐ*  
*αν.* herb. bistorta. Ex eo genere vna, folia coronopi habet, longa, radicem iunci modo prætenuem: capitula sena, septenave, in quibus erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milui exanimati. Altera mali parue magnitudinem explet, radice exigue oliuæ magnitudine: foliis quoque oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen, vt cicer, minutim in virgulis dependet, punicei coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his vti traduntur.

*καυκαλ*  
*λιν* Persinba stard CAVCALIS, quam alii sylvestre daucum vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: foliis apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisque: candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum coctumve olus estur. vrinam mouet. Aegineta, Dauci modo calefacit, siccatur, vrinam mouet, repositaque conditur.

*κεδρος.* Cedre. CEDRVS arbor magna est, ex qua picæ colligunt, quæ cedria vocatur. iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris. quæ dum effunditur gut-



ratim non dissipata coit. Cui ea vis inest vt  
 defuncta corpora conseruet, & viuentia cor-  
 rumpat. qua ex causa mortuorum vitam ali-  
 qui appellauere. vestimenta quoque & pel-  
 les, eximia calfaciendi & siccandi dote, cor-  
 rumpt. Fit & oleum, à cedria separatū, dū co-  
 quitur, velleribus supra halitū eius expansis,  
 vt in pice. Eiusdem ad omnia vsus. Cedrides  
 Cedri fructus vocatur. Aeg. Cedrus & frutex  
 iunipero similis & arbor est, ambo cal. sic. 3.  
 Cōfectū ex eis oleū, quod cedreā, seu liquo-  
 rē cedrinū appellāt, etiā quartū ordinē attingit,  
 subtilis admodū substantię: hinc teneras  
 carnes expeditē, & citra dolorem exedit, du-  
 ras autē pręsertimq; de mortuas siccāt, & à pu-  
 tredine asserit, pediculos, pulices, ascaridas,  
 & aurīū vermes interficit, aliāq; plura facit.

κεδρίδης

CELASTRVS æterna coma frondet, in  
 planis exilit, inibiq; omniū tardissimē suos  
 perficit fructus. Horret cultum, quē si quan-  
 do patiat, degenerat. Summis gelidissimif-  
 que gaudet locis. Vsus eius ad baculos & sci-  
 piones. Theop.

κηλαστρος

CENTAVRIVM magnum folia habet  
 iuglandis, oblonga, viridi brassicarū colore  
 ferrata in ambitu: caulē, ceu rumicis, binūm  
 aut ternū cubitorum, multis ab radice ad-  
 natis, in quibus capita, ceu papauerū, in ro-  
 tunditate oblonga: flos cœruleus: semē cnico  
 simile, ceu laneis floccis quibusdā inuolutū,  
 d iiii

κενταύρου  
 μέγα.  
 huius ra-  
 dix i offi.  
 rapōtici  
 noie ostē  
 ditur ma-  
 gno erro-  
 re.

radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum astrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. copiosissima est in Lycia & Pelopònneso in Arcadia, Elide & Messenia, pluribúsque locis circa Pholoën, Lyciam & Smyrnam.

*κενταύριον μικρόν* CENTAURIUM, limnesion aliqui vocant, cauere, quoniam rigua amet loca. herba offic. centaurii aut hyperici similis, caule ægulofo, palmaria minimum excedente: flore lychnidis, è puniceo. alijs in purpuram vergente: foliis rutæ, prælongis, si de ter & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, re, alijs læui, & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Aegineta, Centaurij maioris radix acris, calida, & terreæ astrictiōis cōposita. Menses itaque promouet, foetus corrumpit, mortuos eiicit, vulnera glutinat, sanguinem spuētibus & reliquis pectoris vitijs præsens est remedium. Minoris cetaurij radix inefficax est, coliculi validè & citra morsum siccant, vnde nō solum ad quæ maius centaurium valet, sed etiam coxendice laborantibus ipsius decoctū inferius iniectum biliosa vacuat, nonnunquam & cruenta, mirumque in modum iuuat.

*κερόμυον* C E P A longa acrior est quàm rotunda, ite  
*ον.* flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, &  
*υποοιγνό* cruda quàm cocta, aut sale condita. Aegineta. Cal. 4. Substantiæ crassioris est, quamob-

re hæmorrhoidas appositu aperit: abstergit, vitiligines, alphas dictas, cum aceto exterit. defluos capillos ocyus olcyonio restituit. Succus oculis suffusus, aut crassi humoris vitio hebetibus auxiliatur.

**CERAE** a portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Aeg. Folia ipsius cōtra vesicę scabiem vtiliter bibuntur. Radix cum asparago myacantho pota vrinæ stillicidia, quæ oppleto vrinario meatu sunt, abigit. κηραια

**CERASIA** dulcia quidem citius dilabuntur, austero stomacho vtiliora sunt: acida vero ob suā incidendi vim pituitosis excrementosisq; stomachis prosunt. Gūmi verò cerasi arboris, faucibus exasperatas leuigat, & calculo laborantibus cum vino potum succurrit. κηράσια  
Cerises,  
merises,  
Guines  
ou Guin  
doles.

Aeg. (Chamæcerasum infra dicemus.)

**CERINTHE** herba propter apes ferenda quibus est gratissima, folio candido, incuruo, cubitalis, capite concavo mellis succū habente. Hanc Virgilius ignobile appellauit gramen. κήρινθος  
Pasquete

**CERRVS** ægilops, quercus species est populo similis, caudice recto, excelsa, laui, & per longitudinem robustissimo, materie alioqui improba, nec nisi ærariorū officinis carbone donata. Quod enim cessante flatu statim extinguatur illis compendio est, nec nisi paucis absimitur, sic tamen plurimis αίγίλωψ  
Herre ou  
hedre.

scintillis diffiliens. Glans illi tristis, horrida, echinato calyce castaneæ modo: itaq; à nullo præterquam à sue manditur, nec nisi aliorum inopia: cum alioqui solidam duramque gignat carnē. quare suem cerrea glans diffusam quidē sed grauē facit. E glandiferis vna fert panos arentes: muscoso villo, canos non in cortice modo, verum & è ramis dependentes, cubitali magnitudine, odoratos, sphagnon siue splachnon siue phascon appellāt, item bryon: nostri penem, Syri vuam dæmonum. Eadem ferè omnia Theophrastus Macedonicæ cerro, quam asprida nominat, tribuit: quæ ægilopi cerro Plinius ascribēda existimat. Cerri folia, & cortex & glans siccant collectiones, fluxiones sistunt. Torpētes mēbrorum partes corroborat decoctum eius fortu: cui & insidere expedit siccandis astringendisque partibus. Radix aduersatur scorpionibus.

καπρίδα.

9

α.

καμάρβατος.

CHAMAEBATVS, humi sparsus est rubus, radices quæ tellurem tangit agēs, vbi nihil est propè quod vncis aculeis subeat.

καμάρβαντος.

CHAMASCERASVS pumila est, in Bythinorum agro frequens, radice parua: neque arbor est, nec arbusculis cerasorum impar, baccis cætera omnia consimilibus. Copiose vestientibus caput vini modo grauant. Sed hæc, vt Athenæus refert, de memæcylis intelligi possunt. Nam ex his, id est, arbuti

baccis: si quisquam plus septē esitarit, caput eius dolore tentabitur.

CHAMAECYPARISSVS herba ex vino pota cōtra venena serpentium omnium, scorpionūque pollet.

CHAMAECISSOS, folio est hederæ, tenuiore, longiusculo. ramulis à radice quinifenisve, dodrantalibus, foliosis, flore violæ albe simili, cādidiore, ac tenuiore, gustu supra modū amaro. radice tenui, cādida, inutili. na scitur in cultis. Aeg. Flos iecorum meatus adaperit, item contra coxendicum dolores exhibetur.

CHAMAEDAPHNE virgas emittit cubitales singulari ramulo constantes, rectas, tenues, læves: folia lauri similitudine, læviora multo, ac viridiora: semen rotundum, rubens, annexum foliis. Aegineta. Cōsimilem laureolæ seu daphnoidi, & Alexandrinæ lauro vim habet.

CHAMAEDRYS, quære Triffago.

CHAMAEDROPS, quidam & hāc chamæmedryn, alii teucrion vocant: viribus chamædryi respondet. Aegineta.

CHAMAEPITYS. quære Ainga.

CHAMAELEON albus, ixia ideo aliquibus vocatur, quòd quibusdam in locis viscum circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche vtūtur mulieres: folia habet sylibo aut carduo similia, asperiora, acutiora, ni-

χαμαικν

πάριος

Cypres

de iardin

χαμαι-

κίος.

Lierre

terrestre

χαμαι-

δάφνη.

Laurcole

Chesnet

te ou ger

mandree

καμαι-

δρυς.

καμαι-

λέον

λευκός

Carlina

ou Car-

dina.

groque chamæléone validiora. caulem non promit, verum ex medio spinas, echini marini, aut cinare modo, erigit. flores purpureos, veluti papporum lanugines emittit: semen cnici simile: radicem in latis collibus crassam: in montosis verò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore dulcem.

Χαμα-  
λέων μέ-  
λας.  
Cardo-  
nette

CHAMÆLEO niger, foliis scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraque, ac rubro distincta viderentur. caulem emittit do-drantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores: radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Quare chamæleo vocetur, à varietate foliorum cuenit. mutant enim cum terra colorem: hic viridia, illic albicantia, alibi cœrulea, nonnusquam rubra inueniuntur. Aegineta. Nigri radix cal. sic. 3. prope-modum ordine, abstergit, cutis labes exterit. duros tumores dissipat emollitque. Phagedænica vlcera illitu persanat. Si autem intra corpus sumatur, veneni loco est. Albi radix nigro proportionem respondet, sed amarior est: quæ si cū vino austero instar acetabuli bibatur, latos ventris lumbricos enecat: facit etiā ad aquam intercutem.

**CHAMAELEUCE** lumborum dolori- χαμαι-  
bus propitia est, herba virens, incurvis foliis, λινύκη.  
furculisque: flore rosaceo. Aeg. Cal. 3. sic. 1. Pas d'af-

**CHAMAELEVM** vide Anthemis. ne ou

**CHAMAEPLATANI** sunt coactæ bre pied de  
uitatis pumilæ platani: quoniã arborũ etiam poullain  
abortus inueniuntur.

**CHAMAESYCEN** aliqui fycen nomi- χαμαι-  
nant. ramos emittit quaternũm digitorum, πλάτα-  
teretes, succosos, in terram deiectos: folia len- νοι.  
tis, parua, peplum plane referentia, tenuia, χαμακοῦ  
quæ à terra non attolluntur: semine sub fo- κη.  
liis rotundo, vt in peplo. neque caulem, ne-  
que florem promit. radice firmatur tenui, su-  
peruacanea. Aegineta. Absterforia & acri fa-  
cultate pollet, quapropter & furculi ipsius &  
liquor myrmecias verrucáque abolent: cras-  
sas oculorum cicatrices cum melle abster-  
gunt, hebetudini & suffusioni incipienti me-  
dentur.

**CHAMAELEA** furculosa fruticat, ramis χαμαι-  
dodrantalibus. folia oleæ similitudinem λαία.  
habet, tenuiora & amara, quæ gustata linguam Oliuella  
mordent, & arteriam deradunt. Aeg. Abster- offic. me-  
foria facultate sordida, vlcera, & crustas cum zercon  
melle purgat.

**CHELIDONIUM** maius, caule est gra χελιδών-  
cili, cubitali aut altiore, agnatis foliosis: fo- νιον  
liis ranunculi, multis, mollioribus tamen, μέγα  
& colore cæsiis: flore violæ albæ, secun-

dum singula folia prodeūte. in eo succus croci, mordax, acris, & aliquatulum subamarus, grauitè olens. radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur. filiqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Hoc nomē sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirūdinum exoriat, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirūdines matres excecatis pullis, admota herba visum restituere.

χελιδώ-  
νιον με-  
νρόν.  
offi. scro-  
fula.

CHELIDONIVM minus, quod triticū syluestre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: foliis herderæ, multo rotundioribus & minoribus, teneris, & suppinguibus. radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum aceruatim congestas. quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Aeg. Maius cal. 3. valentérque abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est. radix arquatos cum vino & aniso pota, obstructione liberat: manducata dentiū doloribus auxiliatur. Minus cal. 4. acre adeo ut illitū cutē vlceret. vngues scabros emendat. Succus per nares purgat.

χονδρίλλ-  
α.

CHONDRILLA, quam aliqui cichorion, alii serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronun-



ciarūt: verū tenuior tota est. in cuius ramu-  
lis, gummi mastiches simillimum, tuberculo  
fabæ inueniri solet. Aliud habetur chōdrillæ  
genus, folium ferens oblongū circumrosum  
humī sparsum, caulem succo madentem la-  
cteo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, fla-  
uescente, succosa. cuius & caulis & folia con-  
coquendi vim habent. succus incommodos  
palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lētis  
& cultis. Aeg. Chondrilla intybi species sub-  
amara gustu est, propterea etiam maiorē sic-  
candi vim quā illa obtinet.

CHRYSA NTHE M O N aut caltha, nō χρυσάν-  
θειμον.  
Margue-  
rites blā-  
ches  
nullis buphthalmos, herba est tenera, fru-  
ticosa, leues proferens caules, & multifida fo-  
lia: flores supra modum splendentes, luteos,  
orbem oculi imitantes, vnde buphthalmi no-  
men traxit. propter oppida nascitur. Cuius  
caules oleris vice manduntur. flores cum ce-  
rato triti steatomata discutere prodūtur. Re-  
gio morbo correptis colorem breui reddūt,  
si sequēte longo balnei vsu, post exitum ebi-  
bantur. (Aeg. non retulit.)

CHRYSO C O M E palmi altitudine fru- χρυσόκο-  
μη.  
ticat. coma specie corymborum, hyssopo si-  
mili. radice hirsuta, veratri nigri modo, te-  
nui, cyperum æquante: gustu non iniucūdo,  
ex austero dulci. in petrosis opacisque nasci-  
tur. Aeg. Chrysis etiā dicitur. radix acri si-  
mul & astringentē vi existit, quare nō multi

in medicina vsus est: quanquã peripneumonicis, & iocinorosis in mulso elixa exhibeatur: cæterum menses educit.

χρυσό-  
ρος.

CHRYSO G O N V M densè fruticat, quernis foliis: flore coronarij verbasci. radix vt rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranei morfibz auxiliatur.

χρυσόλα-  
χανον:  
offic. mi  
nor cras-  
sula &  
chryfola  
num

CHRYSO L A C H A N V M Plinius ab atriplice discreuit, in pineto foliis lactucæ nasci tradens, sanare neruos incisos. si cõfestim apponatur. Et alibi genus chryfolachani tradit flore aureo, foliis oleris. Coctũ estur vt olus molle. Stranguriam dissoluit si bibatur cx vino & aqua. Aluum sistit.

κύανος:  
Blauco-  
les ou au  
bifoïs ou  
bluetz  
Cicerole

CY A N I colos est in nomine, qui honorem noménque dederit coeruleo. Rosam cyales ou au nus excipit, cyanum amaranthus. Plin.  
C I C E R A M non tam leguminibus Columella quàm pabuli generibus adnumerat, eamque proximam fœnogreco & medicæ tradens. Eadem hominibus non inutilis, nec iniucunda est. Sapore certè nihilo differt à cicerula, colore tantum discernitur. nam est obsoletior, & nigro propior. Seritur primo vel altero sulco mense Ianuario, aut Februario, Martiõve: quibusdam tamen Italiæ locis ante calendas Nouembris. Læto loco & humido feri debet. Ea, vt volunt, stercoretur ager.

**CICERCVLA** est minuti ciceris in- cerresou  
equalis angulos habens veluti pisum. Ea mul poys cer  
tis in locis vtūtur, eiusq; cremorem phaselis re.  
præferunt in alendo potentiolem.

**CICIL**, lege Ricinus.

ὄροβος.  
Ciche

**CICER** consuetum legumen flatus cre-  
at, valentis materie, aluum facilem reddit, vri  
nam mouet, lacti seminiq; generando ac-  
commodatū, idem menses elicit. At crios ap-  
pellatum, hoc est arietinū, aliis magis yrinæ  
ciendæ est: decoctum ipsius præsertim nigri,  
calculos quoque in renibus conterit. Quod  
orobæum ab eruo vocatur, calidius his est,  
& subamarum. Syluestria quouis modo do-  
mesticis sunt validiora. Est autem syluestre  
cicer foliis satiuo simile, odore acri, sed semi-  
ne discrepat. Aeg.

κυκλάμις

**CYCLAMINVS** folia habet hedere, purpurea, varia, in quibus sūsq; déque albi  
cant maculæ: caule nudo, quaternos digitos  
æquante: floribus in eo purpureis, rosarū effi-  
gie: radice nigra, & aliquantum lata, vt ra-  
pum videri possit. Aegin. Cyclaminus varias  
vires habet, etenim extergit, incidit, aperit,  
attrahit, & dissipat. Succus ipsius hæmor-  
rhoidas sedi admotus aperit, duritias cum a-  
liis discutit. Cum melle suffusus proficit, per-  
nares purgat abdomini inunctus aluum sub-  
ducit, foetus corrumpit. Radix autem to-  
ta succo quidem est imbecillior, sed & ipsa

vos.  
offic. cy-  
clamen  
messon,  
ou pain  
de por-  
ceau vulg.

vehemens adeo est, vt cum mulsâ instar triâ drachmarum pota, interanea expurget. Cutis etiam vitia exerit.

κυκλάμι  
νος ἑτέρα  
offi. sigil-  
lū Mariæ

Est & altera CYCLAMINVS, quã cissanthemon aut cissophyllon vocât: foliis hederæ, sed minorib<sup>9</sup>: geniculatis caulibus, crassisque circa uicinas arbores, capreleorū modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua. nascitur in asperis. Aeg. Semen efficax est vt potum priori similia faciat.

κυκλάμι  
νος τσίχη

CYCLAMINVM tertiã Plinius sibi demonstratã asserit cognomine chamæcisson, vno omnino folio, radice ramosa qua pisces necabatur, quod Dioscorides nomine tenuis primæ cyclamino tribuit, ichthyotheron, & piscium venatu nominans.

κύνισον.  
Cigue

CICUTA caulem ædit geniculatū, vt fœniculi, grandem in cacumine, ramosum: folia ferulæ, angustiora, graui odoratu. rami, mox umbellę in summo prodeunt: flores quoque albicantes: & semen aniso candidius: radice non alta, concaua. Cicutę letale venenū inest, suâq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusquam semina & comæ siccescant. qui sole densatur in pastillos. Efficacissima vis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio, & Cilicia nascenti.

Aeg. Cicutæ vires summè refrigeratorias esse omnibus constat.

CYMINVM, lege Cuminum.

CINNAMOMI genera plura, patriū κινναμό-  
μον.  
 sibi nomen vendicātia. Præfertur tamen Mo Canelle  
 syliticum, quòd casia, cui Mosyliti nomē est,  
 aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens,  
 nigrum, ex vinoso in cinereum vergēs,  
 læue, tenuibus ramulis, ac frequētibus nodis  
 cinctum, perquàm iucunde olens. Optimi fere  
 indicium, iucundi odoris proprietate cō-  
 stat. Innenitur enim cum optimo, eoque  
 quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo  
 proximus. Insuper acre, mordēs, & cum  
 calfactione quadantenus salsum, quòd non  
 citò confricanti asperum, aut frianti lanugi-  
 nosum, læuibus tamen internodiis appareat.  
 Si certior fieri voles, vellito ab radice sur-  
 culum. facilis est huiuscemodi probatio: nan-  
 que fragmenta miscellanea quædam esse vi-  
 dentur. Quæ autem melius spirant, suo ha-  
 litu cum nares primum consuluntur, olfa-  
 ctum explentia, deterioris dignotionem im-  
 pediunt. Est etiamnum montanum, cras-  
 sum, pumilum, fuluescens admodum. Tertiū  
 à Mosylitico, perquàm suauiter olet, nigrum  
 fruticosum, paucis intercedentibus genicu-  
 lis. Quartum, fungosum, candicans, aspe-  
 ctu tuberosum, vile, ac friabile, magnam ha-  
 bens radicem, quæ casiam planè representat.

Quintum genus, odore nares feriens, sub-  
 rufum, & cortice fulvæ casivæ simile, tangen-  
 ti firmum, minus nervosum, densa radice fir-  
 matum. Iis quæ thuris, casivæ, myrti, aut amo-  
 mi odorem spirant, minus suavitatis inest.  
 Deligito scabrum, album, rugosum. at læve,  
 lignosum circa radicem, ut inutile, reiicito.  
 Est etiamnum simile aliud, cui pseudocin-  
 namomo cognomé est, vile inualidi odoris,  
 solutarumque virium. Vocatur etiam Zingi-  
 ber, cum tamen sit xylocinnamomum, præ-  
 bens quâdam cinnamomi faciem. Est autem  
 lignosum cinnamomum, sarmenta longa ro-  
 bustaq; ferens, odore longe cinnamomo in-  
 feriore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinna-  
 momo genere differre dicant, quod à natura  
 eius abhorreat. Est & quoddâ cinnamomû,  
 quod aliqui pseudocinnamomum appellât,  
 perquâtm denso atque crasso sarmento, longè  
 tamé inualidius cinnamomo, & odore & gu-  
 stu. Aeg. Cinnamomi vis est summè tenuis,  
 non item æquè calida, sed tertij ordinis, nihil  
 autem ex iis quæ parem ipsi calorem referût  
 adeò siccât, propter substantiæ tenuitatem.  
 Cinnamomis autem vel pseudocinnamo-  
 mum veluti inualidum quoddam cinnamo-  
 mum est.

Langue  
de chien

CYNOCEPHALAE A eadem potest vi-  
 deri antirrhino, ut mihi quidem videtur.)

**CYNIA** aut cynocrambe, cauliculum bi-  
nûm dodrantum altitudine emittit, mollem,  
subalbidum: folia mercuriali aut hederę simi-  
lia, certis interstitiis subalbida. semen foliis  
adheret. paruum, rotundum. Folia cum cauli-  
bus pota, aluum cient, oleribus commendan-  
tur. Ius decocti & pituita & bilem aquamq;  
detrahit.

**CYNOGLOSSON** folia latifoliae plan-  
taginis habet, arctiora, minora, lanuginosa:  
caule vacat, & humi sternitur. prouenit in sa-  
buletis. Contrita eius folia cum vetere suillo  
adipe, rabidorum canû moribus, alopeciiis  
& ambustis medentur. Herba cocta & cû vi-  
no pota, aluum mollit.

**CYPRIVS**, quem aliqui erysiceptrû, vt  
aspalathû appellât, folia fert porraceis pro-  
xima, sed longiora & exiliora: caulem odo-  
rati iunci, cubitalem aut maiorẽ, angulosum  
in cuius cacumine minuta folia cum semine  
exoriuntur: radices, quarum in medicina est  
vsus, cohærentes inter se, oleis oblongis simi-  
les, aut rotundæ, nigro colore, suauis odore,  
amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cul-  
tis enascitur. Optima est grauissima, densa,  
fractu contumax, plena & aspera, odoris  
cum quadam acrimonia iucundi, qualis est  
Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insu-  
lis petitur.

κυνό-  
κράμβη.  
off. 1 yluce  
stris atri-  
plex  
Non est  
hec lin-  
guacanis  
herba-  
riorum  
κύτερος  
Souche  
ou ionc  
blanc en  
bas, noir  
par haule

κὺπρος  
Ἰνδική.

Aliud CYPRI genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum crocivim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri vim exhibet. Aeg. luncus angulosus calfacit siccâtq; citra mortuum, hinc etiam humidioribus vlceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris vlcera per sanat: habet & vim quandam incisoriâ, qua calculos comminuit, urinâ & menstrua promouet.

κὺπρος,  
Troisne

CYP R V S arbor est oliuæ foliis circum ramos, latioribus, mollioribus, & virentioribus, flore candido, muscoso, odorato, semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Aegin. Cypri folia & surculi mixtis constant viribus, discutiēte & astrictria, tum ea quæ sine offendiculo & morsu siccet: ideoq; decoctum ipsorū ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Itē oris eruptiones, aphthas vocât, ipsa arbor commāducata per sanat: item medicinis lieni dicatis miscetur.

κίρκαια.

CIRCAEA, quam & dircæam, aliqui vocant, foliis est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdam veluti corniculis: dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, excalfaciente. Nasctur in apricis, saxis, & vento perflatis. Aegin. Eius radix calida est, & odorata, quæ cum vi-



no pota fœminarum locos purgat: semen in  
forbitione sumptum lac generat.

C I R S I V M, caulis est tener, duorũ cu- *κίρσιον*  
bitorum, triângulo similis: ab imo foliola, ro- *off. lingua*  
sæ speciem referentia: anguli spinosi, per in- *bouis*  
terualla molles: folia buglosso similia, maio-  
ra, subcãdida, modicè hirsuta, partibus extre-  
mis aculeata: cacumen caulis orbiculatũ, hi-  
spidum, in quo capitula purpurea, quæ sol-  
uuntur in lanugines. Radicem huius loco la-  
boranti adalligatam, dolores varicum sedare  
Andreas scripsit. (Aeg. non meminit.

C I S T V S, quem aliqui citharon, aut cis *κίσος*  
faron vocant, ramosus frutex est sed impro- *De gari-*  
cerus, foliosus, saxosis locis nascens, foliis ro- *cles*  
tundis, acerbis, hirsutis. flos masculo vt mali  
punicæ, fœminæ albet. Hypocistis, erythra-  
non, aut cytinus à nonnullis cognominata,  
iuxta cisti radices nascitur, floris punici simi-  
litudine. quædam flaua, altera virens, tertia  
candida. Liquatur acacię modo. aliqui tamẽ  
exiccant, fractãmque macerant, & incoquũt,  
reliquaque, vt in Lycio prosequuntur. Aegi-  
neta, Frutex est astringẽs, & modicè frigidus  
virtute: folia ipsius & germina adcò siccant,  
vt etiam vulnera conglutinent: at flores cum  
in secundo ferè gradu sicciores sint, intesti-  
norum torminibus, aliisque fluidis vitiis ac-  
commodati sunt: extrinsecus illiti putrida vl-  
cera compescunt.

ἐντισος.

Grand  
treufle

CY T I S V S, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargēs cubito longiores, in quibus folia fœnigræci, aut loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. ea digitis tria crucam olent, gustatâque cicer sapiunt. Folia refrigerât. tumores inter initia discutiūt, si cum pane trita illinantur, decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope aluearia serunt. Aegineta, Folia discutientis leniter & tepide nostræ sunt quemadmodum & maluæ.

κίτρον.

Citron

C I T R I I medium acidum, aut qualitatis expers, in quo semen est, tertij refrigerantium siccantiũque ordinis habetur. Cortex in secundo quidem abscessu siccatur, sed non item refrigerat, acri virtute præditus. Caro ipsius crassi succi est, pituitæ generandæ apta & frigidæ, semen digerit & sic. 2. Folia arboris siccandi discutiendique vim repræsentât. Aegineta.

κλήμα.

ΤΙς.

Peruëca

C L E M A T I S humi serpit, læto, pinguiq; solo provenit, viticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folia lauri figura & colore, multo minora. Gignitur in terrenis. Aeg. Apellatur & daphnoides, myosinoides, polygonoides. Siccâdi virtute pollet, qua fluores alui quâ diarrhœam dicunt, intestinorũ tormina, & denique dolores finit. Cōtra venenatorũ morsus rectè imponitur. Est & altera

Ιέρων

ὕψ. 1. ὀλί

cleomatis, quæ viticulosum emittit ramulũ, ra-

bescentem, lentum: folium gustu admodum bilis ma-  
acre, ac exulcerans. repit per arbores, vt simi-ior. & Că  
lax. Aeg. Huius fructus cū aqua potus pituitā panella  
& bilem per inferiora educit. folia ad lepras  
arcendas illinuntur.

CLEMATIS tertia Plinio recensetur, cē- κλημα-  
tūculus Italī appellata, rostratis foliis ad si- τίστριτ  
militudinem capitis penularum iacēs, in ar-  
uis. Est eius egregius, effectus, ad sistendam  
aluum in vino austero. Idem sanguinē sistit  
cū oxymelite, aut aqua calida. sic & ad secun-  
das mulierum efficax. ( Idem ferè gnaphali  
effectus est, quod Romanis similiter centun-  
culus appellatur, hinc fit vt quid differāt ad-  
dubitem.

CLINOPODION frutex est foliis ser. κλινόπο-  
pyllo similis, surculosus, duūm dodrantum διορ.  
altitudine. nascitur in petrosīs. flores marru- Forte q̄  
bij modo, ex interuallis distincti speciem vulgo or  
lecti pedum præbent. Aegin. Vis eius est ca- biculata,  
lida siccāque, nondum vero adurens, sed ter. quā offi.  
tij ferè ordinis. montanū

CLYMBENVM caulem fert fabæ, qua- pulegiū  
dratum: folia plantaginis, folliculis supra κλύμε-  
caulem in sese inflexis, vt in polyporum cir von.  
rhīs. Probatissimum est è montibus. Succus Sigeia  
ex herba tota cum radice exprimitur refri- offi. Cy-  
gerans, & omnes fluidas affectiones astrin- pria ou sa  
gens. ( Galenus & Aegineta indiētā reli- ponalis  
querunt.)

κνίκος, C N I C V S foliis constat oblongis, per am  
vel κνῆ- bitū diuifis, asperis, spinofis, caule fefquipe-  
μος. dali, capitulo magnitudine grādis oliuę: flo-  
off. carta re croci: femine candido, alioqui rufo, longo  
mus angulofo. Huius flore in obfoniis vtuntur.  
Aeg. Cnici femine ad purgandā aluū dunta-  
xat vtimur. Si quis extrinsecus eo vtatur, ter-  
tij calefacientium ordinis erit.

κόκκος C O C C V M quo infectores vtitur, frutex  
βαφικός. est furculofus, paruus. cui grana ceu létes ad-  
Escarlate hærent, quæ electa congeruntur. Optimum  
offic. gra gignitur in Galatia & Armenia, deinde Asia  
na tincto & Cilicia: vltimum ex omnibus Hispanicū.  
rū. narb. Nafcitur quoque in Cilicia, è quercubus, co-  
vermillō chlearum exiliū fimilitudine, quod illius re-  
gionis mulieres ore legunt, & coccum voci-  
tant. Aeg. Granum tinctorium leniter ficcatur,  
vnde magnis vulneribus, & neruorum iti-  
dem cum aceto, aut oxymelite leuigatum cō-  
modé imponitur.

κωδιάμι- C O D I A M I N V M bis anno, vere & au-  
ρον. tumno emicat, æftates hyemésq; fugit. Vocāt  
& codianum bulbum fylueftem interpretan-  
tes, & codion eius florem.

κοίξ. C O I X Theoprafto folio arūdinis, angu-  
lari, ad nexus vtilis, à quo fiffellæ genus At-  
ticæ coix, vt inquit Pollux, apud Dores  
Cois. fit & mentio de coicinis textis apud  
Strabonem.

κολχικόν C O L C H I C O N, aliqui ephemeron, sunt

qui agrestem bulbum vocant, autumnū exi- Canine-  
tu florem edit croci, candicantem: ab eo tem ca. offici.  
pore, folia bulbi, sed pinguiora: caulem pal- hermo  
mo altum, ferentem rufum semen: radicē fo- dactyli.  
ris ē nigra rufescentem, quę delibrata, candi-  
da & mollis spectatur, lacteo succo madet, at  
que gustatu dulcis inuenitur. bulb<sup>9</sup> eius me-  
diam habet rimam, fissuramque, qua flos erū-  
pit, plurimum in Messenia, & Colchis enasci-  
tur. Ea comesa, fungorum more, strangulan-  
do enecat. Hanc autē depinximus, ne à quo-  
quam imprudēter pro bulbo deuoretur: mi-  
rum enim in modum saporis voluptate im-  
peritos allicit. Remedio sunt eadem quę fun-  
gis. bubulum etiam lac potū auxiliatur. itaq;  
cum adfuerit, non aliud desideratur auxiliū.  
(Aegineta nihil adiecit quā eius alexiphar-  
maca.

COLYCEA arbor circa Idam prouenit, αολυκία  
alioqui rara inuentu, fruticosa, ramosa q;, &  
multis alis concaua. folio vlni, longiore, fa-  
cis ad latifolię laurus accedēte, sed ampliuf-  
culo & rotundiore, suprā viridi, infra cano,  
neruosoq; præ tenuibus neruulis fibratisq;, de  
medio callo in costarum speciem adductis,  
materiæ solida, cortice non læui & quasi vi-  
tigineo vestitur. Radicibus per summa gra-  
cilibus, & solutis, cæterum fibratis, & mirum  
in modum flauis. Sterilis & flore vidua, surcu-  
los tamen gemmasque circa folia pingues,

laues, candidos, amentacea facie fundit. Precisa, vel ignibus exusta, ab imis rediuiua resurgit.

**COLYCEA** alia est apud Theophrastum, folio felicis, comosa, ramosa, in totumque ampla, valuulis leguminum more non angustis, in quibus semen latum, paruum, durum non nimis, nec abundè pro magnitudinis ratione frutificat. (Hanc aliqui Plinio staphylodendrum dici existimant, de qua suo loco.

*αολυτία*  
Baguenaudier.

**COLVTEA** Liparæ peculiaris à Theophrasto traditur. Arbor magnitudine præstans fructum ferens in siliqua, magnitudine lentis, qui mirum in modum oues saginet. Nascitur semine & fimo præcipuè ouillo. Serendi tempus, cum arcturus occidit. Mâdari solo debet præmaceratû, cum iam in aqua germinare cœperit. foliû mittit scœnogræco nō absimile. Arbor primû vnicaulis emicat, trina cōcidendis scipionibus & baculis idonea. Si quis nimis decurtauerit mox emoritur, quippe quæ lateribus haud quaquâ fruticet: spargitur deinde in ramos, quadrina prorsus abhorrescit. (Si hæc arbor est quâ Mauritanî Sene vocant, siliquosus eius fructus denarii pōdusculo potus pituitam & bilem deiicit. Retorridâ atramq; bilem earûmq; suffusiones ex gallinaceo iure depellit. Vetousto capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini

succurrit. Sed ius potius feruefacti, quàm triti farina ppinatur. pulueris modò drachma, in decocto semuncia. interaneorum obstructions explicat. (Actuarius.)

COMBRETVM baccari simillimū traditur, nisi quod procerius est, foliorum exilitate vsque in fila extenuata. Hoc totum cū axungia vulnera mirificè sanare.

COLOCYNTHIS sarmenta foliâq; satiuui cucumerisemittit, per terram repētia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Aegineta, Cucurbita sylvestris validâ purgandi vim obtinet: viridis ipsius succus infricatus coxendicum doloribus auxiliatur.

κολοκυνθίς.  
colognte

CONYZAE duo genera. quæ parua vocatur, odore præstantior est. maior verò frutice altior & foliis latioribus, graui odore. ce ouciveriusq; folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. in maiore caulis binūm cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem equat flos fragilis, lutei aut fului coloris, qui in pappum abi, tradices superuacue. Est & tertium conyza genus, caule crassiore, ac molliore: foliis quàm parua maiusculis, minimè pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis riguis. Aegineta, Conyza vtraque Cal. sic. 3.

κόνηφα.  
chasse pu  
micaria.

Hinc etiam oleum in quo decoquitur rigores febrium circuitu remeantes discutit. Flores idem præstant, quorum decoctum menses citat, & foetus extrahit. De tertia non aliud tradit quàm Dioscorides.

**Esponge** **CONFERVAM** appellant à conferru-  
**de riuie-** minando, spongiam aquarū dulcium verius  
**re ou tof-** quàm muscum aut herbam, villotæ densita-  
**se musc.** tis atq; fistulosæ. Frequens est in Alpinis flu-  
 minibus. Hanc præsentaneum esse remediū  
 ad ossa contracta Plinius est author.

**Σιάκρυον** **CONSILIGO** ætate plinii herba in Mar-  
**Pulmo-** sis reperta. Nascitur & Aequicolis circum vi-  
**naria Ve-** cum Neruesiæ. Radix eius suum & peco-  
**getii esse** rum omnium remedium præsens est, pulmo-  
**videtur.** num vitio, vel traiecta tantum in auricula. Bi-  
**Pomelee** bi debet ex aqua, haberiq; in ore assidue sub  
**ou patte** lingua. Superficies huius herbæ an esset in a-  
**de lion.** liquo usu, Plinio fuit incertū. Columella ad-  
 uersus pestilentiam ingruentem gregi præsens  
 remediū huius radiculæ usum cognouit. Cō-  
 filigné mulomedicis pulmonariam dici cœ-  
 pisse testatur Vegetius.

**off. volu-** **CONVOLVOLI** herbæ nascentis per  
**bilis. du** fruteta nullo odore flos est, nec crocis intus  
**lifer, ou** candorem tantum referens, ac veluti naturæ  
**de laveil.** rudimentum lilia facere condiscensis.

**lere, ou** **CUNILAGO** siue cunila mascula, odo-  
**herbe** ris est foedi, radicis lignosæ, folio aspero. tra-  
**aux clo-** dunt manipulo eius abiecto omnes etiam à



tota domo blattas conuenire ad eam.

ches ou

**C O R I A N D R V M** aut corianum vulga-  
 ris est notitiæ. Aeg. Ex contrariis viribus cō-  
 positum est, tenuis substantiæ, terrenæ, ama-  
 re, aquosæque humiditatis tepidæ particeps.  
 Habet modicā vim astringendi, quapropter  
 inflammationibus, erysipelatis nō admodū  
 feruentibus cōuenit. Tumores molliusculos  
 cum aliquo in idem efficaci, discutit. Semen  
 modicè quidem cum passo bibitum, lumbrī-  
 cos pellit, libeeralius autem sumptum men-  
 tem tentat.

des clo-

chettes.

herbe en

censiere.

κόριον.

coriandre

**C O R I S**, quod aliqui hypericon vocant,  
 frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac  
 minore, non altior dodrante, suauis, odora-  
 tus, acris. Aegineta, Semen eius ad vrinam &  
 menses ciendos bibitur. Succurrit & phalan-  
 giorum moribus, item ad opisthototon cū  
 oleo inungitur.

κόρις.

Milleper-

tuis, ou

herbe S.

Ichan.

**C O R N V S** dura arbor est, baccas ferens  
 oliuæ modo oblongas, quæ primum virent,  
 dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ co-  
 lorem repræsentant. Muria, vt oliuæ, condiū-  
 tur. Sanies quam virentia folia torrendo resu-  
 darunt, impetigini conuenienter illinitur.  
 Aeg. Corni fructus acerbus, si edatur, validè  
 vētrem astringit. Folia autem & germina a-  
 cerbitate vehementer siccant, adeò vt maxi-  
 mis durorum corporū vulneribus glutinan-  
 dis sint.

κράνεια.

Cormier

ou corni-

er.

καρών-

πας.

Capriole  
ou fâgui-  
naire, ou  
dent au  
chien.

κόςος.

Du coq.  
ou herbe  
de nostre  
Dame.

C O R O N O P V S oblonga herbula est,  
per terram repens, fissis foliis. coquitur in o-  
lere, radicem habet tenuem, abstringentem,  
quæ in cibo cœliacis facit. Prouenit in agge-  
ribus, & locis incultis, & secus vias. Idem a-  
pud Paulum nisi quod *κολικός* pro *κοιλια-  
κός* perperam legitur.

C O S T V S præcellit Arabicus, can-  
didus, leuis, eximia odoris suauitate. Secun-  
dū locum sibi vendicat Indicus, leuis, vber,  
vt ferula niger. Tertius est Syriacus, gravis,  
colore buxeus, & odore feriens. Optimus  
est recens, albus, abundè plenus, densus, a-  
ridus, à teredinibus non crosus, sine grauē-  
lencia, gustu calidus ac mordens. Sunt qui  
admittis helenii comageni præduris radici-  
bus, adulterent. quod deprehensu facile est.  
siquidem neque gustu feruet helenium, ne-  
que validum odorem vibrat, vt caput tenta-  
re possit. Aegineta, Costus modicum qui-  
dem amaritudinis, plurimum verò acris &  
calidæ qualitatis habet, idoneus si quam sit  
opus particulā calfacere, vel ex alto in sum-  
ma humorem aliquem elicere. Vrinam &  
menses ducit, lumbricos enecat. Quum ve-  
rò & flatulenti cuiusdam particeps sit, vene-  
rem cum mulso potus stimulat. Coxendi-  
cum doloribus, resolutis, febrium rigori-  
bus ante accessiones, cum oleo infricatus,  
conducit.

**COTONEA** mala & struthia frigido ac κνδώνιο.  
terrestri donata temperamento, ventrem sup Coins.  
primunt, vulnera glutinant. Aeg.

**CRATÆOGONVM**, siue vt aliis κραταῖονος.  
placet, cratægonon, foliis melampyro simi-  
le est, multis calamis ex vna radice emican-  
tibus, multorumque geniculorum. semine  
milii. nascitur in opacis & frutetosis, sum-  
mopere acre. Eadem apud Paulum, sed fri-  
gidum semen esse adiicitur, corrupta, ni  
fallor, lectione; aliter enim apud Galenum  
legitur.

**CRITHMV M**, seu potius, vt aliqui, cri-  
thamon, fruticosa & vndique foliosa herbu-  
la est, cubiti altitudinem ferè petens. Nasci-  
tur in maritimis, & petrosis: foliis pinguibus  
numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, la-  
tioribus, & longioribus, falso gustu. flores  
candidi sunt, & semen, ceu rorismarini, odo-  
ratum, molle, rotundum, quod siccatum rum-  
pitur. habet intus tritici modo nucleum: ra-  
dices digiti crassitudine tres aut quatuor, gra-  
ti odoris & iucundi. estur crudum coctumve  
in olerè. seruatur etiam in muria. Aegineta,  
Crethmon falsum est simul & amarum, sed  
modicè, quare & vis ipsius est absterforia &  
desiccans.

**CROCODILION** chamaeleontis ni- κροκοδίων.  
gri figuram habet. Nascitur in syluosis, ra-  
dice longa, læui, aliquantum lata, odore, vt Séblable  
a carline a carline

nasturtii, acuto. Semē ei rotundum inest, duplex vti scutum. Aegineta, Semē & succus calidam, siccam, & discutientem vim præ se ferunt, vrinas itaque & mēses mouent. Radix excreationes è pectore iuuat, item sanguinē per nares ducit.

κρόκος.

Safran.

C R O C V M, optimū in medendi vsu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerēs in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactū manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre: fin huius generis non est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ cōtermino. Tertius Lycio è monte Olympo. dein ex Aegibus Aetolię. Cyrenaicū & Centuripinū in Sicilica omnia viribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamē ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortariis dicauerūt, quibus de causis magno venditur. Vtilissimū in medicina quod ante descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sapæ sublitu: contrita, quò pondus adiiciatur, simul argēti spuma, aut blumbagine. sed maleficiū declarat insidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Aeg. Crocus Cal. 2. sic. 1. astringit & concoquit.

C R O T O N, quære Ricinus.

CYCVBRITA

**CUCURBITA** humidi frigidique in secundo abscessu temperamenti est, unde tota si imponatur, calidas refrigerat inflammationes.

κολοκύνθη.

Courge,

ou courde.

σίκνος.

Cocôbre

**CUCUMIS** esculentus quidē viridis refrigerat humectatque in 2. ordine, caro ipsius feruidas solatur inflammationes. Semen abstergendi incidendique virtute præditum, vrinæ mouet, & corpus nitidum efficit. Aridus ficcatur in 1. ordine, vehemētiùsque abstergit, & semen, & radix.

**CUCUMIS** sylvestris fructu solo distat à

σίκνος

fatuo cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem. folia atque sarmenta satium refert: radice candida, magna nascitur in sabuletis, & rudribus, frutice in totum amaro. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum quod elateriū vocatur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una: postridie imposito supra craterem rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sorsum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur, simulque carnosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere finitur, atque in vicinam peluim demittitur. coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pressa abiici-

αγριος.

erraticus

σίκνος

ελατόριον.

ον.

~~Chamaecitrus~~

~~Chamaecitrus~~

untur. humor in pelui agitatur, & linteo o-  
 pertus, soli exponitur. dumque steterit, tota  
 supernatans aqua cum humore concreto, ef-  
 funditur. hoc verò identidem fieri solet, do-  
 nec existens aqua lique scat: qua stillatim ex-  
 hausta, sedimentum mortario suscipitur, &  
 conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad  
 hauriendam protinus succi abundantiam, cri-  
 bratos cineris humi inspargant, & medium  
 cauantes, triplicatum linteum obtédant, per  
 quod elaterium cum sua humiditate diffun-  
 dunt, siccatumque, in pila, vt dictum est, con-  
 terunt. Aliqui pro dulci aqua marinam per-  
 fundentes, ita eluunt. Alii in nouissima lo-  
 tionē, mulsam aquam respergunt. Elaterium  
 optimū esse constat, læue, non ponderosum,  
 cum candore leniter humectum, gustu ama-  
 rissimum, quódq; lucernarū luminibus obie-  
 ctum, facile flagret. Porraceum tamen sca-  
 brumq; , si turbidum spectetur, atq; erui cine-  
 risq; plenum sit, graue & vitiosum esse solet.  
 Nec desunt qui cucumis succo amyllum im-  
 misceant, vt candorē ipsum & leuitatem imi-  
 gentur. Ab imatu ad decennium deiectioni-  
 bus vtile est. Aegineta. Cucumeris syluatici  
 radix detergit, dissipat, emollit. Succus sic-  
 candi vires habet, qui videlicet radice & fo-  
 liis expressus elaterio similis, sed imbecillior  
 est. Elateriū autē cal. 2. menses prouocat. fœ-  
 cus appositus propter summam amaritudinē

necat. euacuationē ex naribus cum lacte in-  
frillatum molitur. Clystere iniectum pituitā  
nonnunquam etiam sanguinem extrahit.

C V M I N V M fatium ori gratum est: sed κύνινον  
Cumin  
multo magis Aethiopicum, quod Hippocra-  
tes regiū appellauit. secundum locum tenet  
Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in  
Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & ple-  
risque aliis tractibus.

Syluestre C V M I N V M, plurimum effi- κύνινον  
Cumin  
caciūsq; in Lycia & Galatia, Asia, atq; Car-  
thagine Hispaniē gignitur: fruticē paruo: do-  
drantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis  
foliis tenuibus, veluti serratis, & gingidii di-  
uisura. in cacumine capitula quina, aut sena  
habet, mollia, rotunda, in quibus est semē a-  
cerosum, gustu fatiui acriore. nascitur in col-  
libus. Est & aliud syluestris cumini genus, fa-  
tium non dissimile, quod à singulis floribus  
pensilia promit cornicula, in quibus semen  
est melanthio simile: quod potum omniū ser-  
pentium moribus præsidio est. calculosis &  
iis qui vrinæ stillicidio vexantur, aut concre-  
tum sanguinem cum lotio reddunt, auxilia-  
tur. sed apii semen feruefactum postea bibē-  
dum est. Aegineta: Cyminū calefacit tertio. κύνινον  
Cumin  
Vrinam mouet, flatus discutit.

C V P R E S S V S refrigerat & astringit. κύνινον  
Cypres  
Aegineta: Cupressi galbuli & turiones sicca-  
di viribus pollent, nullo calore conspicuo: cypres.

quapropter vulnera magna in duris corpõribus conglutinant, & in flaccidis putridisque vlceribus in alto fixas humiditates citra noxam depascuntur, intestinorũque ramicibus opitulantur.

Sariete, C V N I L A mollis ramis ac foliis, hispida  
ou chen- lanugine obducitur, tritãque mellis habet o-  
dree faul dorem, digitis tactu eius cohærentibus.

uage, ou D  
cunilage A P H N O I D E S cubiti altitudi-  
Δαφνεια D ne fruticat, ramis flexilibus obse-  
δης. quiosisq; multis, inde sursum ver-  
Laureole sus foliosis. cortex supra modum viscosus ra-  
mos vestit. folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os  
& fauces incenduntur: flores candidi: baeca  
cum maturuit, nigra: radix inutilis. nascitur  
in montosis. Aëg. Laureola eiusdem facultatis est cum laure Alexandrina.

D A M A S O N I O N, quære Alifina.

Δαῦκος. D A V C V M aliqui Daucium vocant. Cre-  
Carote ticũ foliis fœniculo simile, minoribus & te-  
fauluage nuioribus: caule dodrantali: umbella corian-  
ou paniez dri, flore albo: semine acri, candido, hirsuto,  
suauissimi odoris in mandendo. radix digi-  
tali crassitudine & dodrantis longitudine a-  
dolescit. in saxosis nascitur, & locis sole illu-  
stratis. Aliud eius genus, syluestri apio simi-  
le, acre, odoratum, aroma olens, feruētis gu-  
stus. Probatissimũ Creticum. Tertiũ assigna-



tur genus foliis coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblôgo, ceu cumini, acri. Aeg. Daucus qui & staphylinus dicitur, hortensis quidem radice flatulenta est, & venerê mouet itemq; semine. Syluestris autem semen minimè flatuosum est, sed urinam & menses citat, vt & herba ipsa, inefficaciustamen. Sed hæc magis ad pastinacam Dioscoridis quàm daucū faciunt.

**DELPHINIUM**, furculos emittit à radice vna sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem repræsentant, unde tractū nomen est. flos violæ albae nō dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo nō aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atque ignauos torpescere: semota verò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis, Alterū est delphinium, quod Romani bucinum vocant, superiori simile, sed foliis & ramis longè gracilioribus. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus. (Non habetur apud Aeginetam.)

**DICTAMNUM**, aliquibus syluestre pulegium vocatur. Cretensis herba est acris, leuis, pulegio similis, sed maioribus foliis, quæ tomento quodam spissâq; lanugine pubescunt, florem nullum aut semē profert.

*Δελφίνιον.*  
ov.  
fili⁹ ante  
patrē, a-  
liis buccina-  
ria.

*Δικταμνον.*  
Diptā ou  
gingēbre  
du iardin

*ψευδοδι.* Quod pseudodictamnium vocant, multis in  
*ελαμνος.* terris nascitur, antè dicto simile, sed minus  
 quàm illud acre. Eisdem effectus præbet, sed  
 inefficacius multo. Defertur à Creta alterum  
 dictamni genus, foliis sisymbrii, ramis maio-  
 ribus: in quibus flores sylvestris origani, ni-  
 gri, molles. odor foliorum inter sisymbrium  
 & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem,  
 sed minus nares ferit. miscetur emplastris, &  
 & medicaminibus quæ aduersus serpentium  
 iniurias confinguntur, theriaca vocant. Aeg.  
 Tenuius est partibus pulegio, cætera simile.  
 imbecillius autè est pseudodictamnion.

*διόσπυ-* DIOSPYROS vel diosporos arbor  
*ρος.* fructum habet ceraso similem, duro intus nu-  
 cleo. Theophrast.

*διψακος.* DIPSACVM aculeatarum generis est,  
*chardon* caulem habet altum, spinis horridum, foliis  
*a foullon* lactucæ, spinosis, binis, genicula singula cõ-  
 plectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas  
 intus & extra aculeatas, in dorso medio habé-  
 tibus, cõcauo alarum sinu, in quo imber aut  
 ros asseruetur. vnde dipsaci, quasi sitiētis, no-  
 men traxit. in cacumine caulis, singula surcu-  
 lis capitula insunt, oblonga, echinata spinis.  
 quæ arefacta, candida spectantur, dissectaq;  
 medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Aegi-  
 neta: Huius spinæ radix siccat secundo, cum

*διδοικα.* aliqua abstergendi vi.

*δωδε.*

DODECATHEO folia septem lactucis

similia exeunt à radice lutea. in aquâ potam  
omnibus morbis mederi tradunt, item ma-  
lis quæ membratim sentiuntur: neq; non iis  
quæ totis corporibus grassantur.

Moly hō  
meri.

DORYCNION Cratœas halicacabon,  
aut calcæ vocat. frutex oleæ nuper prodeūtis,  
similis. nascitur in petris, non procul à mari,  
ramis cubito minoribus, foliis oleæ similib;  
colore, minusculis, firmioribus præter mo-  
dum scabris: flore candido: siliquis in cacu-  
mine, ceu ciceris densis, rotūdis, quinis intus  
aut senis seminibus, exigui erui magnitudi-  
ne, læuibus firmis, versicoloribus, radix ad  
digiti crassitudinem & cubiti longitudinem  
adolefcit. id somniferum esse constat Copio-  
sius haustum mortē adfert. Nec defuere qui  
dicerent, semen in amatoria expeti. Aegine-  
ta, simile temperamēto est papaueri & man-  
dragoræ, immodicè refrigerās. Quod si par-  
cè sumatur torporem inducit: copiosius, in-  
terimit.

δορυκνιον  
ov.

DRABA herba ad cubiti altitudinē assur-  
git, tenues spargens ramos, & ex utroq; late-  
re folia, ceu lepidii, sed molliora, & cādidio-  
ra in cacumine verè sambuci umbellam ge-  
rit, candidos flores habentem. Herba hæc cū  
ptisana coquitur, in Cappadocia maximè.  
semen aridum pro pipere obsoniis admisce-  
tur. (Aegineta præterit.

δραβη  
drauc ou  
cumin  
faulnage

DRACVNCVLVS folio constat he-  
f. iiii

δρακον  
τιον.

offi. serpe  
taria & co  
lubrina,  
aliis lin-  
guacerui  
deraceo, magno, candidis notis insigni: cau-  
le recto, bicubitali, versicolore, maculis re-  
sperso purpureis, ita vt anguē planè referat,  
baculi crassitudine. fructus summo caule ra-  
cematim cohæret, colore primum herbaceo.  
& cum ematuruit, croceo, gustu feruens,  
mordaxque. radice aliquantulum rotunda,  
bulbosa, aro nō absimili, tenui obducta cor-  
tice. Nascitur in sepibus vmbrosis. Aeg. Simi-  
le quiddam aro habet, sed eo acrius, amarius  
calidius, tenuiùsq; est, cū adstrictione nōnul-  
la. Radix ipsius pota viscera purgat, & perui-  
caciū seu malignorum vlcerum excellentissi-  
mum est remediū: ex æquo etiam folia, fru-  
ctus valentior est.

δρυόφο-  
ρον.

offi. myr-  
tus nemo-  
ralis, cusi-  
nes rura.

DRYOPHONVM olus syluestre filiculā  
siue dryopterim specie æmulator, ramulis si-  
ue cauliculis tenuibus sesquipedalibus, quos  
circūdant vtrinq; folia, pollicari amplitudi-  
ne ruseo similia, nisi quod teneriora sunt &  
candidiora, flore sambuci lacteo, semine gu-  
stu mordaci, vnde eo vice piperis vtūtur, co-  
quūntq; cauliculos in cibis admodū gratos.

δρυόπτε-  
ρις  
Arborea  
osinūdu-  
la.

DRYOPTERIS nascitur in veterū ro-  
borum musco, filici similis, multo minore fo-  
liorum incisura: radicib<sup>9</sup> inuicem implexis,  
hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergē-  
tibus. Aeg. Dulcis, acris, & leniter amara est:  
cæterum vim habet exedentem, qua & pilos  
abolet.

**D V L C I S** radix plurima gignitur in Cap padocia & Ponto. fruticosa est ramis binūm cubitorū altitudine assurgentibus: foliis lentisci, densis, pinguibus, tactūque gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularū platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentiū modo habet, rufas & paruas: radicibus longis, vt gentianæ, coloris buxæ, subacerbis & dulcibus, quæ desantur in succum, lycii exemplo. Aeg. Tepidi humidique, temperamenti est, cuius etiam astrictionis particeps, eoque non modò fauces exasperatas læuigat, sed etiam vesicæ scabiei medetur: eadem sitim arcet.

## E

**E B E N U S** optima habetur ethiopica & nigra, nullos habens venarum discursus, facitii cornus læuore. cū frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. suffitur iucundo odore supra carbones sine fumi tedio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinē accenditur, & trita ad corē flauescit. Altera est indica, internatis segmentis candicantibus, & modicè fuluis, item frequētibus maculis. cæterū prior bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cōsimilia pro ebene vaneunt. quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiae in suffitu præferētia. Aeg. Ebeni ligni vis

γλυκυδ-

ρίφα.

off. ligui-

ritia rigo

lisse ou

erculisse

ἔβενος

Euene

est excaſatoria, deterſoria, & ſubtilis, quæ propter quæ pupillas obſcurant abſtergere creditur, aliisq; oculariis miſcetur medicinis.

E C H I N V S idem erino, meo quidē iudicio.

Ἐχιν.  
Herba  
hircina

E C H I O N, folia habet prælonga, hirsuta, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minoræ tamē, ſubruba, & pingüia, ſpiculis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minoraq; utroque latere folia, expaſa, pinnataq; , nigra, in ſummo caule minuscula: flores ſecundum folia purpureos, in quibus ſemina capiti viperarum ſimilia inſunt. radix nigricat, digito tenuior. Aeg. Hæc alij doriada, alij alcibiadion vocāt, nō modo à ſerpēte commorſis cū vino pota auxiliatur, ſed præſumentes quoq; percuti non patitur.

Ἐλαγιόμη-  
λι.

In Palmyris Syriæ, quod E L A G O M E L I vocant, ex quodam caudice manat, oleū melicræſſius, ſapore dulci. Aeg. Inſtar duorum cyathorū potum cū aquæ hemina crudos humor ſbilioſosq; ex aluo educit: qui verò id bibunt, torpeſcunt, quod extimeſcendū non eſt, ſed excitari ipſi debent.

Ἐλαφό-  
βοσκον.  
offic gra  
cia dei

E L A P H O B O S C O fœniculaceus caulis eſt, aut rorimarino ſimilis, geniculatus: foliis dū n digitorū latitudine, ut terebinthi, prælongis, aliquātum aſperis, circumfractis: adnata multa habet, ſerentia ſymbellas anethi

similes, & semina eiusdem: florē subluteum: radice ternum digitorum longitudinis & crassitudinis vnus, candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olerē manditur. contra serpentium iētus datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium moribus resistere. Aegineta, Cal. sic. 2. Substantia est tenui.

**ELATINE** folia habet helxinę, minora, ἐλατίνης  
 rotundiora, pilosa: dodrantalibus ramulis, Capestre  
 quinis senisve, à radice foliosis, gustu astringentibus. nascitur in segetibus & cultis. Aegineta, Mediocri est frigiditate, & astrictione donata. ραπίστριū

**ELEOSELINVM** in humidis nascitur, ἐλιοσίλων  
 satiuo grandius, & ad eadem efficax. Aegineta, Palustre apium idem potest quod hortense. Egrum

**ELICHRYSON** quidā chrysanthemum, ἐλίχρυς  
 nonnulli & id amaranton vocāt, quo deorū simulacra coronant: ramulum habet candidum, virentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatiiis angusta, abrotono similia: σος.  
 comam aureæ lucis, in orbem, vmbella rotunda veluti siccis corymbis dependentibus, radice tenui. nascitur in asperis, & torrentium aluers. Aeg. Eius coma cum vino pota vrinæ angustius, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est: menses educit, sanguinem coactū ex mulso pota Chanosū maius

dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

**ἐμπίτρον** EMPETRON aliqui phacoides vocant,  
Saxifraga. nascitur in montibus, & maritimis, falso gustu. sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Aeg. Pituitam & bilē purgat. Est etiā falsum, quare abstersionibus accommodatur. (Cognomen eius prassoides apud Paulū legitur, non phacoides.)

**ἐννεάφυλλον.** ENNEAPHYLON herba Plinio folia longa nouem habet, causticæ naturæ. in lumborū doloribus, & coxendicum imponitur vtilissimè: continuò enim pustulas excitat.

**ἐφήμερον.** EPHEMERON, aliqui syluestrem irin appellant, folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem, florem candidum, amarū: semen molle: radicem vnā digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. nascitur in syluis & opacis. Aegineta. Mistā potestatis est & repellentis, & discutientis per halitum. (Ephremeron venenosum in Colchico depingetur.)

**ἐπιμήδιον.** EPIMEDIUM, caulis est non magnus, hederæ foliis, denis atq; duodenis, neq; florē neque fructum ferēs, radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. nascitur in humidis. Aeg. Virtus eius est mediocriter frigida cum humiditate aquosa: quod si illinatur, mammas rectas conseruat. dicitur etiam sterilitatē potu facere.

**ἐπιπак-  
тис.** EPIPACTIS ab aliis helleborine, par-



uā herba, fruticosa, exiguis foliis. Iocinoris  
vitiis utilis, & contra venena pota. Idē Aeg.

EPITHYMON, flos est è thymo durio. *ἐπίθυμον*  
re, satureiæ simili, capitula habet tenuia, & le  
uia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta.  
plurimū in Cappadocia, & Pamphylia gi-  
gnitur. Aeg. Cal. sic. 3. thymo efficacius. *ἱπέροσι*

EPIROTICA mala, quæ latinè orbicu-  
lata dicuntur, stomacho utilia, sistūt aluum,  
vrinas euocant, malis tamen cotoneis inua-  
lidiora. *καμῆλλας*

EQVISETVM in riguis, & scrobibus na-  
scitur. cauliculi prodeunt inanes, geniculati,  
in se farcti, rubescētes, scabri, & iuncea cir-  
ca eos folia, crebra, exilia. in sublimē equisetū  
attollitur, vicinos arborū caudices scandens,  
obuolutūmq; depēdet, comis multis, nigris,  
vt equorum cauda. radix lignosa, dura. Alte-  
rum equisetū caulis est rectus, cubitalis, aut  
maior inanis. comis per interualla breuiori-  
bus, candidioribus & mollioribus. Id cū ace-  
to tritū vulneribus remedio est, eadēmq; fun-  
gitur facultate. Aeg. Hippuris astringentē cū  
amaritudine facultatē possidet, eoque valēter  
simul & sine morfu desiccatur. vulnera maxi-  
ma committit, intestinorum ramicibus opi-  
tatur, & vitiis fluore infestantibus cū vino  
pota medetur. *ἱππυρίς.*  
Prela ou  
cauda  
equina

ERICA fruticosa arbor, myricæ similis, *ἐρείκη*  
longè minor. cuius flore apes reprobū mel Bruyre

efficiunt. tam flos quàm coma serpentium i&ibus illitu medetur. Aegineta, Vi pollet discutiente citra rofionem, flore ipfius potiffimũ & foliis vtendum.

*ἑν' ἑκατόν*  
Centum  
capita.

**E R Y N G I O N** aculeatarum generis est. Cuius folia in principio, fale cõdita, in cibos recipiuntur. lata autem funt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica. Eryngio, cum adoleuerit, complures ramulorum striæ rubēt, in quorũ summitatibus globosa capitula, dorarum acutissimarũque spinarum ambitu stellatim circumuallantur, quorum colores aliàs viridis, aliàs albus, interdum cœruleus inuenitur. radix oblonga, lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & campestribus. Aegineta, Calfacit quidem non manifestò, siccitatis autem haud obscure nec modicè particeps.

*ἐρινύς*  
Herbe a  
lactou  
ocimum  
aquatile.

**E R I N V S** nascitur apud fontes & fluuios, foliis ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis, quinis, senisve, dodrantalibus furculis: flore candido, semine nigro, & acerbo. folia & caules lacteo succo turgent. Aeg. Eius seminis denarij duo cum mellis denariis quatuor illiti, oculorũ fluxiones sistunt: succus aurium doloribus benefacit. Alibi de echino scribit, herba repellente & siccante ob suam acerbitatem, eadem autem erino videtur.

*ἐρίφια*

**E R I P H I A** septem lanuginosis ramulis

apii modo foliat, purpureo flore, & eo quidem perenni, semine fabaceo, totidem radiculis quot ramis. Hanc magi prodidere in a-uena scarabeum habere, sursum deorsumque decurrentem, cum sono hœdi unde nomen accepit. Hac ad vocem præstantius esse nihil tradiderunt.

**ERYSIMVM** cereale, vel irio, culmo cō *ἱρύσιμον* surgit ferulaceo, foliis sesamæ similibus san- *σιτῶδες* guineis, flore sesamæ foliaceo, prorsus idem *Ireon ou* erat, nisi pinguis esset. Fruges est æstiva, & an *velaron* te Vergiliarum exortum feritur. Italiæ ritu, alioqui in Græcia & Asia earundem o. casu. Recēs sato irioni pluvius imber nocet, quam reliquis frugibus pdesse credatur: quo virēte sicuti sesama, nullum animal vescitur, quòd amarus sit. Gale. Erysimū corporis co- alitu sesamo vicinū, sed insuavius longe esu, tenuis alimenti, in omnibus ipso deterius, vt panicum milio. Vtrunq; tamen calidum est, sitimque cibo concitat.

**ERYSITHALE** foliis est acanthi, luteo *ἑρυσιθα-* flore. datur in vino contosis & euerfis. *λίς.*

Cruda **ERVCA** venerem largiore cibo *ἑρυσόμορος* concitat. semen eodem effectu prodest. urinā *Erucque* cit, cōcoctioni prodest. aluo perquàm cōmo *ou ro-* data. semine ad cōdimenta vtuntur. quod, vt *quette* in longū tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiam- num sylvestris eruca, maximè in Iberia, que

occidentem spectat, cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. vrinam vehementius pellit, multo satiuâ acrior. Aegineta. Eruca similis erysimo est, temperamēto flatulēta, ob quod ad venerē instigat. semen ipsius urinā quoq; mouet. Syluestris domestica valentior est.

ὥχρος.

Non est  
hæc du-  
relle vul-  
garis

ERVILIA genus est leguminis, folio q̃ faba longiore, flore apibus gratissimo, ideo circa alucaria feri præcipiunt. Eisdem quibus lens pinſitur modis. At eruilia syluestris herba est, amaritudinis eximia, colore & folio cicerculæ, quanquam minore.

ὄροβος.

ERVVM paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis habēs, è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi vsus conueniens. Parandæ farine ratio hæc est: vberiora grana candidaque deliguntur, permiscendoque aqua resperguntur, donec sufficienter combibant. postea torrentur, vsq; dum hians cortex disrumpatur. molitæque, farinario cribro incernuntur. postremo farina recõditur. Aeg. Eruum cal. 1. sic. 2. cum amaritudine, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit: libera lius sumptū, sanguinem per vrinam expellit.

πλατύ-

φυλλος.

ESCVLVS, vel æsculus inter glandiferas folii amplitudine præstat, Hinc Græci platyphyllon, id est latifoliam vocāt, vt quibusdam placet fago proceritate & glande inferior est. Galla visu quidē quernę nō dissimili

nisi

nisi quod lenior, sed ad rem nullam vtili-  
 rum alteram nigram habet, qua lanæ infici-  
 untur. Fert glandem hispidam calyce, grandē,  
 bonam, fungosam, carnem fieri ea tradunt.  
 Folium graue, carnosum, procerum, sinuo-  
 sum lateribus. Quantum corpore eminet, tan-  
 tum radice descendit. Autūno reddit fructū,  
 si Vergilio credimus. (Permulta quæ assignā-  
 tur latifoliæ tam à Theophrasto, quàm Pli-  
 nio, in esculo etiam inueniuntur: quapropter  
 si non eadem sit, ab ea tamen non multum  
 diffidet.)

E V O N Y M O S, aliqui anonymon vo *ἰωνύμων*  
 cant, quum alibi, tum in Lesbo insula proue *Fusaria*  
 niens, punicæ mali magnitudine, atque folio *ou fusa*  
 eiusdē, maiori quàm vinca peruinca, & vt pu *num*  
 nica tenero. flore albæ violæ proximo, odore  
 graui ac pestifero, folliculis sesami, in quæ  
 acinus quadrāgulus, solidus, siue spissus, qui  
 in versus quaternos digeratur, pecori gusta-  
 tu letalis, sed & capris præcipuè mortifera  
 sunt & folia, nisi præcipiti alui deiectione suc-  
 curratur. Germinat mense septembri, floret  
 vere. Arbor est infœlix:

E V P A T O R I V M, fruticosa herba est, *ἑυπατώριον*  
 vnicum efferens caulem, lignosum, nigrican *ριον*.  
 tem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalē, in *off. agri-*  
 terdū amphiolem: foliis per interualla quin *moine,*  
 quefolii, aut cannabis magis similibus, quin *nōtamen*  
 quepartito aut amplius diuisis, nigricantibus, *herbari-*

orū q̄ est per ambitū ferratis. semen medio caule erū-  
 hydropi pit pilosū, deorsum spectās, quod siccatum  
 per vestibis inhæret. Nec desunt qui aberrantes,  
 argemonem hanc appellarint, cum tamē lon-  
 gē alia sit, vti exposuimus. Aegin. Tenuem  
 vim & incidentē sine cōspicuo calore habet,  
 qua iecur obstructum expurgat, est & nōnul-  
 lins astrictiōis particeps.

εὐφρό-  
 σίου.

E V P H O R B I A Libyca arbor est, ferulæ  
 speciem habens, quę in monte Atlante iuxta  
 Mauritaniā inuenitur. ea acerrimo succo tur-  
 get, cuius eximium feruorem expauescentes  
 incolæ, ouillos vētres elutos, arbori circumli-  
 gant, & eminus caulem contis incidunt, con-  
 festimque ē plaga, perinde atque vase quo-  
 dam, in ventriculos copiosus lactis humor ef-  
 fluit, præter id quod humi sparsum, vulnus  
 eiaculatur. Duo succi genera, vnū orobi ma-  
 gnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum  
 in ventriculis concrevit, atque vitreū specta-  
 tur. Eligendū est translucens, & acre. Euphor-  
 biū adulteratur sarcocollæ & glutini mistio-  
 ne. sed difficile quidem experimentum, quip-  
 pe cum leui gustu, os accēsum diu detineat,  
 adeo vt quicquid ori obiiciatur, planē eu-  
 phorbium resipiat. Eius inuētio tempore Iu-  
 bæ regis Libyæ cognita extitit. Aegin. Adu-  
 rentem vim sortitum est subtilēque, aliis li-  
 quoribus similiter.

## F

F

A B A non multū à medio tēpe-  
ramēto recedit, siue refrigerādo *κρύαμος*  
siue siccādo : caro ipsius nōnul- *φœue*

lius etiā absterforiæ qualitatis est, excreatio-  
nibus è thorace & pulmonibus utilis. Quū  
autem cortex fabæ nonnihil quoque astrin-  
gat, tota ipsa in posca decocta cœliacis & dy-  
sentericis conducit, illita verò inflammatio-  
nibus & tumoribus medetur, lac in mammis  
extinguit.

Aegyptiā F A B A, quam aliqui Ponticam *κρύαμος*  
vocant, in Aegypto plerunque prouenit, in *αἰγυ-*  
Asiæ etiam Cilicięque lacubus inuenitur. Fo- *πῆλος*  
lia habet ampla, etiam si ad arborū frondes  
comparentur: caulem cubitalem, digiti crassi-  
tudine: florem roseum, dupla papaueris am-  
plitudine. & vbi flore exuitur, fert folliculos  
vesparum fauis similes, in quibus faba supra  
operculum, bullantis ampullæ modo, pro-  
minet. Cibotion ideo nominant, id est arcu-  
lam, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ  
mandata, & ita in aquam demissa. Radice fir-  
matur harundine crassiore. quę cruda coctā-  
ue estur. ci colocasiæ nomen est. Faba vi-  
rens manditur, & exiccata nigrescit, vul-  
garem magnitudine superat. Aegineta, Ae-  
gyptia faba humidior nostra est, & excre-  
mentitia.

F A G V S easdem quercui vires habet, sed *φρύγισ*

g ij

**Fou,**  
**faux, fou**  
**teau, ou**  
**hestre**  
**νάρθηξ.**  
**Ferule**

intensiones vt etiam ilex. tenera eius folia illita non instrenuè siccant. (Alterû fagi genus quod Latini sciscimã vocant) in oxya quere.

**F E R V L A.** caules, si edantur, capitis dolores faciunt. muria condiuntur. Ferula itaque caulé profert ternûm sæpe cubitorum: folia fœniculi, longè asperi ora & latiora. qua ab imo caule vulnerata sagapenû efficitur. Aeg. Ferule semen extenuat calfacitq; medulla ipsius viridis adhuc astringit, coq; sanguinem spuentibus, & cœliacis accommodatur. (De Sagapeno suo loco dicemus.)

**φύκον.**  
**Figuier**

**F I C V S** arbor calidi tenuisq; temperamēti est, adeo vt liquor & foliorum succus non rodat modò aut abstergat vehementer, sed etiam exulceret, ora venarum aperiat, & myrmecias exterat. quin etiã purgandi vim obtinet. At syluestris ficus quam caprificum vocant, in omnia efficacior est domestica. Ficus fructus aridi in secûdo ferè ordine siccât. (Galenus habet, cal. 2. nō autem sic. 2. videlicet principio secundi, aut fine primi calefaciunt) pingues autem, duos tumores magis maturan, acriores detergunt discutiuntque. Decoctum ficuum mellis speciem referens, quod iam nonnulli siræon appellât, viribus melli respondet. Virides quidem ficus imbecillioris virtutis sunt, vtræque tamen & virides & aridæ aluum subducunt. At ficus caprifici acres & discussoriæ sunt, quemadmo-



dum ex domesticis grossi.

TRICHOMANES nascitur eisdem in *τριχομα*  
locis quibus adianton, filici simile, sed exili- *νις.*  
us: foliis lenticulæ, tenuibus, in ordinē vtrin- *capillus*  
que digestis, aduersis in se, in ramulis tenui- *veneris*  
bus, acerbis, fusco colore splendentibus. Ea-  
dem quæ & adianton præstare posse constat.  
Galenus, Trichomanes, quæcunque adian-  
tum, efficit.

FILICVLA nascitur in muscosis petris, *πολυπό*  
& vetustis arborum caudicibus, præsertim *διον.*  
quercuū, palmi altitudine, filici similis, sub-  
hirsuta, non tenui perinde diuisione. radix pi-  
lofa, in qua continentur cirri, ceu polyporū,  
crassitudine digiti minimi, coloris intus her-  
bacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis,  
Aeg. Sic. abunde citra morsum. potum, infe-  
rius purgationem molitur.

FILICI folia sine caule, sine fructu, sine *πτίς.*  
flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine *Feugiere*  
exeūt, multifida, & lateribus pinnata, subgra-  
ui odore: radice per summa cespitum nigra,  
oblōga, filices multas fundente, subastringē-  
te gustu nascitur in mōtibus & saxosis. Filix *θυλ' πτί-*  
fœmina foliis est filicis, surculosis, altiori- *σις*  
búsq;, & quæ non singulari, vt illa, pediculo  
fulciantur: radicibus longis, pluribus, obli-  
quis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. ali-  
quæ etiamnum rubræ inueniūtur. Aeg. Vim  
siccandi & amaram representat, ea que fœtus

corrumpit, latosque lumbricos enecat, instar quatuor drachmarum cum malsa pota. Quoniam verò modicè cōstringit, vlcera citra ro- sionem desiccare potest.

FLAMMEAM violā in scopā regia de- scribemus.

*μαίραθρον* FOENICVLVM in Iberia quæ ad occi-  
*Fœnuil* dentem spectat, succum reddit gummi simi-  
 lem. Caulem medium, dum herba floret ru-  
 stici demetunt, ignique admovent, quo faci-  
 lius vi coloris exudans, gūmi remittat. quod  
*ἵππομά-* efficacius succo est, ad medicamenta oculo-  
*ραθρον.* rum. Est & sylvestre fœniculum, magnum.  
*ἵππομά-* fert autem semen cachryi simile, cuius radix  
*ραθρον.* iucundè olet. Traditur aliud hippomarathri  
*ἕτερον.* genus, longo, exili, & angusto folio, semine  
 coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfa-  
 ciendi naturam habet, & viribus fœniculo re-  
 spondet, ad omnia infirmius. Aeg. Cal. 3. sic.  
 1. Hinc etiam lacti generando est, & suffusis  
 auxiliatur.

*τῆλιν* FOENVMGRAECVM ex secundo or-  
 dine calidum est è primo ficcum, idcirco fer-  
 uidas inflāmationes irritat, minus autē cali-  
 das & induratas magis discutiēdo per sanat.

*Frescs* FRAGA gerēs herba sine caule spargitur  
 humi, multis à radice lanuginosis pediculis,  
 flore candido folio trigemino, per ambitum  
 serrato atque venoso. fructu exiguis quidem  
 moris haud ab simili, cæterum sui generis,

solido calloso, tenero, rubente, tū gustu tum  
etiā odore suauiss. radice foris atra, intus can  
dida, multo fibrata capillitio. fronde perpe  
tua. Cultus diligentia non magnitudine so  
lum proficiunt, sed interdum etiam è rubris  
in candida degenerant. Herba cibo sumpta  
medetur lienosis, itē succus ex melle potus,  
Idem cum pipere candido datur suspiriosis.  
Fraga sitim sedant, stomacho prosunt, præser  
tim bilioso. Succus fragis exprimitur vetusta  
te vires accipiēs, præsentaneo remedio ad fa  
cici vlcera, oculorū suffusiones, epiphorásq;.  
Radici decoctū iocinoris feruores mulcet  
matutino & meridie potum. Cal. sic.

**F R A X I N V S** arbor nota est. Agin. Folia μελίαι  
Fresne  
eius pota viperarū moribus succurrūt. Cor  
tex crematus illitusque ex aqua lepras sepa  
rat. Ligni verò ramenta si bibantur, letalia ef  
se ferunt.

**E R V C I** marini generibus quoddam la  
tum, & alterum sublongius, & rubens. tertiu  
candidum nascens in Creta, floridum valde,  
quod nulla corruptionis labe polluitur. Hoc  
fusco quidam putant mulieres suum colorem  
mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem no  
minis qua sese fucant. Aegineta, Refrigerat  
siccátque in secundo abscessu, ac mediocriter  
etiam astringit.

**F V M A R I A.** vide Capnos.

**F V N G O R V M** differentia duplex. aut

enim māduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignūtur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut si iuxta serpētis cauernam, arborēve, quę priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Continent qui tales sunt, nescio quod strigmentum concretamque pituitam, terrāque eruti quā celerrimē computrescunt, atque marcore vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent. largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Aegineta, Frigidi & humidi admodum tēperamento sunt nōnulli ipsorum manducati etiam exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putridæ qualitatis participes.

## G

γαλβάνη

## G

A L B A N V M succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium vocant.

Maximē laudatur cartilaginofum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimē lignosum, retinens nōnihil adiecti seminis & ferulæ, graui odore, neque valde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina & ammoniaco. Si purgare galbanum voles, in feruentem aquam demittito, namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt, quas hoc modo facile

separabis : mundo linteo raroque alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, ut imum vasis non tangat : opertoque vase in feruidam aquam demittito : sic enim sincerum veluti per colum eliquescet , & lignosum in linteo remanebit. Aeg. Calfacit 3. sic. 2. Molliendi & discussoria vi donatum.

GALION, nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat. Γάλιον  
ramulum foliumque habet aparinae simillimum, rectum : florem in cacumine luteum, tenue, densum, copiosum, odoratum. radix vernerem concitat. Nasceitur in palustribus. Aeg. Siccandi vim, mediocremque acrimoniā habet : flos eius ad sanguinis ex naribus eruptiones & ambusta congruit.

GALIOPSIS, frutex in totum caulem γαλίopsis  
& folia habet viticæ, leuiora, & quæ grauem odorem trita reddant : flore purpureo tenui. Videat eē  
nasceitur circa sepēs, ædificiorum areas, ac semina offic.  
mitas ubique. Aeg. Scirrosos tumores dissipat & emollit. item ad vlcera serpentia facit emplastri modo imposita.

GALLA fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidē, sed tuberosa, solida, nullo foramine peruia. altera plana, levis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Aegineta. Omphacitis, id est immatura medicamentum est affatim astringens, eamque ob causam siccatur, fluxio-

nes repellit contrahitq;, laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisque omnibus affectionibus accommodata est. Frig. 2. sic. 3. Altera quę flauo colore inanis magnaq; est, non tantam in siccando & astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes, & procidentias excocta iuuat. Gallæ vero combustæ, & aceto restinctæ, sanguini supprimendo sunt.

γλανός.

GALLICA, genus est aceris campestre, præcipuo candore, minus crispa, rariorq;.

GALANGAE magnus vsus apud recentiores medicos tã Græcos quàm Latinos erupit. Radix vulgò etiam nota, quamuis aliunde procul comportetur. Deligenda ponderosa, rubenti cortice, gustu per quàm acri, odorata. Sunt nebulones, qui in tortis iunci radicibus in aceto piperato maceratis galangæ mentiantur acrimoniam: sed impostura detegitur, cortice derafo, qui hunc saporem ebiberat. Cal. 3. coctionem iuuat. stomachi ex frigida causa dolores finit. spiritus digerit cocta ex vino. Cerebrum roborat naribus indita. Os commendat. Ex succo plantaginis datur quibus cor palpitans micat. Coeliacis, & coli doloribus noxio spiritu conceptis auxiliatur. acidis subuenit ructibus.

γεντιανή. GENTIANAE inuentio prima assignatur Gentio Illyriorũ regi, à quo cognomen Géciane. tum habuit. foliis partim proximè radicem,

iuglandi plantaginive similibus, subrubris, partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen, paulum dissectis: caule cauo, & levi, digiti crassitudine, geniculato, & ex intervalis maioribus foliato, binum sæpe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, aceroso, satis ad spondylii semen accedente radice longæ aristolochiæ, crassa, amara. Nasctur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisque. Aegineta, Gentiana radix efficax admodum est extenuare, perpurigare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

GERANION foliis anémones, diuisis, longioribus: radice sub rotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: foliis maluæ. in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus. Aeg. eadem.

GERONTOPOGON, id est, senilis barba: foliis est hirci barbulae, tenuioribus, longioribusque, instar capillorum prælongis: caule paruo, super quæ calyx longus, & barbula quæ summo vertice senum more incana funditur. flore luteo nitet, qui involucre barbulae evanescat. lacte manat. radix est amara. iocunerosus & stomachicis succus decocti potus

γεράνιον.

Duplex,  
vna offi.

acus pastoris

alt. pesco-  
lumbin?

γερντό-

πωγον.

vulg. bar-

be de p-

stre, ou

barbe de

Dieu.

conuenit. Renum vitiis & vesicæ succurrit. Ex aceto ciet vrinas. Semen singultus sedat, aluum sistit, & intestinorū inferctum explicat. (Quantum ab hirci barbula differat ex Græci nominis descriptione, id est tragopogonis, conferendo discere potes.)

γῆθρον.

Siboule  
oucebule  
ou ciuōs.

G E T H Y V M Theophrasto penè sine capite est, ceruicis tantum longæ, & ideo totū in fronde, sepiusque refecatur, vt porrū: quapropter & illud ferunt, non deponunt, mensibus Martio, Aprili, & Maio. Secunda semente post æstiuum solstitium defigitur. Decimo aut duodecimo die profilit, sed è recenti semine maturius. Nō anniculum modo, sed & bimum quoque fructificat. Germinat è latere, vno caule consurgit, sed quo radix ipsa deficiatur, foliis intus cauis. Condimentarium est, & ceparum generis. Minimè autem durat. Plinius à Latinis pallacanā vocari tradit. Sunt è Græcis qui gethyllida pro gethyo acceperunt, quod & epithyllida vocauerunt. Didymus gethyō simile fecit ampelopraso. Epænetus capitatum porrum gethyllida tradit appellari.

γῆρον.

Mors a  
diable.

G E V M radículas habet odoratas, & iucū di saporis ad discutiendas cruditates, pectorisq; & laterum dolores.

G I N G I B E R I S sui generis planta est, γιγγίβερι in Troglodytica Arabia magna ex parte na gingēbre scens. qua virente, ad multa, perinde atque



nos ruta, vtūtur, & primis potibus & edulis admiscēt. Huius radices, cyperi modo, paruae sunt, candicantes, & odoratae, atque piper sapore imitātur. Eligi debent quae teredines non nouerunt. A multis tamen ob id cōdiuntur, quod celeriter cariem sentiant. Fictilibus in Italiam asportantur. Gingiberis cibo conueniens est, & cum condimento assumitur. Aegineta. Impensē quidem calefacit, sed nō primo statim occurſu, quod ineuictae cuiusdam & crassioris humiditatis particeps sit, propter quā etiam facile perforatur, firmam autem conseruat caliditatem.

GINGIDIVM, aliqui lepidion, in Syria & Cilicia plerunq; nascitur. herbula syluestri pastinacae similis, tenuior, & amarior, radice parua, candicāte, subamara. Olus hoc crudum, coctum, conditūmve estur. Aeg. Calorem non adeo manifestum sortitū est, catearum siccat in abscessu tertio & astringit, quae de causa & stomacho vtile est.

GITH exilibus furculis fruticat, saepe binos dodrantes excedens: foliis, vt senecionis minutis, sed multo tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, intercurſantibus intus membranis, quibus semē includitur nigrum, acre, odoratū quod panibus inspargitur. Aeg. Calefacit, siccat tertio. tenuis est substantia, vnde destillationibus in nares olfactu prodest, intus assum.

γγίδιον.

Non est haec fumararia, sed cherefolium.

μειλάνθιον.

Nyelle.

pta discutiendis flatibus singularis est: quin-  
etiam amari particeps deprehenditur, quo  
lumbricos interficit: abstergit & incidit, hinc  
quoque recta ceruice spirantibus commodè  
exhibetur. item lepras extergit, myrmecias  
eiicit, & menstrua incitat.

ξιφίον.

offic. spa-  
thula fœ-  
tida. ruri-  
gladius.  
falso lon-  
chitis exi-  
stimatur.

XIPHION, alii phasganon, alii machæ-  
ronion, Romani gladiolum, vocant. nomen  
inde accepit, quod foliū gladii præbeat spe-  
ciem. iridi simile erat, nisi minus & angusti-  
us videretur, & gladii modo mucronatū, ner-  
uosumque in caulem exit, cubitalem, in quo  
purpurei flores, in ordinem digesti, inter se  
distant: rotundo semine: radicibus geminis,  
vna, bulborū modo, super alteram insiden-  
te. quarum inferior gracilis est, superna vbe-  
rior. nascitur in aruis. Aegineta, Gladioli ra-  
dix trahit, discutit, & siccat.

GLANDES, in quercu indicabuntur.

καστανά,  
Chaſtai-  
gnes.

GLANDES Sardinæ, quas aliqui casta-  
neas, aut lopima, aut glādes Iouis appellant,  
similésque effectus præbent, præsertim tunica  
quæ carnem & corticem media intercurſat.  
caro his qui ephemerum biberūt, conueniēs  
est. Aegineta, Castanææ omni ex parte reli-  
quis glandibus præcellunt.

βαλανός  
μυρεψι-  
αίε

GLANS vnguētaria, fructus est arboris  
myricæ similis, in magnitudine auellanæ nu-  
cis, cuius nucleus græcarum nucum more tri-  
tus, humorē reddit, quo ad preciosa vnguen-

ea pro oleo vtuntur . nascitur in Aethiopia, Aegypto , Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præfertur plena, recens, candida, quæ facilè delibretur. Aeg. Quæ intra vnguentariam glandem ceu carnosæ sunt, abstergerendi incidendiq; cū astrictione vim habet, eamq; ob causam denarii vnus pondere cum mulsâ pota , facile vomitiones cient, & inferiorē ventrem subducūt, cum posca verò laxandis extis accommodata sunt . Item cutis vitia cum aceto peruncta exterunt. Cortex alioquin egregia astringendi virtute pollet.

**SATIVVM** glastum quo infectores la- *ioartid*  
narum vtūtur, folium habet plātagini simile, Guedum  
verū pinguius nigriusq; . cuius caulis duūm ou guel-  
cubitorum altitudinē excedit. Sylvestre gla- dum ou  
stū satiuo simile est, folia fert maiora, lactu- lherbe de  
caceis proxima . caules prætenues multofi- S. Philip-  
dos, quadam tenus rubentes: in quorum ca- pe. ou In  
cumine folliculi multi dependent, quandam dicū à co  
linguarum effigiem referentes, in quibus se- lore . pa-  
men, flore tenui, luteo. Eadem quæ & suprà stilli ab  
dicta præstat . potu & illitu lienosis auxilia- effigie.  
tur. Aegineta, Isaris domestica qua tinctores  
vtuntur , siccandi vires & astringendi habet.  
hinc est quod magna vulnera in duris glutina-  
nat corporibus, sanguinem erumpentē com-  
pescit, laxos tumores discutit, ac omnibus  
malignis vlceribus resistit . Sylvestris au-  
tem cum magis rodat, magisque ideo siccet,

valentius aduersus humidās putredines pugnat, ad cætera deterior, vt quæ immoderatus mordeat. Cæterum ob virium vehementiam lienosis quoque vtiliter adhibetur.

γλαύκιον  
memitha  
offi.

GLAUCIVM, succus est herbæ quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, foliis ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terrâ sparsis odoris tetri, gustus amari. tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, vsque dū flaccescant, deinde confusis succum exprimunt. Aegineta. Glaucium astringit, gustanti nonnihil ingratum, manifestè refrigerat, eaq; vi sacris ignibus non validis succurrit.

γλαύξ.  
Nomen  
vulgo nō  
habet.

GLAUX cytiso & lenticulæ foliis similis, quæ supernè virent, auersaq; candidiora spectantur. ramuli à terra exiliunt quini senive, tenues ab radice, dodrantē alti. flores ceu violæ albæ, purpurei exeunt, minores tamen. nascitur iuxta mare. Aegineta, Calidi & humidi temperamenti gratia lacti generando idonea est.

γναφάλιον.  
Vulg. cruciata.

γοσύνπιον.

GNAPHALII foliis mollibus minutisque pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam. Sunt enim calida & modicè astringentia. Aeg. (Vide Clematis tertia.)

GOSSIPIVM in Xylo declarabitur.

ἄγρωσις.

GRAMEN geniculatis serpit ramulis, à quibus

quibus crebro radices spargit dulces, articu- Dent au-  
lis præcinctas. folia dura, & vt arundinis par chien.  
uæ, lata, in exilitatem fastigiantur, eaque iu-  
menta & boues pascunt. Est & arundinaceū  
gramen, priore multo maius, quod iumenta  
necare traditur, præsertim in Babylone: idq;  
iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso monte  
gignitur, densius fruticat: foliis hederaceis:  
flore odorato, candido: semine paruo, non  
inutili: radicibus quinis aut senis, digitali  
crassitudine, candidis, mollibus, & admodū  
dulcibus. Natum in Cilicia gramen, quod  
incolæ cinnam appellant, boues inflammat,  
si eo virenti sæpe pascantur. Galenus: Gra-  
minis radix mediocriter frigefacit & siccāt.  
Parū aliquid mordax habet ac subtile. Her-  
ba frigefacit primo, inter humidum & siccū  
media. Huius semen alibi quidem imbecillū  
est, in Parnaso autem inuentum siccāt, sub-  
tile, subacerbūque est.

GROSSI, quæ erinci nonnullis vocan- ὀλυνθοί.  
tur, acres & discussorii sunt, liquoris gratia  
qui in ipsis cōtinetur. Cocti igitur duros tu-  
mores dissipant: crudi myrmecias & thymos  
exterunt. Aegineta.

GUMMI siccante vi & emplastica pol- ὁμόμυτος  
let, & nimirum asperitatibus medetur.

## H

*ελιμος.*  
Blanche  
putain.

H

**A L I M V S** frutex est sepimentis idoneus similis rhamno, sine spinis, foliis oleæ, sed latioribus. nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Aeg. Dissimilariū partium est, falsum gustu, & leuiter astringens, maxima ipsius pars calore temperata cum humiditate insuperabili est, & lactis vbertatem conciliat.

*καλαμος*  
Cane ou  
arunde.

In **H A R V N D I N V M** genere quædam nastos, id est farctior, vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. alia foemina, qua tibiæ ligulas efficiunt. alia quod fistulis addita sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. alia crassa, concaua, apud amnes nascens: quæ à quibusdā cypria, ab aliis donax appellatur. alia phragmites seu vallatoria, gracilis, cadicans, vulgò cognita. Aeg. Calamus phragmites extergit, folia ipsius viridia mediocriter refrigerant. Cortex crematus calfacit, siccat tertio. Radicem cum bulbis illitam spicula & aculeos extrahere asserunt.

*ασφodelος.*  
haste roy  
alle. offi.  
afrodili.

**H A S T V L A** regia vulgaris notitiæ est, foliis maioris porri: caule læui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant. radices subiacent oblongæ, rotundæ glandibus similes, gustu acres. Aeg. Asphodeli radix vim habet detergentem discutientemque,

Concremate autem ipsius cinis calidior, siccior, & tenuior euadit, quo fit ut pilorum defluuiis medeatur.

**HEDERA** differentias multas in specie κισσός.  
 fortitur, summas autē genere treis. Nam quæ Lierre.  
 dā candida est, altera nigra, tertia helix candida, fructū fert candidum: nigra nigrū, aut croci emulū, quā vulgus Dionysiam vocat, helix fructū non gignit, sed albas habet viticulas, & folia parua, angulosa, & concinniora. Aeg. Hedera contrariis constat viribus, ut quæ astringat & refrigeret. Item acris est & calida, aquæ substantiæ & tepidæ, cum viridis est, particeps. Eius folia vino incocta vulneribus glutinandis, ambustis & lienosis salutariter adhibetur. Succus ipsorum naribus ad pituitam educendam iufunditur. diuturnis aurium defluxionibus succurrit. Lachryma hederæ, ut quæ acrior sit, pediculos enecat, & pilos abolet.

**HEDYSARON**, vide Securidaca.

**HELENIVM** folia habet verbasci angustioris folii, asperiora, oblōga: caulem quibusdam in locis non emittit: radicem subalbidam, interdum subrufam, odoratam, subacrem, vegetam, magnā, ex qua agnatæ propagines liliorū aut ari modo feruntur. Montibus in vmbrosis, siccoque solo prouenit. Foditur æstate radix, particulatimque dissecta siccatur. Alterum helenii genus in Aegypto

ἐλένιον.  
 offi. enula.  
 la. rur. cā  
 pane, ou  
 enula cā.  
 pana.

gigni Crateuas tradit. herba est cubitalibus ramulis, serpilli modo per humum repentibus: foliis, lenticulæ circa ramos, sed longioribus crebrisque: radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassa cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusque. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur. Aeg. Heleniū calidum est & siccum cum excrementitia humiditate. quare & eclegmatis temperatū infarctos thoraci humores educit: ac particulæ ex eo ruborem contrahunt.

ἡλιότρο-  
πιον.

herb. flos  
cācri. fal-  
lūtur, qui  
soulfiz  
putēt, aut  
offi. calē-  
dulā, aut  
solis spō-  
sam.  
Siue scor-  
piuron.

HELIO TROPION magno flos est effigie scorpionis caudæ, vnde scorpiuro ei nomen. & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. folia ocimi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora. ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliūt, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfuluus, incuruatur vt scorpionis cauda. radix tenuis est, & inutilis. nascitur in asperis. Heliotropion paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, foliis antedicto proximis, rotundioribus: semine acrochordonum verrucarum modo, pensili rotundo. Aegine-ta, Maius calidam, siccam & abstergentē vim præ se fert, cui<sup>9</sup> decoctū potu educit pituitā, bilēmq̃ue. Illitu fructus ipsius myrmecias & huius notæ vitia perficcat. Minus autem heliotropium & hæc abolet, & lumbricos in-



cerimit, si cum fructu, nitro, hyssopo, & cardamomo bibatur.

**HELXINE** nascitur in parietinis, sepibus & maceris, folia ei mercurialis insunt, Parietaria hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos veroumuti semina aspera, adhærentia vestibus. Aegina, Hanc alii aliter nuncupant, perdicium, parthenium, sideritim, heracliam. abstergit, leuiter astringit cum humiditate subfrigida,

**HELXINE** cognomēto cissampelos, foliis est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus complectitur quodcunque contigerit adminiculū. nascitur in sepibus, vinetis, & vineage, fegetibus. foliorū succus potu deiecit aluum. Aeg. Vim habet discutiendi.

**HEMEROCALLIS** foliū & caulem habet lilii, porraceo colore. flores in caule per singulosexortus terni, aut quaterni erūpunt, lilii diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore per quā pallido. radix magna est atque bulbosa. Aegineta, Radix eius viribus lilio respondet, similiter illi ambustis opitulatur.

**HEMIONITIS**, quam aliqui splenion vocant, folium emittit dracunculi, lunatum. radicibus cohæret multis, tenuibus. nunquā flores, neque semen, neque caulem gignit, in petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto nonnullis pota lienem absomit. Aegineta, Astringens lingua

simul & amara est, idcirco lienosis cum aceto pota succurrit.

**Ἑρμολάκων** **HERMODACTYLI** radix per se, & **κτυλοι**. ipsius decoctum, vim habet purgandi: arthriticis priuatim cum humores defluunt exhibetur. Stomacho vehementer aduersatur. **cant.** Aegineta.

**Ἑκκινθος** **HYACINTHVS** folia habet bulbi: drantalem caulem, minimo digito tenuior. Vacietū, rem, herbacei coloris: comam procumbentem, ouo ignōtē, florum purpureorum plenam, incuruam: **σαυλαγε** radicē bulbaceam. Aeg. Radix siccat primo, frigefacit secundo. Pueros itaque impuberes diu conseruare cum vino illita creditur. Semen leuiter abstergit astringitque, idcirco arquatis cum vino datur, vt quod desiccet magis quān refrigeret.

**Ἑδρολάκων** **HYDROLAPATHVM** rumex est in docques. aquis nascens.

**Ἑδροπί** **HYDROPIPER** apud aquas nascitur **μαρι**. quæ stagnāt, aut pigro lapsu repunt. caulem off. & me edit geniculatum, prædurum, multis alis cōdici p euca am: folia menthæ, maiora, molliora, canpatorio didioraque, gustu piperis, acri, citra tamen falso vtūt vllam odoris gratiam: fructum acrem, in surquemad culis paruis, prope folia racematim coheren modū & tem. Folia cū semine illita tumores veteresq; q curage duritias discutiunt. sugillata delent. quæ post & pficare quam inaruerūt, tusa pro pipere in obsoniis velint eē. admiscuntur. Radix parua, nullius in medi-

cina momenti. Aegineta. Herbula est calida, sed non piperis modo. Facultates similiter Dioscoridi docet.

**HIERACIVM** magnum, caulem emit tit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia söncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi. vnde illitum, stomacho æstuāti, inflammationibúsq; prodest. succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. herba cum radice illita, vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores orbem circinātes emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit. (Aegineta non habet.)

ἱεράκιον  
μικρ.  
cichoree  
iaulne.

ἱεράκιον  
μικρόν.  
cichoree  
sauluag e

**HYOSCYAMVS** vide in litera, a. fo. 24

**HYOSIRIS** intubo similis traditur, sed humilior & tactu asperior. Vulneribus confusa præclarè medetur.

ὑόσιρις

**HYPEROON**, aliqui hypopheon vocāt. nascitur in segetibus aruísq;, foliis rutæ, exilibus ramis. Aegin. Frig. 3. papaueris viribus proximum.

ὑπέρκοον.

**HYPERICVM**, alii androsæmon, alii corion, alii chamæpytyn appellant, quoniā semen odore resinā imitatur, surculaceo frutice, dodrantali, rubente, folio rutæ; flore al-

ὑπεριόν  
mille per  
ruison p-  
forata.  
vulg. ou  
herbe S.  
Iehan

be violę, luteo, q̄ digitis tritus sanguineū succū remittit, qua ex causa androsēmon cognominatur: subhirsuta filiqua, & tereti hordei magnitudine, semine intus nigro, resinosi odoris. gignitur in cultis & asperis. Aeg. Hype-ricum duplex est. Alterū, quod androsēmon & ascyrrhon appellatur, expositum est: alterum verò calefacit & siccatur, tenui substantia præditū, eoque; vrinas elicit, & menstrua citat. Totum ipsius semē si cum foliis illinatur viride, cicatricē vulneribus obducit. Arida verò folia oblita vlceribus medentur. dantur etiam potioni aduersus coxarum dolores.

Al. hypo-  
glosson.  
ὑπόγλωσ-  
σος.

H I P P O G L O S S O N, frutex est folia habēs rusci tenuis figura, & spōsam comā, & in summo ceu linguas ē foliis exeūtes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. malagmatis radix succūsque; admiscetur. Aeg. Frutex est pusillus, cuius radix & succus emolliendi virtute pollent.

ἵππολά-  
παθον.  
offi. pari-  
celle, ou-  
grāde o-  
zeille.

H I P P O L A P A T H O N olus est magnum in paludibus nascēs. easdem habet vires quas supradicta rumicis genera. Aētius: Consimile est facultate lapathio, sed imbecillius.

vulg. pa-  
zelle.

H I P P O M A N E S, secundum Crateiam, planta est fructu cucumeris syluestris, folio autem nigriori, tāquam papaueris spinoso. Hęc Theocriti interpres. Sed apocynon etiam hippomanes cognominatur.

**HIPPOPHAES**, quo fullones vestes in- *ἵπποφάνης*  
 terpolât, in sabulosis maritimisque nascitur, Lappago  
 furculaceo frutice, vndiq; denso & largo, fo seu lap-  
 liis oleæ longioribus, mollioribusque: inter pula  
 quæ caudicantes spinæ emicant, siccæ, angu-  
 losæ, interstitio quodam distantes. flores he-  
 deræ corymbis similes, racematim cohæret:  
 minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte  
 rubescentes. radix lacteo succo madet, crassa  
 mollis, amara gustâti. ex qua, perinde ac tha-  
 psia, succus eximitur, qui per se, & cum erui  
 farina subactus, siccatur, & ad vsum recondi-  
 tur. Aegineta, Alij hippophyes vocant. Radi-  
 cis liquor cum erui farina instar denarii da-  
 tus, bilem ac pituitam purgat. Item totus ip-  
 se frutex siccatus, ad purgationes accommo-  
 datur.

**HIPPOPHAESTON**, id quod aliqui hip-  
 pophaës appellât, nascitur eisdem locis qui-  
 bus hippophaës, estq; spinæ fulloniæ genus,  
 humilis herba, sine cauliculo, sine flore: ina-  
 nibus tantum capitulis: foliis parvis, spinosis  
 radículas habens molles, crassas. Succus radi-  
 ce, foliis, & capitulo exprimitur, & exiccatur  
 Aeg. Succus trium obolorum pondere, cum  
 aqua mulsâ ad pituitam & aquâ vacuandam  
 exhibetur: maximè congruit non nisi subre-  
 cta ceruice spirantibus, comitialibus, & ner-  
 uorum affectibus.

Al. Hypo-  
 pheston.  
*ἵπποφαι-  
 στον.*  
 Lappago  
 seu mol-  
 lugo

Ache ou

**HIPPOSELINYM**, Latini olusatrum hacche

appellāt, aliqui smyrnion. quamuis aliud sit, quod propriè smyrniō dicitur, vt paulò pòst referemus. Est autē maius, & satiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habēte veluti lineas: foliis latioribus, in puniceum vergentibus: coma roris marini, florum plena, dependentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflorescat. ea semine turget nigro, oblongo acri, solido, arōmatico. radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In vmbrosis & palustribus enascitur. olerum generis, vt apium. radix cruda coctāve estur. folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudāque muria condiuntur. Aegineta, Cum apio domestico virtute cōuenit, nisi esset imbecillius.

H I R C I barbulam in Tragopogone describemus.

ὑσώπος.  
Hysope

H Y S S O P V M, herba nulli non cognitā, duūm generum est, montanum & hortense. Optimum est Cilicium. Aeg. Calefacit, siccatur. 3. tenuisq; substantiæ est.

ὄλκός.

H O L C V S in faxis nascitur siccis, aristas habet in cacumine tenues, culmo quale hordeū restibile. Hæc circa caput adalligata, vel circa lacerrū educit aristas è corpore: quare nonnulli Aristidam vocauerūt. Multis eam esse contendunt inter saxa proueniētem. Alij syluestrem esse volunt auenam.

**H O L O S T I O N** quadrátalis herbula est, Al.όλο-  
 humi repens: foliis viticulísq; coronopo aut steum  
 graminí proximis, gustu astringentibus: ra- δλόσιον.  
 dice alba, prætenui vsque in capillamenti spe Herb.  
 ciem, longitudine quatuor digitorũ. nascitur mollegrá  
 in collibus terrenis. Carnes coguntur, deco- men. ruri  
 ctionibus addita. Aegni. Siccat, astringítque, canisdétí  
 hinc eo ad rupta vtuntur. culus &

**H O R D E V M** optimum est, candidum duua. nō  
 purúmque. Aegineta, Frigefacit, siccat pri- est hęc pi  
 mo. Nonnihil etiam extergit. Cæterum faba losella  
 rum lomento ficcitate præcellit, minus flatu κριτή.  
 lentum est. Polenta hordeo multo magis sic- Horge  
 cat. Pisana præter quod largius humectat,  
 etiam abstergit vehementius.

**H O R M I N V M** herba est, foliis marru- ὄρμινον  
 bio similis, caule semicubitali, quadrangulo, Satinũ,  
 circa quem eminentię siliquis similes prode oruale  
 unt, quæ ad radicem spectāt, in quibus diuer toute bō-  
 sum semen recluditur. siquidem in syluestri ne  
 rotundum, fuscúmque inuenitur: in altero, ni offic. galĩ  
 grum, & oblongum, cuius est vsus. Syluestre tricum  
 magis viribus pollet: quare vnguentis, præ herb. cen  
 fertim gleucino, permiscetur. Aegineta, Cali trũgaline  
 dum est mediocriter siccum & abstergens, vulg. sal-  
 venerem igitur stimulat. oculorum crassities uia transf  
 cum melle repurgat, tumores laxos discutit, marina  
 & extrahit aculeos. Syluestre domestico est  
 valentius.

## I

Nó mul-  
tū differt  
à liferon  
ou lifer-  
rotte

I

A S T O N E olus est sylueſtre, hu-  
mi ſerpens, copioſo lacte, flore  
candido, & in hoc nobili quòd

ſingulari folio conſtet, ſed ita implicato, vt  
plura videantur, floris margine in angulos  
exeunte. Plinius florem Còcilium ait appel-  
lari: ſed quę Theophrastus de folio floris, ea  
Plinius de folio herbę ſcribit. Commédatur  
herba ad ſtimulandos coitus. Cruda, & ex a-  
ceto pota, lactis vbertatem præſtat. Salutaris  
eſt tabem ſentientibus. infantium capiti illi-  
ta, nutrit capillum, tenacioremq; eius cutem  
efficit.

ἰβηρίς.

Lepidiū  
ſylueſtre  
fortè. her-  
ba. præ-  
ſis Vale-  
riana

I B I S C V S, quęre Althæa.

I B E R I S, ſiue cardamantica, folia habet  
naſturtij, vere virentiora: caulem cubitalem,  
aut minorem. in incultis naſcitur. æſtate la-  
ctem florē promit: quo tempore efficacior  
eſt. Radices duas naſturtio ſimiles habet, cal-  
facientes & adurentes, ipſe enim iſchiadicis  
cū ſalfa axungia emplaſtri modo viles, qua-  
ternis horis alligatę, vt dein in balneas deſcē-  
datur, & poſtea oleo cum lana locus perun-  
gatur. (Aeg. omiſit.)

ἰδαία  
ἰῖς α.

I D A E A E radici folia ſunt ea quę ruſco.  
adhærent his veluti exigui pampini, in qui-  
bus flos. Aegineta, Guſtu acerba, & viribus  
ſanguinis eruptionibus & reumaticis affecti-  
bus tum pota, tum extrinſecus impoſita ac-



commodatur.

**I L E X** similes quercui vires habet, sed multo ea est validior. Galen.

**I L E X** est gemina Columelle, minor apibus quæ sita: & prolixior, omnibus improbatamellificio. πείνος.

**I L L E C E B R A**, vide semperuium tertium. ἀνδρά-

**I L L E C E B R A**, quæ Græcis andrachne χρη.  
agria nonnullis minus semperuium, sylue- ἀγρία.  
stris est portulacæ genus, maiori semperuiuo Πορπικ  
simile, nisi quod folia habet, pusilla, sed latiora, maculosaque: item breuius cacumē, suis  
cauliculis, gustu salum, lacteo succo, radice  
tenui, candida. Nascitur in petris, & in sterquiliniis. Colligitur cibi causa, esturque cum  
ficibus. Succo bilem regio morbo laborantibus per aluum exigit. Ructus compescit acidos. Vētris tumores, & iocinoris vitia leuat, vrinam ciet. Eodem ægilopas Aesculapius curauit. fauluage

**I M P I A** Plinio vocatur incana, roris mari offi. Chri  
ni aspectu, thyrsi modo vestita: inde alij ramuli adsurgunt, sua capitella gerentes. ob id stoculus  
impiam appellauēre, quoniam liberi supra parentem excellāt. Alij potius ita appellatā, quod nullum animal eam attingat, existima uēre. Hæc inter duos lapides trita feruet, præcipuo aduersus anginas succo, lacte & vino admixto. Mirumque traditur, nunquam ab eo morbo tentari, qui gustauerit: itaque &

suibus dari, quæque medicamentum id noluerint haurire, eo morbo interire. Sunt qui & in auium nidis inferi aliquid ex ea putet, atq; ita non strangulari pullos auidius deuorantes. Floret vere, tuncque decoquitur ad serpentium morsus. Succo eius, vel etiam cinere, fistulas impleri tradunt.

I N T Y B V S. Quære Seris.

*Ἰοςῶν-  
θος.*

Coque-

lourdes

*Ἰερίσιμον*

Ireon, ou

bruca ge

ratina,

outorte-

la

I O V I S flos inodorus est, nec nisi coloris gratia coronamentis additus: æstius est, colore purpureo.

E R Y S I M O N, Latini irionem vocant, iuxta vrbes, rudera, hortosque nascitur, foliis eruce syluestris: cauliculis in lori modum lētis, & obsequiosis: floribus luteis: siliquis in cacuratina, mine gracilibus, ut foenogreco, corniculatis: semine nasturtij, exiguo, vrentis gustus. Aegineta, Erysimi semen igneum calefactorium: que est, nasturtio similiter: quare in fermento tostum, thoracem purgat in eclegmatis assumptum, duritiasque emollit, & cæcos canculos illitu adiuuat.

*Ἴρις.*

Herb. cœ

leste liliū

rur. flāme

ou glain

I R I S à cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, leste liliū latiora, & pinguiora. Flores à caule æqualibus inter se spatiis distāt, varij: siquidem can didi, pallentes, lutei, purpurei, aut cœrulei conspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quædam cœlestis arcus imago repræsentari videtur. Radices subiacent geniculatæ, du-

ræ, odoratæ : quæ frustatim dissectæ , in umbra siccantur , & traiectæ lino reconduntur. Melior est Illirica , & Macedonica : & inter has laudatissima , quæ pumila ferè & densa constat radice, frangenti contumax , subrufo colore, gustu amaro, odore perquam sincero , ita ut nullum prorsus situm redoleat. quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locum habet Africana , candicans, gustuque amara. Teredines in vetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Aegineta, Affatim calfacit, extergit, & maturat, tenuis substantia, tussi utilis. humores in pectore contumaces extenuat, torminibus medetur, sordida ulcera purgat, cum mulsa pota aluum inanit.

ISCHAEUMON serpit in terra milio simili *ἰσχαίμων*  
 les, foliis asperis, & lanuginosis. Thracia eam *Miliū syl*  
 inuenit, qua ferunt sanguinem sisti, non aperta *uestre q-*  
 modò vena, sed etiam præcisa. Farcitur *dam esse*  
 in nares ad cohibendum inde sanguinis *volunt*  
 profluuium. Quæ in Italia nascitur, & sanguinem sistit eadem adalligata unde cruor manat.

ISOPYRON aliqui Phasiolon ob similitudinem vocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pampino torquetur. capitula sunt in summo caule tenuia, plena seminis, melanthii gustu imitantis. Aeg. Semen amarum ac modicè acerbum est, ob quod crassos

glutinososque humores abstergit & incidit, sic vt corpora contrahat stringatq;. hinc etiã quæ aliè defident expurgat, excreationibus sanguinis non inefficax.

*σχοῖνος*

I V N C I duo genera. vnũ læuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. Vnum sterile, reliquum fert semen nigrum, rotundum: & crassiore constat calamo, carnosiore-  
que. Tertius est iuncus qui vocatur oloschœnos, prioribus carnosior, asperiorque. is similem supradicto fructum in cacumine parit.

Merisca  
balgo

Aethiopici iunci semine somnus allicitur. sed modus in portione seruandus est, ne sopor fiat. Aegin. Oyschœni, id est, acuti iunci semen est somnificum: holoschœni autem dicti, minus, idem & capiti dolorem facit. Vtriusque semen frixum si cum vino bibatur, alui fluxus deficcet, & mulierum fluxiones cohibet.

*σχοῖνος*

*ἀρωματίζον*

offi. sguin-  
natiũ vul-  
go pestil-  
liis came-  
lorum

Odoratus I V N C V S, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit. igne mordacitatis ad linguam. floris, culmorum, radicisque est vsus. Aegine. Flos modicè calefacit, minus astringit, tenuem naturam sortitus, quæ vrinam mouet, & menses trahit,

obstructaque referat in fomentis, potu, & cataplasmatibus adhibitis. radix adhuc magis flo-  
re astringit, sed ille calidior.

I V N I P E R I genera duo. altera maior, *ἀκτινόβορ*  
altera minor. Baccarum nonnullæ nucis iu- *luniefre*  
glandis magnitudine nonnunquam grande- *ou gene*  
scere, aliæ nucem Ponticam æquare inveni- *ure*  
untur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dul- *ἀκτινός*  
ces, subamaræ: quæ arceuthides etiam, id est, *des*,  
baccæ iuniperi, nominantur. Aeg. Cal. sic 3.  
fructus autem cal. 3. sic. 1.

## L

*ὀκνάνθη*A B R V M Veneris, Dipsacus. *Vigne*

## L

L A B R V S C A duorum generum *fauluage*  
est, alterius vua non maturescit, *viorne*

sed flore tenuis cenanthen nominatam per- *ouhardie*  
ducit. altera ad frugem peruenit, parvis aci-  
nis, nigra, & astringens. Folia, caules, & cla-  
uiculæ, quibus repunt, vim habent cultæ viti  
similem.

L A B V R N V M arbor alpina Plinio, nec  
vulgo nota, dura & candida materia, cuius  
florem cubitalem longitudine apes non at-  
tingunt. odit aquas, nec nisi in siccis pro-  
uenit.

L A C T O R I S nota vulgò, secundum Plin- *Lactaria*  
nium, plena lactis, quod degustatum vom- *ou ana*  
itiones cõcit. Eandem hæc aliqui esse dicunt, *bula*  
alii similem illi quam militarem vocant, quo-

niam vulnus ferro factum, nullum non intra dies quinq; sanat, ex oleo imposita.

*Opidaξ.  
Laietue*

LACTUCA olus est non summè frigidū humidumque, sed pro fontanæ aquæ temperamento, quapropter calidis inflammationibus cōuenit : præterea sitim potu restinguit, & genituræ fluorem cohibet.

*Opidaξ  
Ægyptos.  
Videñ es  
se off. cn-  
diuina*

SYLVESTRIS lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. amaro gustu est, & viribus aliquantum papaueri similis. vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aegineta, Superiori minus & refrigerat, & humectat, verum succulentior existit.

*Λάδανον  
Strobon  
recentio-  
res vocāt*

Est & alterū cisti genus, LEDON à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascentis, longioribus foliis, & nigrioribus, quæ verno tempore quiddam cōtrahunt pingue. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhærescentem reportant. quam depectentes incolæ, colantesque cogunt in offas, & ita recondunt. Alii vero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in ladanum. Maximè probatur odoratum, subuiride, facilè mollescens, pingue, quod arenas nō collegit, nec squalore oblitum est,

resinosum, quale, in Cypro gignitur. Arabicum verò, Libycumque, vilius. Aegineta, Ladanon medicamen est præstantissimum, in secundo ferè abscessu calidum, natura tenue, emolliens mediocriter, discutiens & maturans: eòq; vteri affectionibus peculiariter cõuenit. habet præterea nonnullas astringendi vires, quibus defluos capillos confirmet.

LAGOPVS herba sistit aluũ in vino pota: aut in febris, ex aqua. eadẽ inguini alligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus. Siccæ facultatis est. Aeg.

LAMPSANA syluestre olus est. plus alit quàm rumex, & stomacho vtilius. cuius folia caulésque coquuntur in cibo. Aeg. Manducata prauum succum gignit, illita verò nonnihil abstergit, discutitque.

LANARIA, memorabitur in Radicula.

Ex generibus rumicis, oxylapathum vocant, quod in acutum tendit. prædura habes extrema, nõ nisi in palustribus nascens. Alius est fatius, illi dissimilis. tertiu genus syluestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum. Quartum est quod alii oxalida, alii anaxyrida, aut lapathon vocant. folia eius syluestri ac exiguo rumici similia, zeille me caule nõ magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule & agnatis appendicibus emicantes. Aegin. Rumex mediocriter discutit. Oxy lapathũ præter id etiam paxillum repellit:

λαγώ-

πες.

Vulg. trinitas

4. trifolii genus sit

λάμ-

ψανα.

Sanure

blanche,

rauela q̃

ou pou

rette

λάπαθον.

offi. lapa

thũ acutũ

surelle o-

folia eius

zeille me

nue Ace

tosã nũc,

te. Aegin. Rumex

discutit. Oxy

oze ille

Semen autem, præsertim oxylapathi, astringens, alui profluuia (diarrhœas dicunt) & intestinorū tormina persanat. Folia verò semini contraria faciunt: hæc etenim comesta aluum mouent, illud potum ipsam cōprimit.

σέλφιον.

L A S E R P I T I V M in Syria, Armenia, Media & Libya nascitur, caule ferulacco, quem maspetum vocant: foliis apio similibus: lato semine. Radix in cibis ægrè coquitur, os commendat cibis aut sali permittitur. *offic. à se* Lafer è radice atque caule scarificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non porraceum, odore valens, suauis gustu: quod dilutum faciliè albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet. blandissimo odore, adeò vt ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Lafer omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: quod maleficiumprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia maspeton vocauêre. Efficacissimum lafer, mox folia, postremò caulis. Fertur & altera magudaris in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum lasare facultatis. Aegineta, Probè calefacit, flatulentum est, & cōcoctu per-



uicax. à foris corpori applicatū efficacius deprehēditur, magisq; liquor ipsius, extrahendi potēs, item & superexcrementia amoliēdi.

**LATHYRIS**, quam aliqui tithymalū, *λαθυρίς* appellunt, cāmque tithymalorū numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem. gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuiora. quę autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongę hederæ figura. In cacumine fructū summis surculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparin, in quo grana intercurrentibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda. quę dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis vsus. totus frutex lacteo succo turget, vti tithymalus. Aeg. Succus eius instar tithymali purgat, semen autem præcipuam purgandi vim habet.

**SION** in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, foliis latis, olusatro similibus, sed minorib<sup>o</sup>, & odoratis. Quę cruda coctāq; viriū suarum gratia eduntur. De Sio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quàm menthæ, nigra, & ad crucam accedentia. Aeg. Sion calidum est, vrinam ciet, digerit per halitum, renum calculos terit, menses euocat.

offi. cata  
putia ma  
ior, vulg.  
espurge

*σιον*  
Lauerlat.  
off. beru.  
ou laber  
le vulg.

Λαύριον  
Laurier

L A V R V S quædam tenui folio cõstat. altera latiore. Aegin. Lauri arboris folia siccant, & calefaciunt insigniter, magis quoque fructus. Radicis cortex amarus, & leuiter astringens, calculos comminuit, & iocinorosis opitulatur cum uino odorato triobolari ponere potus.

Λαύριον  
Ἀλεξάνδριν  
Ὀξυα.

L A V R V S Alexádrina, folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine, ramos spargit in terra dodrátales, interdum longiores: radice syluestri myrto simili, maiore, molliore, odorata. inuenitur in montosis. Aegin. Calida, acris, & subamara est, idcirco menses & urinas commouet.

Φακίη.  
Lentille

Aeg. L E N T E S in 2. ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamēto donatæ: sed astrictiõnis quoque nonnihil habent. Totum quidem lentis corpus siccatur, aluũmque sistit: decoctum vero ipsius proritat, ideoque prior aqua defunditur, quum astringēdi gratia lentes assumantur.

Φακὸς ἐπὶ  
τελευτάων.

L E N S palustris, inuenitur in aqua non fluente, muscus lenticulæ similis. Aeg. Humectat, refrigeratq; in secundo abscessu.

Léticule  
de d'caue  
Ὀχρίνος.  
Létische

L E N T I S C V S nota arbor est. Aegin. ta, In omnibus sui partibus siccatur secundo absolutè, calefaciendo autem & refrigerando medius est, adeò astringens, vt ad hypocistidis succum astrictiõne accedat.

Lenciscus resinam gignit, quę lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. præfertur nitedulę modo resplendescens, & candore Tyrrhenicę cerę similis, adulta, re-torrída, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinęq; pineę nucis mistura. Aegin. Ma-  
stiche, Chia quidem calefacit & sic. i. Cæte-  
rum compositę est facultatis, astringentię si-  
mul & emollientis: hanc ob rationem stoma-  
chi, ventris, intestinorum, & iocinoris inflā-  
mationibus rectē accōmodatur. Aegyptia,  
nigriore colore quodammodo, siccatur magis  
& discutit, minus astringit, hinc furunculos  
quoque dissipat.

LEONTOPE TALON, caulem emit-  
tit dodrantalem, aut altiore, plurimis a-  
lis concanum, & in cacumine semina parua  
duo, aut tria, in siliquis, ciceris modo: flo-  
res anemonę similes, punicei coloris: folia  
brassicę, sed papaueris diuisura. radicibus  
nigris, rapę similibus, strumosis. nascitur in  
aruis, & segetibus. Aegineta, Radix cal. sic.  
3. discutitque.

LEONTOPODION duūm digitorum  
herbula est, folia forēs angusta, longitudine  
ternū quaternūve digitorū, hirsuta, quę iu-  
xta radicē lanosiore flocco canescūt, capitula  
in summo caule quasi perforata: flores nigri;

μαστιχη

λεοντοπέ  
ταλον.  
offic. &  
herb. pat  
talconis

λεοντοπέ  
διον.  
Videť ef-  
se quęcu-  
ciata

semen vsq; adeò spiffa lanugine inuolutū est, vt fæpe fallat: radice parua ce hæret. quā tradunt appenfam ad amatoria prodeffe, & tubercula difcutere. Aeg. non habet.

LEONTOPONTIVM à fuperiori differre videtur, alii liceron, dorypetron, & toruëtoron vocant, radix eius aluum fiftit. Purgat bilem in aqua mulfa addito pōdere denariorum duūm. Nafcitur in campeftri & gracili folo. Semen eius lymphatica fomnia facere dicitur, & tela omnia infixa corpori extrahe retritum cum polenta, & cū eadem fpicula fagittariorum elicere.

λεπιδιον  
offic. &  
herb. ra  
phanūvo  
cant,

LEPIDIVM aliqui gingidium vocant. herbula vulgò nota. muria cū lacte feruatur. Aegin. Aliqui hyperiadem vocant. cal. 3. Nafurtio proximum viribus, minus autem eo deficcatur.

λευκά  
κινθα  
Rham  
nus est.

LEVCA CANTHA prædita eft radice cyperi, valida & amara. quæ māducata dolo rem dentium fedat. veteri laterū dolori, atq; ifchiadicis prodeft, decocto cyathis tribus ex vino poto. eadem ruptis & cōuulſis medetur. radicis epotus fuccus eofdē præbet effectus. Ag Alii polygonatum, alii ifchiada vocant. radix incidit. Cal. 1. fic. 3.

λευκά  
Attriplex  
rustica  
effe videt

LEVCA S mōtana, latioribus quàm vrba na foliis, femine acriore, amariore, ori in gra to, efficacior tamē quàm fatiua habetur. vtra que ex vino contra animalium venena, præ-

cipue marinarum opitulatur. Aeg. Cal. sic. 3.  
acrimonia præpollet.

LEVCOLION vulgaris est notitiæ, sed in floribus differentia quædam. nanque aut cœrulei, albi, purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea verò præcipui in medicina vsus. Aegineta, Lecoii totus frutex absterge di extenuandi que vires possidet: magis autem flores, & ex eis, sicciore. iccirco & menses stimulant, fœtus corrumpit expelluntq;. Quod si quis aquæ mistura vim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducent, præsertim veteri. Radices eadem præstant, crassiore magisque terrestri natura præditæ: ex aceto inflammationibus in scirrhum coalescentibus imponuntur.

LICHEN qui saxi est familiaris, aliquibus bryon appellatur. asperginosis petris adhæret, vt muscus. Aegineta, Vis ei est exteriore purgare, mediocriter siccare & refrigerare. impetigines sanat, inflammationes arceat. sanguinis eruptiones sistit.

LYCHNIS coronaria, flore est albæ violæ simili, quo corollæ factitatur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbana simili. Aegineta, Lycnidis coronariæ semē Cal. sic. 2. absolutē.

LYCIVM, quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorū

λευκόιον.  
violette  
ou giro-  
flee.

λεχνή  
off. herb.  
hepatica.

λυχνis.  
châdelle

de N. Da  
me. altera  
flore pur  
pureo,  
Marię ro  
sa ou Me-  
lon blac.

λύκιον

aut longioribus: foliis buxi, densis: fructu pī peris, nigro, leui, amaro, densoq;: cortice palido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisq; aliis locis. aspera loca amat. Succī extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis tusi, & ante per multos dies macerati coquuntur, tū abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absceynthii succo, aut felle bubulo. Innatās spuma inter coquendū exempta, oculorum medicamentis additur. reliquo ad alia vtūtur. Simili modo fit lyciū, semine expresso & insolato. Optimum quod vri potest, restinctūq; rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus cum fregeris rufis, odore minimè viroso, cū amaritudine adstringēs, crocino colore. cuiusmodi Indicū est, cæteris præstātius. Tradunt Indicū fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato. ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternū cubitorū longitudine, maiorēsve, rubo crassiores, à radice numerosos. fractus cortex rubescit, folia oleę similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus & regio morbo mederi, & foeminarū purgationes elicere. Assueuerant etiam crudam in potu eosdem effectus præstare: semen cyatho dimidio potum, pituitā expur-

gare: venenis quoq; auxilio esse. Aeg. Lyciū ex diuersis genere substantiis cōstat, calida, tenui & discutiente, terrestri verò frigida & leuiter astringēte, vt in secundo abscessu desiccet. Calefaciēdo refrigerandóq; medium est: hac de causa ceu abstersorio in oculis obscuratis eo vtuntur: tanquā astringenti, in cœliacis, torminibus intestinorum, & maleficis vlceribus: at contra inflammationes, vt discutienti. Cæterū primas obtinet Indicū.

**LYCOPSI**s, quæ à nōnullis anchusa vocatur, foliis lactucae longiorib. asperioribus, latioribúsq; crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore paruo purpureo: radice rubra, & adstringente. nascitur in campestribus. Aegineta, Lycopsis quàm onoclea anchusa, astringit quodammodo efficacius, similiter erysipelatis cum polenta illita cōuenit. Si læuis cum oleo inungatur, sudores elicit. Meminit Aegineta primū inter anchusas, & iterum suo loco.

**LYCOPVS** herba marrubio syluestri similis est, folio lupini pedis effigie, dissecto, grauis odoris, caule anguloso geniculatóq; fungosa intus medulla, radice frequenti capillamento fibrata. folia trita præsenteo remedio imponuntur dissoluto stomacho.

**LIGVSTICVM**, quod alii panaceā, alii panaces vocant, plurimum in Liguria nasci-

λῦκοψις.  
4. genus  
anchusæ  
Gal. her.  
lague de  
chien.

λῦκόπυξ  
Patte de  
loup. ou  
pectora-  
le, ou  
main de  
S. Marie.  
λῦγυστικόν

Non est tur, in monte Apennino, Alpibus contermi-  
hoc offi- no: vnde nomen traxit. Panaces incolæ non  
cinorum ab re appellant: quoniam & radice & caule,  
leuisticū. heracleotico panaci simile sit, & viribus eis-  
dem præditum. Gignitur in altissimis aspe-  
risque mōtibus, ac vmbrosis, maximè iuxta  
fluēta. cauliculum fert anethi geniculatum,  
tenuem, & in circuitu folia fertule campanę,  
molliora, odorata, propè verticem gracilio-  
ra, & longè magis diuisa: in cacumine musca-  
rium, in quo semen dependet nigrum, solidū  
& oblongum, fœniculo proximum, gustan-  
ti acre, & aroma olens: radix candida hera-  
cleotici panacis similis, odorata. Aeg. Eius &  
radix & semen adeò calefaciunt, vt menses ci-  
tent, flatūsque probè discutiant.

*Philvria.*  
Troesne  
ou druy-  
ne. offic.  
halcanne  
ou hēne.

LIGVSTRVM arbor est cypri magnitudine,  
foliis oleę, nigriorib⁹ & latioribus, fructu lē-  
tisci, nigro, subdulci, racematim cohærēte. a-  
speris nascitur. Aeg. Tiliæ arboris folia sylue-  
stri oleę similiter astringūt, quibus cōmādu-  
catis oris vlcera iuuātur: eorūq; decocto col-  
luūtur: quod etiā potū vrinā & mēses trahit.

*κρίνον.*  
Lys.

LILIA coronamentis se dedunt, Liria à  
quibusdam vocata tradunt & rubra esse lilia.  
Aegineta, Lilii flos temperamēto mixtus est  
ex tenui substantia, terrestri & nonnulla a-  
quosa temperata: quapropter oleum quoque  
ex eo cōfectum discutiēdi vires molliendiq;  
representat, vuluę inflammationibus accom-



modatum. Radix ac folia siccāt, abstergunt discutiuntq; mediocriter, quo fit vt ambustis conferant: succus ipsorum & neruorum vulneribus cum oxymelite prodest.

LIMONION, folia habet betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, feminibus rubris scatētem, quæ gustata adstringunt. Semē de pretritum, & ex vino acetabuli mensura potum dysentericis celiacisq; prodest. rubra foeminarū profluuia sistit. Nascitur in pratis & palustribus. Aegineta, Semen eius austerum cū vino, celiacis, dysentericis, & sanguinē spiritibus datur, item ad fluorem muliebrem acetabuli mensura.

LINI semen ex primo gradu calidū est, inter humectantia siccantiāq; medium. Manducatum flatus creat, etiamsi frictū fuerit.

LINGVA herba Plinio nascitur circa fontes. Radix eius combusta & trita cum adipē suis, alopecias emendat vnguentiū insole. (Eandem alibi lingulacam vocat.)

LYSIMACHIA, quā aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresve, fruticosos, tenues, prodeūtibz geniculatim foliis, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo. gignitur in aquis & palustribus. acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causa serpētes fugat, & muscas interficit. Aegineta, Vm habet excellēter a-

λεμῶνιον  
Limoine  
nou bette  
de pre.

λινόσπερ  
μον.

λυσιμάχ-  
χιον.  
Corneol  
le, foucy  
deauē,  
ou pelli-  
bosse.

strictoriā, qua & vulnera glutinat, & sanguinem cōpescit, tum ipsum, tum ipsius succus: intestinorum tormina & potum, & ab inferioribus partibus iniectum sanat.

Λιθόσπερμον.  
 offic. &  
 med. oī.  
 b<sup>o</sup> Molū  
 folia.

**LITHOSPERMON** à seminis duritiā nomē accepit, foliis est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt ramulis surculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iūci, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent foliis longis, inter quæ paruum semē, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Aeg. Alii diosporon, alij heraclion vocāt herbæ ætonichi dictæ semen est lapideum, album, quod cum vino albo potum calculos frangit, & vrinam pellit.

Λοῦλιν.  
 Iuraieou  
 gasse.  
 λογχίτης  
 Nigri ca  
 petti.

**LOLIVM**, quod inter segetes nascitur. Aeg. Calfacit, siccatur, tertio fermē ordinē, iridi facultatibus simile.

**LONCHITIS** folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, veluti in terram procumbentia, pauca in caule, in quo flores ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes velut linguā, quæ ad labrū inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomen tum arrogavit, radix dauci. Nascitur in sitiētibus & asperis. Radix ex vino pota vrinam

ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui asperā lonchitin dicunt. folia scolopendrii emittit, sed asperiora maioráque, ac multo magis diuisa. Folia viridia. Vulneribus mirum in modum profunt, in eísq; inflammationes excitari non patiuntur. arida pota ex aceto lienem absumunt, vel indurato medentur. Aeg.

**L O T V S** arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibis gratā, stomacho facilem. Aegineta. Extenuat, siccat, & mediocriter astringit: qua de causa ad fluxū muliebrem, alui fluores si cū vino aut aqua bibatur, aut etiā infundatur clystere, salutaris est. pilos defluos cōfirmat.

λωτός.  
Alyfieri  
& bacca,  
alyfc.

Est & in Aegypto **L O T V S**, quæ in campis flumine inundatis prouenit, caule fabæ: flore paruo, candido, lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi, occludique: ad ortum autem aperiri. adduntque, caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana ceu milii, quæ Aegyptii exiccant, & in panes cogunt. Radicē lotos hæc habet mali cotonei similitudine, quæ cruda coctáque manditur, decoctáque lutei oui qualitatem exhibet. (Aegineta nihil præterea.

λωτός αἰγυπτίκο

**L O T V M** urbanū alii trifoliū vocant. nascitur in hortis. extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, cæterasque

λωτός ἡ  
μικρός

caligines discutit. Aegineta, Abstergit, modicè sic calore temperata est.

λωτός α  
γείας.  
forte hęc  
off. anda  
cocha, &  
corona  
regia.  
Sylvestris L O T V S nascitur plurimum in Libya. Caulem fert bicubitalem, aut etiã maiorem, multis alarum cauis. folia lato trifolio in pratis nascenti similia: semen fœnogrecò, multo tamen minus, sapore medicato. Aegineta, Semen eius cal. secundo, habet nonnihil etiam absterforium.

θέρμοι.  
Lupin.  
Satiuus L V P I N V S non est. Gignũtur & sylvestres lupini, satiuus similes, sed omnino minores, qui cadẽ quẽ satiuus possunt Aegineta, Lupinus esculentus quidẽ obstruendi viribus pollet: amarus abstergit, dissipat, & sine morſu deficcet, lumbricos occidunt illiti, & poti. Viscera purgant cum ruta & pipere potui. Cutis vitia extergunt. tumores dissipant cum oxymelite illiti. Sylvestres autem lupini amariores sunt, & omni ex parte satiuo valentiores.

off. lupu  
lus. gall.  
houblon  
L V P V M salicarium Plinius inter oblectamenta verius quàm cibos numerat. Caulibus aculeatis longissimis quia in vepribus & salicis reptat, foliis vitis albæ, hispidis & nigrioribus, flore cinereo ac multis exilibus folliculis squamatum compactili. Hoc frugibus admisto Germani suam condiunt ceruissiam. Teneris eius turionibus in acetariis utimur. Refrigerat, & collectionum imperus lenit. Sedat stomachi inflammationes ex sero potus.

potus. Bilem regio morbo laborantibus detrahit. Pituitā in aqua intercutem exigit per aluum. in capitis dolore, qui medium capitis occupet, eius succus illinitur: item quoties immodicos æstus mitigare necessum sit.

**LUTEAE** herbæ Vitruuius meminit. Qui nō possunt, inquit, chrysocolla propter charitatem vti, herba quæ luteum appellatur, cœruleum inficiunt, & vtuntur viridissimo colore. (Luteam sunt qui lysimachium interpretentur.)

## M

**MACER** ex Barbaria aduchitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquam astringens. Aeg. Cortex est qui ex india importatur, sic. 3. inter calorem & frigiditatem medium obtinet. Est etiam astringens, tenuisq; vnde cœliacis & intestinorum torminibus auxiliaris habetur. Porro macer, siue macis Arabū, quære in Moschocario.

**MALABATHRUM** arbitrantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione. permulta enim nardū olent, quemadmodum phu, asarum, niris, secus autem res se habet. Namq; malabathrū folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innatās aquis, sine radice. Id collectū statim lino transsuietur, & ficcaturū reconditur. Tradunt ficcatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus vti: quod vbi

μακίς  
offi. Macis.

μαλάβαθρον.  
offi. foliū  
Indicum  
cinnamomi est, nō  
malobathri.

non euenerit, ne amplius quidem renasci.  
laudatur recens, ex candido nigricans, inte-  
grum, nec fragile, odore caput feriens, quod  
diu insuauis odore permaneat, & nardum sa-  
pore imitetur, nullo salis gustu. Infirmū verò  
& minutim contusum, præsertim si cariosum  
virus olet, vitiosum est. Aeg. Malabathri fo-  
lium æquales spicæ nardi vires repræsentat.

μαλακό-  
κιστος.  
off. sigil-  
lū D. ma-  
riæ.

MALACOCISSVM Democritus aquilex  
mollibus hederæ foliis depingit, caule tene-  
ro, sese cuiuncq; quod fuerit nactus inuoluē-  
te. Subesse aquam ubi reperitur affirmat.

MALICORIVM in punica malo  
dicetur.

μαλάχην.  
Maulue.

MALVA fatiua esui longè aptior sylue-  
stri. Aeg. Sylvestris mediocriter discutit, &  
emollit. Hortensis autem ceu humidior, etiā  
imbecillior est. Semen tanto viribus præstat,  
quanto & siccus est.

μολόχην.  
trāsmari-  
na rosa.

MALVAM maiore Græci molochen vo-  
cant, hāc Apuleius hastulā regiā dixisse mihi  
videtur: quāuis eadē sit asphodeli appellatio.

μύλα.  
Pomicr.

MALIS omnibus frigida & excremētia  
inest humiditas, quæ in eorū censu tenera &  
aquosa sunt, frigiditate cæteris & humidita-  
te præstant. Dulcia aquosa quidem, non ta-  
mē manifestè frigida sunt. Austera dulcibus  
quidem frigidiora, sed minus humida. Acida  
frigida quidem & ipsa, verū incidendi hu-  
mores ventriculo in hærentes vim testantur.

Acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido & terrestri donata tēperamento, ventrem supprimūt, vulnera glutinant. Pari modo folia succi, & cortices arborū inter se differunt. Aegineta.

MAMIRAS veluti radiculae herbae cuiusdam est eeu geniculis frequentibus nodosis, quae cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate praedita. Aegineta.

μαμίρας  
Videi eē  
doronici  
cū offi. &  
herbar.

MAMDRAGORAM, aliqui antimalū, alii circæam vocāt, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. niger, quae foemina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus foliis, ac minoribus quàm lactucae, graueolentibus, in terra sparsis, mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorū radicibus inheret bene magnis, binis, ternisve, inter se cōuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis. verū is mandragoras caule viduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nōnullis norion vocitatus. huius folia, magna, alba, lata, laeua, vt betae: mala quàm alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucundè cum grauitate quadam olentia: horū pomorū cibo aliquantum opiliones soporantur. radix, alterius similis, maior & cādidior, orbata caule. Succus fit è cortice recētis radicis tuso, & praelis subiecto: qui insolatus vbi

μανδραγα  
γας.  
Mandragore.

concreuit, fictili reconditur. Malis quoq; fucus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defæctum ius seruāt, cyathoque vno vtuntur, in peruigiliis, & doloribus, & ante sectiones vstionésque, ne sentiatur. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lachryma, cauo vase recipitur. liquamentum autē succo lacteo præstantius est: sed non ubiq;, vt experiētia docet, radices lacteum succum delachrimant. Alium tradunt esse mādragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatū, foliis albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicē ambientibus, quę mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradūt eam in pane, ossa, obsoniōve, drachmę pōdere deuoratā, vsum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo fere quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cū scindendi, vrēdiq; necessitas adest. Antidotū esse volūt radicē, cū manico salano potā. Aeg. Mandragoras frigefacit 3. Mala ipsius etiā caliditatē quampiam cū humiditate id referunt, vnde soporem grauē homini possunt accersire. At radicis cortex vehementissimus, nō refrigerat modò, sed etiā siccet interior eius pars imbecillior est.



**MARRUBIUM**, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. foliū pollicem equat, subrotundum, hispidū, rugosum, gustu amaro. semē in caulibus, & ex interuallis. flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Aeg. Cal. 2. amplius autē siccat, iecur lienemq; obstructionibus liberat, excreationes è thorace & pulmonibus, mensesq; promouet. Illitum extergit, discutitque, præcipua extersoria incisoriaque vi præditum.

**MARVM** herba cognita vulgò, furculosa, flore origani, foliis multo candidioribus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem. substringit enim, & modicè calfacit. qua de causa illitu serpētia vlcera sistit, & in calidas illitiones additur. iuxta Magnesium & Tralleis copiosissima gignitur.

**MASTICHE**, vide Lentisci resinam.

**MEDICA** cum recenter prodiit, foliis & caule trifolio pratensi similis est. procedens verò folia contrahit, caules edens trifolij, & siliquas corniculorū modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt. (Ægine-  
ta non habet.

κεράσιον.  
Porcum.  
Marrou.  
off. prassi  
on viride

μαρον.  
herb. for-  
te méthasyluestris

μυδική.  
grād tres-  
fle ou foi  
de Bour-  
gongne.

μηδίων.

**M E D I O N** in saxis & opacis nascitur. folia habet iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandē, purpureum, rotundum: semine cnici, minuto radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Aeg. Medii radix vires semini contrarias præ se fert. est enim austera, & fluxiones comprimit, ideoq; muliebrem fluxum sistit. Semē quum tenuis incidentisq; sit facultatis, menses quoque proritat.

**M E L A M P Y R O** in Myagro describitur.

**M E L A N T H I U M**, vide Gith.

μελίλω-  
τος.

offic. &

vulg. me-

lilot. alii

pratellū,

ou courō

ne royal.

le.

ῥόδον-

μος.

Menthe.

**S E R T V L A** Campana landatissima in Attica & Cyzico & Chalcedone nata. cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescēte, odore infirmo. Aeg. Diuersis facultatibus pollet: astringendi, discutendi, & concoquendi.

**M E L I S S O P H Y L L O N**, vide Apiastrū.

**M E N T H A**, cognita herba est. Syuestris mentha, Latini menthastrū vocāt, hirsutior est folio, & prorsus maiore quā fisymbrii, grauiori odore: quare minus ad sanorū vsus expetitur. Aegineta, Mentha Cal. 3. tenuis, acris, cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in venerem incitat. Amari quoq; nonnihil obtinet, quo lumbricos enecat. Qua verò acerba est, recentes sanguinis eruptiones coërcet.

**INNOZOSTIS**, aliqui parthenion, alii λιγώσις hermûbotanion appellant, foliis cōstat ocy- Mercuri-  
mi, minoribus helxinæ cognatis: ramulis du ale,  
plici geniculorum nodo cinctis, alarū cauis  
multis: fructu fœminæ copioso, quandam ra-  
cemorū speciem præbente: mari è foliorum  
sinu depédente, paruo, rotundo, ceu binis te-  
sticulis vnà cohæretibus. frutice dodrantali,  
aut maiore. vtraq; in oleribus manditur, ad  
aluū ciendam. Aeg. Aluum liberaliter subdu-  
cit illita discutit. Sciendúmq; est, eius semen  
infricatum corporis excrementas præter na-  
turam, quas vulgus vocat naphia, abolere,  
sicut experientia comprobatum est. Sed vi-  
ride semen esse oportet, & frequenter tuber-  
culis illis infricari.

**MESPILVS**, quæ à nōnullis Aronia vocatur, spinosa arbor est, folio acute spinæ: fert Neflier,  
pomum suaue, exiguum, tribus intus officu- meslier.  
lis. qua ex causa id nonnulli tricoccon appel-  
lauere. tardè maturescit, esu adstringit, sto-  
macho gratum est, aluumq; supprimit. Alte-  
rum mespili genus in Italia nascitur, quod a-  
liqui setanium, alii epimelida vocant. arbor  
foliis mali, sed minoribus: pomū fert rotun-  
dum, esui aptū, vmbilico latiore: quod astrin-  
git, seroque maturescit. Aeg. Mespila, alii tri-  
cocca vocant, fructus est affatim acerbus, &  
vix esculentus, aluumq; continens. Germina  
foliaque mespili impensè acerba sunt.

*μῆλον.* **M E O N**, quod Athamanticū vocant, in  
 offi. anet Macedonia & Hispania plurimū gignitur,  
 fauluae anetho folijs & caule simile, sed eo crassius bi  
 her. anet nūm fermē cubitorum altitudine attollitur,  
 tortu. sparsis in obliquum rectūq; radicibus, lon  
 gis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacien  
 tibus. Aeg. Mei radices Calefa. 3. sic. 2. ideóq;  
 vrinam & menses cient. Liberalius meon as  
 sumptum, capitis facit dolores.

*μῦαγρος.* **M Y A G R O N**, aliqui melampyron vocāt  
 Cameli- herba est surculacea, foliis rubiæ, pallidis, tre  
 ne ou ca- pidanea. semen oleosum, fœnogræco simile.  
 maminc. Quod contusum igni torrent, perunctisq;  
 virgis ad lucernarum lumina vtuntur. hoc  
 pingui, scabritias corporis leuigari, atque  
 expoliri, constat. Aegineta, Quod in semine  
 oleosum habetur, viribus est opplendi. Per  
 peram apud Aeginetam duobus in locis, pri  
 mum in Myagro, dein Myaro, eadem de re  
 tractatur.

**M Y L E S** radix paruo bulbo similis est,  
 constringit: itaque cum loli farina apposita  
 vterū apertū sanat. Galenus: (Eandē esse ap  
 pareret Dioscoridi dictā Moly. itaq; illius de  
 scriptionem hinc emendare poteris.

**M I L I A R I A** herba milio gentilis est: no  
 men habet, quod milium implicādo enecet.  
 Hæc trita, & cornu cum vino infusa, poda  
 gras iumentorum sanat.

**M I L I T A R I S**, vide Lactoris.

**MILIUM** in panes coactum, minus cæ- κίχρος?  
 teris frugibus alit. Aeg. Miliū frig. 1. sic. 2. Ha Milet  
 bet etiam modicam extenuandi facultatem:  
 extrinsecus igitur in sacculis ad fouendū ad-  
 hibitum, & illitum deficcare consuevit.

**MILEVM** Indicum in Italiam Neronis κίχρος.  
 principatu conuectum, nigrum colore, am- ινδικός.  
 plum grano, arundineo culmo: Adolescit ad Miliū sa-  
 pedes altitudine septem, prægrandibus cul- racenicū  
 mis, lobas vocant, omnium frugum fertilissi- .i. pegri-  
 mum. Ex vno grano terni sextarij gignūtur. num  
 Seri debet in humidis.

**MYRIOPHYLLVM**, siue millefolium, μυρίοφυλ  
 caulis est tener, singularis, vnica nixus radi- λον.  
 ce: plurimis foliis, læuibus, fœniculo simili- Mille  
 bus: vnde nomen accepit. caulis flauescit va- feuilles  
 rius, ac veluti ex industria delimatus. nasci-  
 tur in palustribus. Aegin. Adeo siccatur, vt vul-  
 nera glutinet.

**MYRICA**, seu tamarix, arbor vulgò co- μυρίκη.  
 gnita est, cū apud pigras & stagnantes aquas Bruyre.  
 enascatur, fructum quasi florem ferens com huius ra-  
 page muscosum. Aegyptus Syriâque alteram dix casia  
 gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. off. vocat  
 Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter & pro o-  
 astringentem gustu. Aegin. Tamarix incidit, dorata ca-  
 extergitque, ita vt manifestè nō siccet, sed a- sia virtus  
 strictionem quoq; nonnullam obtineat, qua  
 de causa decoctū ipsius potū lienes adiuuat,  
 dentiūque doloribus medetur. Fructus &

cortex ipsius, gallæ virtute proximus est. Cinnis arboris vehementius exiccat.

*μύρρα.*  
Myrrhe

MYRRHA lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ nõ dissimilis. è cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. alia circũ caudicem cõcrescit. Dicitur ex his aliqua pediasimos, præpinguis qua expressa, stacte emittitur. alia gabirea, pinguißima, læto & pingui solo nascens: ea copiosam sudat stactem. Omniũ prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. quinetiam legitur tenuis quædã, quæ à troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, vetũ odore grauiuscula, apertis nascens. Alia caucalis cognominatur, prætermodum exoleta, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur: pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gũmis imaginem vergens, & viribus eius proxima. improbatur aminnea cognomine. Ex iis pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è ficcioribus haudquaquã pingues, & inodorati. minus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gũmi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obfita, leuis, vndique concolor, quæ confracta venas vnguium modò candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata

calfaciens. superuacua & inutilis est ponderosa, coloris piceæ. Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo, & (vt postea ostendemus) ad eadem cōueniens. Bœotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est quæ myrrhæ odore repræsentat. Aegineta, Cal. sic. 2. Capitis vulnera si illinatur glutinat. item amarâ vim obtinet, qua ventris lumbricos & foetus occidat. ad hæc abstergit, eoq; ocularius medicinis temperatur. humores pectori infixos expurgat, ita vt fauces nō asperet. Bœotica myrrha vires habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

MYRRHIS, simillima est cicutæ, caule μυρρῖς  
foliisque. radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuavis. Aegineta, Calid. 2. ac non nihil etiam extenuat. radix illi odorata dulcisque est, mensibus mouendis, & humoribus è thorace ac pulmone repurgandis idonea. cicutaria

MYRTVS satiuâ nigra utilior est medicinali quàm cādida, & in hoc genere multò magis montana. semen tamen imbecillius parit. μυρτινὴ  
Murte

MYRTIDANVM dicitur myrti adnatum inæquabile, verrucosum, intumescensq; & cōcolor. quod perinde quasi manus myrti caudicem amplectitur. magis quàm myrtus adstringit. rusum addito austero vino reponitur, coactumque in pastillos siccatur in μυρτιδα  
νόν.

vmbra. multo efficacius & folio & semine, cerato, pessis, infessionibus, cataplasmatibus admistum, vbi adstringendum aliquid est. Aeg. Myrtus ex diuersis composita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, qua valenter siccatur. Myrtula verò, seu myrtidanum, maiore vi in astringendo & siccando scaturit. Folia etiam aridiora viridibus magis siccant. Fructus succusque, tum foris applicati, tum intus assumpti, persimiles vires præ se ferunt.

μυθριδά-  
τον.

M I T H R I D A T I O N folia habet, inquit Plinius, duo à radice acantho similia, caulibus inter utraq; sustinens florem roseum.

μύξα.  
Myxaria  
fructus  
offi. & sc-  
besten

M Y X A arbor Damascenæ pruno popularis, in Syria & Aegypto olim gignebatur, nunc est familiaris Italiæ. Fructus etiam myxa, vel myxaria dicuntur, olim Sebastii, in Augusti honorem, ut verisimile est. Aegin. Arboris fructus est minor quidem prunis, facultate verò consimilis.

μωλν.

M O L Y folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similem, sed minorem, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine incit aliquid quod alij speciem referat. radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum valet ad aperendas vulvas, si trita cum irino vnguento in pello subiiciatur. (Aeg. non habet, præter rutam sylvestrem.) Vide Mylen.

Aliud M O L Y in ruta sylvestri describitur.



**MOLYBDAENA** herba, id est, plumbago, Plinio in aruis nascitur, folio lapathi, radice crassa, hispida, qua commanducata, oculisque subinde religata, plumbum (quod est genus vitij) ex oculis tollitur.

μολύβδ-  
δαινα.  
offic. ma-  
ior perfu-  
caria

**MOLLIGO** hippophæstum est.

συνάμι-

**MORI** fructus maturus quidem aluū subducit, & medicamentis stomaticis aliis, quæ moderatam requirunt astringionem, vtiliter miscetur: immaturus ubi exaruerit, perquam astringens fit medicamentum: cortex autem radice arboris etiā amaritudinis cuiusdam particeps, purgare potest, coq; latos lumbricos occidit. foliorum autem surculorūque vis subducentium & comprimentium media quodammodo existit. Aeg.

vos.  
Meuricæ

**MOSCHOCARYON**, vel moschocarydion Græcis recētiorebus appellatū India mittit (nos ea imitatione nucem moschatam nominamus) Hic fructus dum recēs est, totus succo pingui & oleoso madet, sic ut in vnguentum exteri possit. vnde multis myrsica, seu myristica, id est, vnguentaria nux dici cœpit. Probatur recens, quæ nullam senserit cariem, ponderosa, præpinguis, colore in rubrum inclinato. Aluum astringit, distendentes stomachum spiritus discutit, oris suavitatem commendat, stomachum & iecur roborat. Létigines in facie, & impetigines emēdat, lienem incremento laborātem reprimat.

μοσχοκάρ-  
ρυον.  
Noix mu-  
scade

Apud Aëtium Caryon hoc aromaticum (sic enim vocat) calefacit siccatur. 2. Arabes macis nomine extimā intelligūt huius nucis membranā vel folliculum. Antefertur is qui colore ruffo vel flauo rutillet, odore suauis, cum leui acumine. improbat nigrificans. Sic. 3. partiumq; tenuitate præstat, ceteras habens suæ nucis dotes. Arbos autem ipsa vulgari Persico similis traditur, roseo flore, & nuce, quam declarauimus, eiusdem propè effectus cuius & caryophyllon.

*Βρυον*

Bryon, id est m v s c v s, à quibusdam spiachnon appellatur. in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimū est cedrinum: proximum populneum. in quo genere candidum & odoratiū præstat, nigrificans improbat. Aeg. Inuenitur etiam in piceis. Discutiendi simul & molliendi vim modera tam obtinet.

*Βρυον θαλάσσιον.*

Marinus m v s c v s nascitur in scopulis, testaceisque, haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. Aegin. Refrigerat simul & astringit, eoq; feruentes inflammationes illitum adiuuat.

*Βρυονισ*

N

N

API cocta radix inflat, modicum alit. semen eius totum venenorum vires hebetat. antidotis admiscetur. Conditur sale radix. Aeg. Napus

& rapa si bis coquatur, nihilominus quàm reliquę stirpes alunt: continuè autem assumpta, crassum succum procreant.

NARCAPHTHVM ex India deferitur, Nabach.  
corticofum, simile sycomori libro. quod iu- Lasabatē  
cūdi odoris gratia suffitur. Miscetur thymia-  
matis compositis. Aeg. Naocāthon, sunt qui  
nacaphthon dicunt, Indicum est odoramen-  
tum, quod ad astrictos fœminarum locos suf-  
fitu vaporatur.

NACISSVM sunt qui, vt lilium, lirium *ναρκισσος*  
appellarint. folia porro similia, tenuia, mul- Narces.  
to minora, & angustiora: caulis vacuus, &  
sine foliis, supra dodrantem attollitur. flos  
albus, intus croceus, in quibusdā purpureus:  
radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen  
velut in tunica, nigrū, longū. probatissimus  
nascitur in montibus, suauis odore. cæteri por-  
rum imitantur, atque herbaceum virus olēt.  
Aegineta, Radix eius adeò deficcat, vt ma-  
ximis vulneribus sit glutinandis: imò etiam  
tendinum præcisionibus confert. Cæterum  
abstergendi & attrahēdi vim quandā habet.

Duo NARDI genera: vnum Indicum, al-  
terum Syriacum appellatur, non quòd in Sy *ναρδος*  
ria proueniat, sed quòd mōtis in quo oritur,  
pars vna ad Syrios, pars altera ad Indos fle-  
ctitur. Ex hoc Syriaci genere præcipuum est  
recens & leue, largam gerens comam, fla-  
uum colore, per quàm odoratum ac cyperum

redolēs, breui spica, amaro sapore, linguam  
 ficcāte, quod diu in sua odoris gratia perma-  
 neat. Ex indicis autē nardum quoddā Gan-  
 gitis vocatur, à fluuio Gange, apud quē ena-  
 scitur, montem præterfluente, quod genus ob  
 multam loci, in quo prodit, viginē, viribus  
 infirmius est, atque procerius adolefcit, plu-  
 res ferēs spicas ab vnica radice comofas, vnā-  
 que conuolutas, ac grauiter olentes. Monta-  
 num autem odoratius, spica breui ac mutila,  
 odore cypero vicino, cæteras habens Syriaci  
 dotes. Est & genus quoddam, cui Samphari-  
 tico nomē locus indidit, frutice breui, in ma-  
 gnas se spargens spicas, candidiore interim  
 medio caule, hircorum virus supra modum  
 redolente: quod improbatur. Madefactum  
 vendi solet. quod vitiū ex eo deprehenditur,  
 quod candida sit spica, & squalida, nulloque  
 puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua  
 aut palmeo vino, inspissationis ponderisque  
 causa inspirato. Intueri autem oportet si lutū  
 radicibus infideat, & incerniculo puluerem  
 excutere, eluendis manibus vtilem. Aeg. Spi-  
 cæ nardi radix cal. 1. sic. 2. particeps est etiam  
 astringētis cuiusdam qualitatis, acris & suba-  
 maræ. Iocinori prodest & stomacho, extrin-  
 secus admota & ebibita. Vrinā mouet, & in-  
 teraneorum fluxiones desiccāt. Indica valen-  
 tior est quàm Syriaca, & nigrior.

νάρδος

κελτικῆς

Celticū N A R D V M nascitur in Liguria

Alpibus, salitica patrio nomine appellatum, prouenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat vsus est, & odoris suauitas: vnde pridie fasciculos aqua abluerè expedit, & exempta terra pauito solo atque humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem vtile, cum acroso alienoque propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. namque herba candidior est, sine cauliculo, minoribus foliis, radice neque amara, neque odorata, vti verum nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis foliis triti secernuntur, vino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maximè recens, iucundi odoris, radice numerosa cohærens, plenum, nec fragile. Aegineta, Nardus Gallica superiori vires habet æquales, sed imbecilliores, præterquam ad vrinam ciendam. calidior enim est quàm illa, minúsque astringit.

Montanum NARDVM, quod ab aliquibus thylacitis & niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, furculo & foliis eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis

νάρδος  
δρυφύλον

asperisq; Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulæ regiæ, sed longè gracilioribus, & lōgè minoribus. Neque caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Ad eadem, ad quæ Celticū, efficax. Aeg. Nominatur etiam pyritis, iam commemoratis est infirmior.

αἰγδοα.

N A C A P H T H V M. Vide Narcaphthum

μωv.

N A S T V R T I V M optimum constat es-

Nasitert

se Babylonicum. Aegineta, Semen eius fina-

ou crescō

pis modo vrit, vnde etiam illitum cutem ex-

de iardin

asperat. Crassos humores cum aliis potum incidit. Herba quidem arida semini viribus respondet humida moderatior est, ideoque crudam ipsam assument.

νῆριον, ῥο

δόδεν-

ῥον.

Rosages

N E R I O N aliqui rhododaphnen, alij rhododendron vocāt, frutex est vulgaris notitiæ, longioribus quàm amygdala foliis, asperioribusque: flore in rosam conformato: fructu nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturā ostendit, spinarum pappos repræsentātem radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa. nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Aegineta. Nerion extrinsecus illitū discutit: in corpus assumptum occidit.

N I G E L L A quære Gith.

νυμφαία

offic. Ne

nuphar

N Y M P H A E A nascitur in paludibus & stagnantibus aquis, foliis fabæ Aegyptiæ, minoribus, & longioribus, aliis in summa aqua

aliis demerfis, pluribus ex radice eadem pro- vulg. iaul  
deūtibus: flore lilio simili albo, & in medio net deau,  
crocos habente, cum defloruerit, vt rotūdum ou chou  
malum, aut papaueris caput, extuberat. ni- deaue  
gro semine, denso, & lato, lenti gustus caulis  
est læuis, niger, minimè crassus, ciborio co-  
gnatus. radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ  
autumno sequatur. Nymphææ nomen sibi  
vendicasse videtur, quoniam aquosa amet.  
plurima inuenitur in Elide, in Anygro am-  
ne, & in Bœotia Aliarro. Est & altera nym-  
phæa, cuius flos blephara dicitur, foliis ante  
dictæ, radice alba, scabra, flore luteo, niten-  
te, rosæ simili. Nascitur in Thessalia, amne  
Peneo. Aegin. Nymphæa vires habet, sine ro-  
sione ficas, quibus & ventrem reprimat, &  
genituram arefacit. Quæ radicem albam ha-  
bet, valentior est, eo quæ fluxum muliebrem  
cū vino nigro & austero pota persanat. Quæ  
verò nigram, deterforia quoque vi nonnulla  
pollet, eaque vitilignes, alphos dictas, cum  
aqua exerit: pilorum defluuia cū pice liqui-  
da illita replet.

N V C E S auellanæ, quas & leptocarya vo- Noysette  
cant, stomacho infestæ sunt. Aeg. Vocant & ou auc-  
ponticas. frigidiores sunt, & austæræ: in cæte laine  
ris, iuglandibus equales. κάριον βε

N V C E S iuglandes, quas nonnulli Persicas σιλικόν,  
vocant. Aegin. Nucis arboris coliculi aliquid ἢ πικρι-  
habent quod astringat, plurimum iuglan- κόν, ποικ

dium calyx pulvinatus. succus itaque eorum decoctus cū melle, stomaticū fit medicamentum. Interius inde putamen carinatū vstum extenuādi vim acquirit, & sine rofione ficit. Quod in eo clauditur edendo aptū, natura oleosum, facilè bilem auget. Confectum ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines quas sepedonas dicunt, discutiendi vim obtinet. Flaccescentes itidē vetustate nucis membranae, cutis vitia abstergunt.

καρίον  
ινδικόν.  
La grāde  
noix

N V X Indica à recentioribus Græcis recensetur. Fructus palmae cuiusdam Indicæ præmagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt, bonitate succi. Calescit secundo, humidat primo. Biliosis eo vfu interdicitur. Tineosis ventris animalia pellit. Oleum quod ea exprimitur, cum sentit vetustatem, flatus digerit. Lumborum & genuum dolores mulcet. Sanguini à spiraculis venarum sedis mananti sublinitur ex oleo, quod nuclei malorum Persicorum reddiderunt. Vesicæ quoque malis opitulatur, & aluum sistit oleum quod recens nux stilauit.

○

ὠκίμοις

des.

offic. &

herb. al.

ba cacia

○

CIMOIDES, Latini ocimastrum vocāt, folia fert ocimi, & ramos dodrantes, hirsutos: si-

liquas hyoscyamo similes, semine vt gith nigro, prægnantes. Aeg. Sunt qui philetarion



vocent. Inutilis quidem radix est: semē verò vulg. *populicula*  
*particulis* tenue, citra rofionem siccans. *tularia*

*O C I M V M* vulgò cognitum. Aegin. Cal. *ὄκιμονο*  
 2. habet & humiditatem quandam excremē- *Basilic*  
*titiam*, propter quam neque vtile est intus as-  
 sumptum: extrinsecus autem illitum discutit,  
 & concoquit.

*O C Y M V M* pabulī genus apud antiquos *ὄκυνμον*.  
 erat, segete viridi, dissecta, antequam gereret *Dragee*  
 filiquas: eo citabant aluum bubus. Varro di- *aux che-*  
 ctum putat à celeritate proueniendi. *uaulx*

*O D O N T I D E S* fœni genus fruticosum, *ὀδοντι-*  
 triangulis flagellis, geniculatis, nigro arti- *δές.*  
 culorum nodo, foliis polygono lōgioribus, *Rust. fœ*  
 hordei semine in alis, cauliculis dēsis, ab ea *naria*  
 dem radice geniculatis, flore purpureo pusil-  
 lo: nascitur in pratis. Dentium dolori mede-  
 tur cauliculorum eius decoctum in vino au-  
 stero: inde ductum nomen.

*O E N A N T H E* folia habet pastinacæ: flo *ὀινάριον.*  
 rem candidum: caulem crassum, palmi al-  
 titudine: semen atriplicis. radicem magnam,  
 in multa rotunda capitula extuberantem. na-  
 scitur in petris. Caulis eius, & folia, cum mul-  
 so vino pota, secundas eiciunt. Radix è  
 vino, vrinæ stillicidio conuenit (& regio  
 morbo, vt Paulus adiecit, Dioscoridem ci-  
 tans.)

*O E N A N T H E N* diuersam in Vite sylue  
 stri dedimus.

**ἐλαία.** **O L E A** E ramusculi quantum astringunt, tantum etiam refrigerāt. Fructus qui exactè ematuruit, moderatè calidus est. Immaturus maiorem tum astringendi, tum refrigerandi vim repræsentat. Aeg.

**ἐλαίας αἰθιοπικῆς δ' ἀμμωνίας.** **L A C H R Y M A** quā Aethiopica olea stillat, scammonia similis quadantenus est, fulva, stillis exilibus constans, mordax. quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinē refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates oleæ, oleastrique, similem lachrymā sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur. Appellatur autem Aethiopica & agrestis olea. Aegineta, Oleæ Aethiopicæ lachryma ammoniaco tenui similis, vires habet extersorias: quare ad cicatrices, albugines, hebetudinēque oculorum ea utuntur, & ad dentium dolores, si canis ipsorum iniiciatur, efficax est. Nonnulli verò syluaticam esse hanc oleam afferunt.

**ὀνάγρα.** **O N A G R A**, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cū ficcata est, vinum olente. nascitur in montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. illitu quoque tetra vlcera mulcet.

**ὀνόβρυχις.** **O N O B R Y C H I S**, folia habet lentis, lon-

giora paulo, caulem dodrantalem, florē purpureum, radicem parvam : nascitur in viginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat. cum vino pota, strangurias sanat. illita ex oleo, sudores mouet. Rarefacit, & discutit. Reliqua sunt eadē Dioscoridi.

ONOSMA, oblonga folia habet. ad similitudinem anchusę, longitudine quatuor digitorum, & vnius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore. radice nititur longa, tenui, infirma, rubescēte. gignitur in asperis. Aegineta, Onoma, vel onomis, vel phlomitis, vel ononis, acrem amarāq; vim obtinet, eāque ob causam folia eius cum vino pota, fœtus occidunt, expelluntq; (Hippocrates, Onosma simpliciter radicem appellasse mihi videtur.

OPIMUM optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facillē aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non vt cera coëat, & in sole diffundatur: dein admotum lucernis, non atra luceat flamma: extinctum denique, odoris vim cōseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucę succo adulterant. Verū glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit. lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi vitiatum,

ὄνοςμα.

Papaue-  
ris succus

splendescit, & infirmum est. Nec desunt qui eò dementiae deuenierint, vt adipem ei admiscerent. Ficuli nouo torretur ad oculorū medicamenta, dum mollius atque rufius appareat. Hoc autē modo is excipitur succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentēsq; in mortario digerunt in pastillos: id meconium vocatur, multū opio ignauius. Porro opij faciendi ratio hæc est, Cū ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutē incidere oportet, lachrymam exeūtem digito in concham abstergere: nec multo post redire, vt cōcreta inueniatur. etenim quæ tum, aut postero die etiā offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Cū tamen inciditur, retrocedendum est, ne vestibus succus deradatur. Aeg. Papauer, quod prolixiore & proceriore cōstat calyce, medicatius vniuersis est: quapropter stuporē inducit, quousq; interimat. Nam & ipsum, & eius lachryma, quam per excellentiā opion nūcupant, quarto refrigerantium abscessui ascribuntur.

O P O P A N A X, lege Panaces.

obier ou  
opier

O P V L V S corno similis arbor, arbuſto Gallico faciundo idonea, vlni proceritate adoleſcit, caudice recto, cnode, rarioribus ramis brachiato, frondibus ferē vitigneis, bacis racematim dependentibus, prima puber-

cate viridibus, à maturitate puniceis. Ieiunū solum horret. Vitem alit: verum quia frondē non habet idoneam, à plerisque repudiatur. Nullus eius in medicina traditur vsus.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocant, foliis circa caulem mollis oleæ similibus in terra stratis, longioribus angustioribus, leuibus caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, vt bulbi. nascitur in petrosis, & sabuletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea authore, vocatur: quoniam radix ad multa utilis sit. foliis est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarū sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis, radice testiculis simili. Aegineta: Maioris in cynosorchi radice humida vis & calida est, cōque venerem incitat. Minoris calida & sicca, vnde venerē coërcet. Serapias, vel thriorchis, priore valentius desiccet, quare laxos tumores dissipat, vlcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inarescēta autem magis siccet. Quoniam verò substringere idonea est, aluum quoque cum vino pota retinet.

OREOSELIMUM, caule est dodrantē alto ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum rami & capitula cicutæ, multo tamē te-

ὄρχις.  
offi. testi-  
cul<sup>o</sup> canis  
& satyri-  
on min<sup>o</sup>.

σεραπίας

ὄρειοσέλι-  
νον. Νό-  
ε  
απὸ μὲ-  
λαν.

nuiora : semine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. nascitur in petrosis, & montibus. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis provenit. aliud enim est petroselinum. Aegineta, Viribus domestico æquale est, validius tamen.

ὀρίγανον.

Origane  
ou mario  
laine dā-  
gl terre.

ὄνιτις.

Maltich-  
ma herba  
vulg.

ὀρίγανον

ἄγριον.

ORIGANVM Heracleoticum, quod & cunilam vocant, folium habet hyssopo non dissimile, umbellamque nō in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam, semine in summis virgis haudquaquam denso.

Quæ onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei origani Heraclæi, sed multo inefficacior. Sylvestre origanum, aliqui panaces Heraclion, alii cunilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius : foliis est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi, radix tenuis, superua cua. Peculiariter percussis à serpente, folia & flores ex vino poti auxiliâtur. Aeg. Omnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi vires in tertio abscessu ostendunt.

ὄρυζα.

Riz ou  
hordeū  
gallaticū

ORYZA frugum generis est, in palustribus riguitq; nascens. Mediocriter alit. Aeg. Vim quandam astringentiam præ se fert, qua etiam ventrem mediocriter cohibet.

**ORNEOGLOSSON** arbor est vlmī specie, foliis amygdalæ, prælōgis filiquis in surculorum cacumine prodeuntibus oleagina magnitudine, in quibus medulla inest lingua auis similis, vnde nomē: exterius rubra, intus ex candore in luteum vergens: sapore acri, cum nonnulla amaritudine, Ea cal. 2. laterum dolores sedat, vrinam ciet, venerē stimulat, genituram auget.

**ORNITHOGALVM** cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, à quibus flores prodeunt, foris herbacei: & cū hiantes se pādunt, lactei visuntur: inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, vt melanthium. radix bulbosa, cruda & cocta manditur. (Aeg. non scripsit.)

**ORNVS** arbor satis procera, caudice tæti, læui cortice, spisso, ramulis vtrinque pinatis, folio fraxini, paulo profundiorib<sup>9</sup> crebris per ambitū ferrato, bacculis racematim coactis, ab adolescentia rubescentibus, secundum maturitatē ex purpura nigricātibus, sapore ex acido in amarū degenerante, mespilaceo quasi concretu, multo graciliore. Habitu reliquo & effigie tota fraxinum æmuletur. quare Lucio Columellæ orni sylvestres fraxini sunt, foliis quā cæteræ latioribus, nec deterio rem frondem, quā vlmī præ-

ὄρνιθό-  
γλωσσον.  
off. lāgue  
doyfel.

ὄρνιθό-  
γαλον.  
Charles.

Fresne  
chāpe-  
stre.

stant. Capræ autem & oues libentius etiam hanc frondé appetunt. Asperis & sitientibus locis gaudet, mōtes amat: In plana etiā descēdit, ita vt viti quoq; copuletur. folia ex vino bibuntur ad iocinoris & laterum dolores, aquæ subter cuté tumores reprimunt. Corpus obesum sensim ad maciem reducunt, si cum vino terantur ad virium portionē, ita vt puero quinq; folia tribus cyathis dentur, robustioribus septem quinque vini cyathis. Scobs eius & ramenta perniciofa traduntur, proinde vitanda.

ὄροβᾶρχη  
Tenie.

OROBANCHE cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, & in luteū vergente: radice digiti crassitudine, &, cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quēdam legumina nasci constat, & ea strāgulare. vnde orobanche sibi cognomētum vsurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. legumentis addita, coctionem accelerare creditur. Aegineta, Frig. sic. i.

ὄσυρις  
offi. linaria.

OSYRIS, frutex est niger, ramulos ferēs tenues, lentos, fractūque contumaces: & in his folia quaterna, quina, senāve, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescētia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos. Aeg. Osyris, è qua scopæ fiunt, amara est, & iecoris referandi vires habet.



**OSTEOCOLLON** Macedones vocant ὀστέον  
herbam saxi & mœnibus familiarem, medi λον.  
ci polygonion, aliqui talantion, vulgus sym Symphy  
phyton appellant. Perpetuò viret, viuítq; fo ton vulg.  
lius vidua: ramulos instar iuncipensiles, cir-  
rosos, tenuioris proceriorisque spartí simi-  
les spargit. Hac tradunt dissectas carnes coa-  
lescere, si coquatur vnà, itidē ossa fracta fer-  
ruminare.

**OTHONNA** aliqui maioris chelido- ὀθοννα  
niæ succū esse aiunt. quidam glauci. alii suc-  
cū floribus corniculati papaueris expressum.  
alii permistos cœruleæ anagallidis, hyoscia-  
mi, & papaueris succos, esse contendunt. alii  
Trogloditicæ cuiusdam herbæ succum, quæ  
othonna vocatur: nascíq; eam in eo Arabiæ  
tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna  
foliis erucae, perforatis cribri modo, & velu-  
ti à tineâ derosis, squalore obstitis, paucis, flo-  
re croci, latifolio. quare quidam anemones  
speciem esse putauerunt. Aliqui tamen affir-  
mant, lapidem esse Aegyptium, in Thebai-  
de nascentem, exigua magnitudine, æreo co-  
lore, gustu, cum feruore quodam & astricti-  
one mordaci. Aegineta, Othonna detergit,  
erodítq; omnia quę claritati oculorum offi-  
ciunt exterens.

**OXYACANTHA** Quærç Acuta  
spina.

**OXYAN** Græci fagi genus alterum vo- ὀξύαν

Non est  
ornus.

cant. Lydi Myson, nostri Scissimā: in tenuissimas enim secatur laminas. Glandifera non est, abietis aspectu, florens, erecta, enodis, illi crassitudine proceritateque ferè æqualis. materia colorata, robusta, nervosa, cortice leui, folio crasso, bifido, longiore quàm pyri, per extremum aculeato. Fructus glandea effigie læuis, calyculo includitur echinato quidem, sed placido ac blando, nec vt castanea hispido, cui nihilominus similis est & dulcedine & succo. Radices arbor nec multas nec altas agit, quæ summo cespite gaudeant. Minoribus nauibus cōmendatur: ad carinas, itē ad testudinē plaustrorum, vectabulorūque vilem fabricam specie visenda.

pain à co  
qu, offic.  
trifoliū a  
cerosum,  
ou alle-  
luya.

παιονία

Piuoine.

o x y s herba Plinio à sapore dicitur, tribus tantum foliis.

P

P

AEONIA, siue glycyfide, Græcis aliquibus Pétoboron dicitur. sunt qui Idæos dactylos radicem pæoniam' vocant. caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitātibus multis stolonibus. Huius duo genera. mas folia iuglandis habet: in fœmina verò, smyrnii more diuidūtur. summo caule siliquas emittit, veluti græcas nuces. in quibus, cum dehiscunt, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniūtur, & in medio nigra, quinque; aut sex, purpurea. radix maristenus, digitali crassitudine, &

palmi longitudine, gustu astringēs, alba: fœminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inherēt, vt in hastula regia. Aeg. Aliqui pētameron vocant. radicē habet acrē, & leuiter subamaram, & ficcantē cum nōnulla astringitione. menses cit, renes & iecur purgat instar amygdalæ pota cum vino: quod si austerum sit, alui quoque fluores coërcet. adalligata verò puero, morbum comitiale abigit.

**PALIVRVS** frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Aegineta, Paliuri folia & radix astringunt, eoque aluum fluentē sistunt: tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutiunt. Semen eius tam vehementi incisoria virtute valet, vt & calculos conterat, & excreationibus e pectore auxilietur.

**PALMA** in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis vigore, autumno decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomatus cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei. Quod si ad maturitatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet.

**PALMA**, quam aliqui elaten aut spathan ἑλάτῃ appellat, fructus palmarum adhuc florentium, inuolucrum est, calyxque, quo inspersamenta vnguentarii vtuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa: præ-

παλίτρον  
Aubepi-  
ne, fenel-  
les, grose-  
lier. aliis  
ioumarī,  
ou ioma-  
rin.

φοῖνιξ  
Palme.

**Palmula** clusa, intus pinguis. Aegine. *Palmae fructus*,  
 vulg. *Dates* ou *figues roy* qui iam ematuruit, calidus mediocriter est,  
*alle.* visceribus roborandis & stomacho idoneus,  
 tum intus assumptus, tum foris applicatus.  
 Reliqua *palmae* portio vehementer astringens est: quamobrem stomachicis & hepaticis medicinis temperatur: longè magis astringit, quod fructus enascentis veluti inuolucrum est.

*Ε. 5. 11. 139*  
*in Lignis.*

*πάναντις*  
*ἡράκλειον*  
*ον.*

**PANACES** nonnullis heracleum dicitur, ex quo opopanax colligi solet. plurimū in Boeotia & in Phocide Arcadiae nascitur: ibiq; compendii & questus, qui ex eo liquore facitatur, gratia studiosè colitur. foliis est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis: caule, vt ferulae, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, foliis etiā minutionibus obsitus, muscaris, ceu anethi, in cacumine flore luteo, & semine odorato, feruentēque radices habet multas ab origine vna, candidas, graucolentes, crassae corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libya, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice recenti cauliū pullulatu. ea candidum succū emittit, qui ficcatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentē autem succum excipiunt, foliis excavato solo statis, quae ficcata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt.

eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; , siccæ, quæ carie non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maximè in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, internè albus, aut subfulvus, foris ad croci colorem inclinans, lævis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera. Sed sinceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluiatur, & lactescat. Aeg. *Opopanax cal.* 3. sic. ὀπὸπᾶν καλ.  
 2. emollit, discutitque. Radicis cortex est imbecillior liquore. habet nonnihil & abstergens, & carni inducendæ idoneum. Semen  
 menses quoque citat. ναξ. Succus.

**PANACES** Asclepii caulem à solo emit πάνανες  
 rit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus quàm fœniculi foliis, hirsutioribus, odoratis: aureo flore, acri, odorato, ex muscariis dependente. radix parua est, & tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina, cōtra ulcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur, aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Alii panaces syluestre origanum vocant, alii cunilam, de qua in Origani mentione diximus. ἀσκληπιός. ὄν.

**PANACES** Chironium in Pelio monte πάνανες χείρωνιον

maximè prouenit. folium eius amaraco simile. flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix, serpentium veneno resistit: illita coma, eadem præstat. Aegineta, Asclepion panaces & chironion priori calidiora sunt (malim cum Galeno dicere, minus calida) hinc floribus ipsorum & semine ad malefica vlcera & phymata vtuntur.

παγκράτιον.

Aliis ci-

chorium.

PANCRATIUM, quod aliqui scyllam appellat, radice est magni bulbi, subrufo colore aut sub purpureo, gustu amaro ac feruente: foliis lili, sed longioribus. Aegineta. Specie ac viribus scyllæ simile est, verum imbecillius.

μήλιος.

Painz.

PANICUM frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile: eodemq; modo in panes subigitur. eosdem habet vsus: minus tamen & nutrit, & stringit. Aëtius: Extrà illud refrigerat & exiccat.

μήκρον.

Pauot of

fic. papa-

uer cor-

nutum.

E satiuu PAPAVERIS genere, quod hortense est, semen in panē densatur, qui sanis in vsu sit. eo etiā ex melle pro sesama vtuntur. thylacitum vocant. capitulum habet longū, & semē candidum. Syluestre verò, caput infidens demissumque, & nigrum semen, quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniam eius scapo lateos succus emanat. Tertium magis syluestre, & ad medicinas valētius, multo his long-

gius productiore capitulo. Aegineta, Hortē-  
 sis papaueris, thylacitin etiam uocant, semē  
 esculentum mediocriter somnum conciliat.  
 Quod veluti decidētī ac depresso calyce est,  
 nigrum semen habet & medicatum, nimis  
 quā frigidum. Quod prolixiore & proce-  
 riore cōstat calyce, medicatius vniuersis est,  
 quapropter stuporē inducit quousq; interi-  
 mat: nā & ipsum & eius lachryma, quam per  
 excellentiam opium nuncupant, frig. 4.

PAPAUER erraticum, quod rhœada vocant, vere quidem in aruis cum hordeo nasci off. papā-  
 tur, flore protinus deciduo, vnde & nomen uerrubrū  
 apud Græcos accepit. folia crucæ, aut origa rust. coco-  
 no, aut cichorio, aut thymo similia spectan-  
 tur, sed longiora, diuisa, scabra. iunceus ei quelicoc-  
 caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris ou pou-  
 ānemonēs, puniceus, interdum albus: ob-  
 longum caput, sed quā ancimones minus:  
 semen rufum: radix longa, subalbida, mi-  
 noris digiti crassitudine, gustu amara. Aegi-  
 neta: Rhœas appellatur quod flos ipsius cele-  
 titer defluat (vel semen, vt apud Aeginetam  
 legitur.) Validius hortensi est. Manducatur  
 itaque non per se, sed momentum copiosio-  
 ri melli mixtum.

PAPAUER ceratites, id est, cornicula-  
 tum. folia habet candida, hirsuta, verbasco  
 similia in ambitu syluestris papaueris more  
 serrata: caule non dissimili: flore pallido,

caliculo foenigræci, in corniculorū modum inflexo, vnde nomē mutuatur. semine papaueris, pusillo, nigróq; radice per summa cespitum nigra, crassa. nascitur in maritimis & asperis. Sunt qui glaucium hoc papaueris genere factitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Aegineta : Abstergendi vires fortitur, ideóque radice ipsius decoctū potu iocinorosis auxiliatur : folia autem & flores per quàm sordida vlcera expurgant, crustasque tollunt. Aliud papaueris genus aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab aliis heracleum, caule dodrantali: foliis admodum parvis, radiculæ similibus, fructu inter ca candido. Nam herbula alba est, & spumea tota : radice in summo cespite. Aegineta, Semen habet pituitæ purgandæ accommodatum.

ἀφρώδης

πάπυρος.

Non est charta, q̃ vulgo papier.

P A P Y R V S, qua chartæ fiunt, nullis nō cognita. Aegineta : Papyrus ignē non exper ta, materia quædam efficitur: vsta, siccata crematæ modo, verū papyri cinis viribus inferior est.

παρωνυχία.

P A R O N Y C H I A exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus foliis. Aegineta: Illita paronychis atque duritiis remedio est. Vis eius extenuare & siccare, idque citra rosionem.

παρθένιον.

P A R T H E N I V M, aliqui amaracon vocant, foliis est coriandri, tenuibus: flore per



ambitum albo, intus melino, odore graui, sa of. & her.  
pore amaro. Aegineta : Amaracus calefacit Matricai  
tertio, ficitur secundo. ic.

**PASTINACA** syluestris folia gingidii  
habet, latiora, subamara: caulem rectum, sca Panetz.  
brum: umbellam similem anethi, in qua flo-  
res insunt candidi, & in medio purpureum  
quiddam, fermè croceum. radix digiti crassi-  
tudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta man-  
ditur. Satiua ad eadem pollet, inefficacior ta-  
men, & cibo aptior. Aegineta: Vrinæ & mē-  
ses mouet, præsertim semen ipsius, & radix. Pastina-  
de ou ca-  
rottes.  
folia autem abstergēdi viribus prædita, pha-  
gedænicis affectibus cōgruunt, viridia cum  
melle. Syluestris ad omnia valentior est do-  
mestica.

**PEPLIS**, quam aliqui syluestre portu πῑπλῖς.  
lacam vocant, Hippocrates peplion, in mari Non est  
timis maximè nascitur, latè opaco frutice, cā sena.  
didi succi pleno: foliis satiua portulacæ, ro-  
tundis, infernè rubentibus: semine sub foliis  
rotundo, vti in peplo, feruente gustu: radice  
singulari, superuacua, tenui. Colligi, & repo-  
ni ac dari, vti peplos, & sale cōdiri solet. Eas-  
dem habet vires. Aegineta, Peplion cætera  
quidem inutile, semen autem ipsius feruidi  
saporis, peplo consimiliter expurgat. πῑπλός.

**PEPLOS** frutex est lactei succi plenus, rur. reuicil  
foliis paruis, vt rutæ, paulo latioribus: rotun-  
da coma, ferè dodrantali, humi resperfa: se- le matin  
de vignes

mine sub foliis rotundo, minore quàm candidi papaueris, pluribus scatet auxilijs. vnicam radicem habet, superuacuã, ex qua fruticat. nascitur inter vites, & in hortis. colligitur mēsisibus, siccatur in vmbra, & continuè versatur. fructus tusus & feruefactus reconditur. Aegineta: Nonnulli papauer spumeum vocant, liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

πέπων.  
Pepon.

PEPON abstergēdi facultate efficax est, inde veluti caro ipsius ephedias, & consimilia vitia faciei exterit, semē renes obstructione liberat. Aegineta.

PERICARPVM bulbi genus est, eius duæ species Plinio, cortice rubro alterum, alterum nigro, papaueri simile, sed vis maior quàm priori: vtrique autem ex calsfaciendi, ideo contra cicutam dantur.

περικλῦ-  
μενον.  
Capri-  
f. uille,  
ou vinci.  
bosce.

PERICLYMENON simplex fruticat, ex internallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcãdida, hordeacea. inter folia furculi exeunt, in quibus bacca, hederę similes: flos fabæ, candidus, aliquantũ rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficilè euellatur: radice rotunda, crassa. nascitur in aruis ac sepibus cõuolvens se ad miniculis, propter assidētibus. Aegineta, Eius folia & fructus incidendi simul, & calefaciendi vires obtinent, quapropter vrinam cruentam eliciunt ad sex dies pota.

(Quidam hic numerum dierum perperam quatuor aut quadraginta legunt.) Geniturā viri exiccant quadraginta (aut secundū Dioscoridem triginta septem) diebus in portione assumpta; item lienosos & ægrè spirantes adiuuat.

**PERISTEREON**, siue verbenaca περιστεριών. nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quòd columbæ circa hanc per quā libenter versari soleant, dodrātis altitudine, & interdum amplius adolefcit. folia è caule prodeunt incisa & subalbida. ea singulari ramo, radiceque sola, constare sæpius inuenitur. Aegineta, Adeò siccant astringitque vt vulneribus glutinandis, & sanguinis eruptioni sistendæ sit. Eius alterum genus in Sacra herba quære. Nō ē hæc oruala ou toute bōne.

**PERSIA** arbor est, in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vtilem. in quo phalāgia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in perfide exitiosam esse, translātāque in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam. Aegineta, Folia siccant, & astringunt, eoque sanguinis eruptionem compescunt. περσίαν

**MALI** Persicæ furculi & folia euidenter μηλίαν amara sunt, eoque concisa tritaque vmbilico περσικῆς Peschier,

imposita lumbricos enecant. fructus autem ipsius, nempe Persicum hoc esculétum, frig. hum. 2.

*ἄσπερον,*  
*ἄσπερον.*  
ov. Glete  
ron. offi.  
bardana  
ou lappa  
maior.

**P E R S O N A T A** folia habet cucurbitæ, maiora & hirsutiora, nigriora & crassiora: caulem albicantem: quanquam & interdum vidua caule reperiatur, radice intus candida, foris nigra. Aegine. Discutit, siccatur, & astringit, quapropter & folio ipsius vetusta ulcera persanant.

Videtur  
esse cor-  
nu cerui.

**P E S M I L V I N V S** à Columella in vsum colligi & reponi iubetur, sed qualis sit non explicuit.

*πέτασι-*  
*της.*  
Rur. ma-  
ior barda-  
na.

**P E T A S I T E S** pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande foliū, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra phagedænas, & ulcera quæ cacoëthe vocant, efficaciter illinitur. Aegineta, Sic. 3. unde ad malefica & phagedænica ulcera eā vsurpant.

Oillet  
dinde.

**P E T I L I V S** flos est autumnalis, circa vepres nascens, calyculo versicolori, foliis quinque, parvis. Tantum colore commendatur, qui est rosæ sylvestris. Mirūmq;, in eo flore inflecti cacumen, & non nisi retorto folia nasci. Semē luteum paruo calyci includitur. Vfus in medicina nullus. Huic Plinius Italiā ait nomen dedisse, tanquam nimirum Græcis ignoto.

*πέτροσε-*  
*λιν.*

**P E T R O S E L I N V M** in Macedonia pro-

uenit, in præruptis locis: semine ammiij, odo. Persil de  
 ratiore, sapore acri, aroma olente. Aegin. Se- Macedoi  
 men cal. sic. 3. Vi incisoria præditum, urinam ne  
 ciet, mensesque trahit, flatibus discutiendis  
 accommodatissimum.

PEUCEDANVM, caulē emittit tenuem, πευκέδα  
 gracilentum, foeniculo similem. comam ha- vor.  
 bet statim ab terra foliosam, spissamq; flore Peucedan  
 luteo, radice nigra, crassa, plena, graui odore ne oucue  
 succosa. gignitur in mōtibus opacis. Tenera de porce-  
 radix cultello conciditur, profluensq; è pla au.  
 ga succus umbræ mandatur. in sole siquidē  
 confestim euanescit. Colligitur, capite prius  
 & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor  
 premat, & vertigo sentiatur. assatione radix  
 inutilis fit. Tam lac quàm succus radice &  
 caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora.  
 verum inefficacior succo lachryma habetur,  
 & velocius expirat. Interdum etiam concreta  
 inuenitur lachryma thuris similitudine, cau-  
 libus radicibusq; adhærēs. Præfertur succus è  
 Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore  
 graui, feruens gustu radix eligi debet recēs,  
 quæ cariem nō senferit, firma, odoris plena.  
 Succus ad potiones amaris nucibus, aut ruta  
 aut pane calido, aut anetho resoluitur. Aeg.  
 Peucedani liquore & succo affatim calefaci-  
 enti, discutiendi, extenuantique vtimur, tum  
 naribus admoto, tum in potione assumpto,  
 ad pulmonum & pectoris vitia ex humorum

crassitudine contracta, item ad lienē induratum: dentibus autē perforatis impositus, dolorē protinus sopit. neruorum affectibus idoneus est. Radix squamas ossium separat, maleficis vlceribus succurrit. Cal. sic. 3.

Φαλάγγιον.

PHALANGIVM à quibusdam phalangites vocatur. ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, indiuerſa tendētes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habēs. semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. prouenit in collibus. Aegineta, Nomen hoc inuenit quod phalangiorum morſibus medeatur. Naturæ subtilis est excicantisque, qua torminosis auxiliari putatur.

Φάλαρις.

PHALARIS cauliculos emittit & ex culmis similes minutis ac nullius vsus radicibus, multos, duūm palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamen ac dulces: semen cādidum, oblongū, milij magnitudine. Succus eius folia & semen pota vesicæ doloribus auxiliatur. habet eadem herba tenuem quandā vim naturamque calidam.

Φάσιολος.

Φάσιλοι.

PHASIOLI mentio facta est in Isopyro.

PHASELI, aut phasioli qui & dolichi appellantur, macerati donec radices succreuerint, ex garo ante cibū sumpti, aluum subducunt, ac plus quàm foenumgræcum alimentū exhibent. Integri verò cum siliquis virides

comesti, plura pariunt excrementa. (Descriptionem habes in smilace hortensi.)

PHELLANDRION in palustribus nascitur folio apij. Bibitur semen eius propter calculos & vesicæ incommoda.

PHYLLITIS, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, sena aut septena, recta, quæ parte anteriore lævia cernuntur, à tergo autem pèsiles quasi vermiculos tenues ostendunt. in vmbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo. neque caulem, neque florem, neque semen profert. Aeg. Cum acerba sit, non immeritò alui profluuiis pota auxiliatur.

PHYLLVM, quod elæophyllon vocatur, in saxosis nascitur. duûm generû est. quod autem thelygonû appellât, vuas habet floribus oleæ similes, pallidiores tamen. foliis itidem oliuæ est: caule tenui, breui. radice exili. floré album profert: semē papaueris maiusculum, Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat, habet enim racemosum quiddā de florentibus oleis non dissimile. Ferunt potum alterius semen maris, alterius verò scemina conceptû facere. Tradidit hæc quondam herbarius Crateias, placuitq; mihi vsque ad historiam, nec vltra de his docere. (Aeg. non meminit.)

PHYTEVMA folia habet radiculæ, minoræ: copiosum semen, perforatum: radi-

φειλλάνδριον

δριον.

potatur

esse offic.

filipédu.

la aut

herb. siles.

aquaticû

φυλλίτις

Non est

lingua

cerni off.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

φύλλον.

cem paruiam, tenuem, per summa terræ nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt. Aeg. non memorauit.

Φλίον.  
Dubitat  
an sit sca-  
bioſa  
vulg. &  
pſora Aë-  
tij.

PHLEON Theophrasto, nonnulli stœbā appellāt. (sed nos infra stœben longè diuerſam afferemus.) Non solum caulē habet aculeatum, sed & folium quoq; hispidum, iuxta cuius spinas aculeos etiam condit, radice nō in profundum acta. Germinat cum Vergilius, primōque aratro vna nec folia dimittit, etenim annicula illi vita, sæpēque bimatum excedit.

Φλοῦμ.

PHLV M à superiori longè dissidet, cuius lanugine, vt inquit Theophrastus, ad lixiuū mulieres vtantur, molle & placētaceum est, colore subrubido. Fœmina sterilis est, ad nexus idonea. Mas prorsus habetur inutilis. in insulis fluitantibus prouenit. Pars ab radice pueris cibo grata est. Radix ipsa pecudū pabulo vellitur. (Phlum Iulius pollux nominat, vnde Phloinas vestes in Herodoto quis legat, & Pausania.)

Φοῖνιξ.  
Aueine  
ferule  
multis

PHOENIX folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam lolio similem: calamos digitorum senū, radici aduolutos: septenas octonasve spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur. Aegin. Aliter rhu vocatur: astringēdo, in vino austera pota, omnes fluidos affectus sistit.

Φόρμιον.

PHORMION tenuis, abstersoria, & at-



traſtriciſ eſt facultatiſ: ſemen igitur cū melle albugineſ extenuat, & ſpicula è corporibuſ extrahit. Galen. & Aeg. (Hoc ab hormino, cui eadem aſcribuntur, non diſſidere iudico: nam Galenſ phormij tantum meminit, nō etiam hormini.)

φοῦ.

PH V, quod & aliqui ſylueſtre nardū ap- pellant, naſcitur in ponto, folio olufatri, aut elaphoboſci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto: floribuſ narciſſo proximis, maioribuſ, teneriſ, & ex albicante purpureiſ: radice ſuperiſ ad digiti minoris craſſitudinē, ex obliquo villoſa in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamentiſ inuicem contextiſ, flauoſcentibuſ, odoratiſ, cum quadam odoris grauitate nardum emulantibuſ. Adulteratur: radice ruſci admixta: ſed maleficiſ deprehenditur: quoniam hæc dura eſt, & frāgenti contumax, ſine vlla odoris gratia. Aeg. Radicem habet nardi perſimilem, quæ tamē ad pleraque infirmior ſit: ſed vrinaſ magiſ quæ ea elicit, nardi Gallicæ modo.

Valeria-

na maior

ou verte-

trecum

πίτυς

πίτυνη

Pin

PIN V S Picea generi eidem aſcribuntur, ſed quandam flagitant ſpecierum diſtinctionem, arbores vulgò cognitæ. Piceæ cortex aſtringendi vim eximiam poſſidet, qua intertrigeneſ & ambuſta illitum perſanat, vētrem potuſ reprimiſ: folia etiam vulnera conglutinant. (Eadem ferè de pinu tedāq; ſcribuntur.)

Aeg. Peuce, id est, teda vires habet piceæ, sed imbecilliores.

πITYID'ES

PITYIDES fructus sunt picearū, mistæ facultatis, alstrictoriæ & acris, quamobrè reiectionibus è pectore opitulantur. Aeg.

πΥCΝΟCΟΜΟΝ  
ΜΟΥ.

PYCNOCOMON constat crucæ foliis, acrioribus, scabris & crassis: caule quadrangulo: flore ocimi: semine marrubii: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente. inuenitur in saxosis locis. Aegineta, Discutit & acre est. folia igitur panos & furunculos dissipant. Semen infixa corporibus extrahit. Radix flauam bilem purgat.

ΠΙΠΕΡΙC  
ΠΟΥΡΕ

PIPER in India nasci, breui arbore traditur. quæ inter initia, prælongū fructum, veluti siliquā promit. quod longum piper est, habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectū piper euadit. id autem suis temporibus dehiscēs, pandensq; sese racemos emittit, grana ferentes qualia videmus. Ea acerba candidum piper faciunt, aptum ocularibus remediis, antidotis, & medicaminibus, quæ cōtra venenata parantur: theriaca vocāt. Longum verò vehementius mordet. Et quoniam priusquàm ematurescat decerptum est, subamarum relinquitur, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrum verò, utpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratum esse constat, candido sua-

uius, acrius, & ori gratius, nec non ad condimenta vtilius. Sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antè dictis infirmius est. Eli gi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis recens minimè furfurosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, casta, inania, minimèque ponderis, quod vocant brasma. Non est huius arboris radix gingiber, vt aliqui existimauere, sicut paulò pòst ostendemus. Námque piperis radix cocto similis est. ora gustatium accendit, saliuam ciet. hæc lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota. caput etiã purgat, manducata cum semine pedicularis herbæ, quam staphidem agriam vocant. Aegin. Piperis radix, costi vires refert. fructus nuper quidem germinantis arboris, oblongum est piper, humidum natura, & calidum. fructus veluti acerbus immaturusque album est piper, nigro acrius, vt quod multo magis asatum sit: vtrúnque verò & calefacit & desiccatur.

Πύρεθρον  
Piretre  
ou pie  
d'alexan  
dre

PYRETHRVM saliuarem vocant, folia caulémque emitit vt daucum syluestre & foeniculum: vmbellámque anetæi, circinata rotunditatis. radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Aeg. Radix eius vrentè obtinuit facultatem. dentiũ ex frigidityte dolores mitigat. ad febrium rigores ante accessionem infricatur cū oleo, Corporibus

à perfrictione stupentibus resolutisq; efficacissimè adhibetur.

ὄνυ, ἄπος  
Poire

P Y R V M terrestre aliud sortitū est, aliud aquosum, ob quod stomachum iuuat, sitimque arcet: illitum verò sic. frig. mediocriter.

ἀγκία

Aegineta.

off. fisti.

ca & fisti  
corū gra-  
na

P I S T A C I A, quæ cōstat in Syria gigni, pineis nucib<sup>9</sup> similia sunt. Aeg. Stomacho mediocriter conducunt, iecur obstructum reserant, præcipuè summi & odorati eorum operimenti ex vino decoctum. Profunt etiā contra serpentium morsus.

πιστολοχία

P I S T O L O C H I A Plinio aristolochiæ genus est quartum, tenuior quàm clematidis, densis radicis capillamentis (vnde & polyrrhizos nominatur) iunci plenioris crassitudine. Odor vt reliquis medicatus. Illita serpentium moribus medetur. Quin & omnino suspensa supra focū fugat domibus serpentes.

πίσαν.  
Pois

P I S V M pariter Græci & Latini vocant legumen, caulibus fistulosis in terram sparsis, ramosisque, prætenui surculo, folio frequētī, præter cæterorū morem longiusculo, siliqua cylindracea, granis rotundis, candidis, flore papilionis forma, circa umbilicū purpureo, radice imbecilla. Grana in valuulis se inuicē quasi tangunt, vt in eruo. Galenus, Pisa fabis non dissimilem retulere naturā, nec diuerso ab illis modo manduntur. sed nō adeò uti fabæ inflāt, nec abstergūt: ideoq; segnius alio  
quàm

quàm illę excernuntur. Decoctorum cremor alium ciet. Recentia, quę cum suis valuulis mandantur, ructus mouent.

PITYVSAM specie à cyparissia differre πῖτυς constat, & si tithymallorū generi assignetur. σα.  
 caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geni off. herb.  
 culatus: foliis piceæ, acutis, exilibus: flore par & med.  
 uo, velut purpureo: semine instar lenticulę, esula. grę  
 lato: radice crassa, candida, succo referta. qui ci turbet  
 busdam in locis frutex hic prægrandis inue- & turbe-  
 nitur. Aeg. Liquorem vt tithymallus habet, ton.  
 eique similiter purgat.

Duo PLANTAGINIS genera. minor ἀρνόγλωσ  
 folia habet angustiora, minora, molliora, læ σεν.  
 uiora, & tenuiora: caule anguloso, in terra off. lance  
 sessili: floribus pallidis: semine summis cauli. lotte  
 bus emicante. Altera maior, lætior, viren plantain  
 tiorque, latis constās foliis, oleracei generis.  
 cuius caulis cubiti altitudinem petit, angu-  
 losus, subruber, à medio ad verticem tenui se-  
 mine circumdatus. radicibus nititur teneris,  
 hirsutis, candidis, digitum crassitudine æ-  
 quantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, &  
 locis humidis. multo vtilior magna est. Aegi-  
 neta, Plantago frigefacit, siccatur. Tempera-  
 ta est ex aquea & terrestri substantia, cui e-  
 tiam distractionis nonnihil adest: quo nomi-  
 ne ad maligna vlcera, fluxiones, putredines-  
 que accommodata est, temperamenti mode-  
 ratione sanguinis quoq; profluvia cohibet,

& plurimum congruit. compos enim est siccitatis minimè rodentis, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

πλάτανος.

P L A T A N V S vi humidiorē & frigidiorē pollet, eaq; de causa folia viridia ad inflāmationes nascentes proficiunt. Cortex & pilulæ quoniam maiorem siccandi potentiā habent in aceto decoctæ dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanāt. Cortex autem crematus siccatur vehemētius, & abstergit, cōque lepras pellit, & humidis vlceribus medetur. Aeg.

πολεμώνιος.  
bosci salvia. falso  
ambrosia offic. &  
herb. creditur

P O L E M O N I A M alij philetæriam. Capadoces chiliodynamin appellāt, ramis exilibus, vtrinq; pinnatis: foliis paulo quàm rutæ maioribus ac longioribus calaminthæ aut sanguinariæ proximis, quibus summis velut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante, radiculæ simili. nascitur in montosis & asperis. Aeg. Polemonij vis subtilis & exiccans: inde nonnulli contra coxendicis dolores, intestinorū tormina lienē induratum, radicem eius cum vino propinant.

πολύκνημον.

P O L Y C N E M O N, frutex est surculosus, foliis origani: caule, vt pulegii, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Aeg. Cal. sic. 2. eoq; vulnera glutinat.

πολύγала.

P O L Y G A L A palmi altitudinem petit: foliis lenticulæ, gustu adstricto. Aegine. Poly-

galon calidi humidique temperamenti compos est, foliis mediocriter acerbis. potū lactis abundantiam facit.

**POLYGONATVM** nascitur in montibus, frutice cubito altiore: foliis lauri. latiori bus, & leuiorib<sup>9</sup>, sapore mali cotonei, aut punici, cū quadā adstrictione. flores per singulos foliorū exortus promit cādidos, foliis numerosiores, incepta à radice supputatione, radicem habet albā, mollem, longā crebro geniculatā, densam, graucolentē, digitum crassitudine equantē, quę vulneribus efficaciter illinitur. quinetiā maculas in facie delet. Aeg. Variæ particeps est facultatis, astringentiæ, acris, amaræ, & cuiusdam gustu ingrata: quæ verbis nequeat exprimi, quapropter in multiplices vsus haud est accommodatū. Radicē ipsius nonnulli ad faciei labes, ptilos Græci dicunt, abstergendas illinunt.

**POLYGONVM** syluestre Plin. describit pene arboris frutice, radice lignosa, stirpe cædri rubicundo, ramis sparti binum palmorū, nigris, geniculorū, ternis quaternisq; articulis, sapor mali cotonei (Diuersum hoc genus est à duobus reliquis polygonis sanguinarię, sub voce numerandis.

**POLYTRICHON**, adiantum est.

Duo genera **POLII**. montanum, cui teu- thrio nomē est, & cuius est vsus. tenuis frutex est, cādidos, dodrātalıs, semine refertus: capi-

tulo in cacumine quandam corymborū specie-  
ciem præ se ferente, paruo, canis hominis si-  
mili, grauius olente, nō sine quadam suauita-  
te. Alterum fruticosius, non vsq; adeo valens  
odore, & viribus infirmius. Aeg. Polium mi-  
nus, quo & in antidotis vtumur, cal. sic. 3. itaq;  
omnia viscera referat, urinā mensesq; trahit.  
Viride adhuc, magna glutinat vulnera. ari-  
dum maleficis inspersum vlceribus proficit.

P O P V L V S alba aquosa, tepida, terrestri-  
que substantia, viribus absterforiis. Aeg.

Λύκη αἰ-  
γίρος.  
Tramble  
Poplier

P O P V L V S nigra cal. i. sic. modicē, & te-  
nuis est substantiæ. folia cū aceto illita poda-  
gricos dolores sopiūt. Eius resina floribus ca-  
lidior miscetur acopis & malagmatis. fructus  
cum aceto potus comitialibus auxiliatur.

Πόρεον.  
Porreau

P O R R V M mali succi est & acris. Grauiā  
facit insomnia, teste Diosc. aluum mollit, uri-  
nam ciet, extenuat, vim aliquam abstergendī  
habet, qua pectoris excreationes elicit. Semē  
eius priuā incoctū nephriticis temperatur  
medicamentis. folia etiā nonnihil astringūt,  
ideoq; succus ipsorum sanguinem supprimit.

Ποταμό-  
γυλον.

P O T A M O G E T O N, folium betæ simi-  
le, hirsutum, paululum supereminens extra  
aquam. Refrigerat & inspissat. pruriginibus  
vtile, & contra veterum vlcerum nomas. No-  
men ex eo inditum est, quod palustribus &  
aquosis enascatur, Aeg. Refrigerat & abstrin-  
git sanguinali herbæ cōsimiliter, iisdem vir-



cutibus præditum.

POTERIVM, lones neurada vocant, ποτήριον  
largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus tragacanthæ proximis: foliis parvis, rotundis: flore exiguo candidi coloris: semine nullius vsus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus, radices demittit binū ternūve cubitorum, nervosas, & firmas, quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. rursæ, præcisus nervis & vulneribus glutinantis illinuntur. decoctum quoque eius nervorum affectibus prodest. Aegineta, Vocant alij phrynion. Radices concisæ, nervos præfectos & vulnera glutinant. Decoctum ipsius epotum, nervorum affectionibus auxiliatur.

POTHOS Theophrasto duorum est generum: alterum hyacinthi flore, alterum sine colore, candidum, quo sepulchra coronabant, à quo & nomen, quasi desideratis esset dicatum. floret æstate, sed diuturnius est candidum. πόθος

PRUNI fructus ventrem subducit, recēs magis, aridus minus. Decocto ipsius faucium & gutturis inflammationi sũtiliter collonuntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidit, extenuat: vesicæ calculos cũ vino potum nonnulli frangere affirmāt, ex aceto pueri- κοκκύνιστον

rum impetigines sanare. Syluestrium prunorum bacce euidenter astringunt, ventremque reprimunt. Nominatur hæc planta in Asia prunum. Domestica sunt quæ Damascena appellantur.

ψόρα.

PSORA Aëtio herba nuncupatur (forsan ab habitu scabro, aut quod scabiei medeatur) eius vstæ fumo arborum erucas mori scriptum reliquit.

ψύλλιον.

Herbe a  
pules

PSYLLION foliis coronopo nõ dissimilibus hirsutis, longioribus: sarmentosa fœni modo in totum herbula, ramis dodrantalibus. coma à medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili, unde & nomen in aruis & incultis nascitur. Aeg. Herba pulicaris semen, frig. 2. siccâdo humectandoque medium est.

πάρμι-  
κη.

offic. &  
herb. py  
rethrum  
syluestre

P T A R M I C A frutex est, furculos habens paruos, multos, & rotundos, abrotano nõ dissimiles. & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in cacumine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotundum, quod suo acri odore sternutamentum excitat: unde nomen accepit. flores sternutamenta efficacissimè mouet. Nascitur in montibus & petrosis. Aeg. Folia sternutamenta proritant. Totus autem frutex viridis sugillata, liquorésq; alios disiccit. Est enim herba cal. sic. viridis quidem 2. arida 3.

βλῆχρον.

P V L B G I V M herba vulgaris notitiæ.

Vocant aliqui blechona, quoniã dum floret poulicul gustatum à pecoribus, balatum concitat. Ac ou pou- gineta, Calefacit & extenuat vehemẽter, vn- liot  
de si illinatur ruborem excitat, & crassos vi- fcososque humores è thorace & pulmone e- molitur.

πίπλινος

PULMONARIA, quam aliqui pepanũ vocant, buglossi folio cõspicitur, sed promif- fo magis, atq; læuiori, colore insuper dilutio- re, albicãtibus maculis notato, instar pulmo- nis, inde nomen nascitur in humidis. Volunt aduersus morbos visceris sui nominis pecu- liari esse remedio, in cibo sumptã, vel potã. (Aliam eodem nomine, cum de consilagine mentio fieret, docuimus.)

MALVM punicum omne astringendi vi- res eximias habet, quibus refrigerat siccãtq; verum dulce aliis minus: austerum magis re- frigerat, sicciũsque est, & stomacho amicum. Acidum refrigerat quoque, & maiorẽ quan- dam incidendi virtutem reprẽsentat. Verum acini succo magis adstringunt siccãntque: ef- ficacius his adhuc malicorium, quod sidion Græci vocant. Huic virtute respondet mali- flos, qui cytinus appellatur. Aeg.

ῥοιᾶς μῆ-  
λον.

Granade

Q

πιντᾶ-

Q

VINQVE folium ramulos fert φυνλον  
furculaceos, tenues, dodrãtales, in quinq;  
quibus semen: folia mẽthæ, quina feuille

singulis pediculis, raro plura, in ambitu fer-  
rata: florem ex luteo pallescentem, auri æmu-  
lum. nascitur in riguis, & aquariis ductibus.  
subrubram habet radicem, oblongam, vera-  
tro nigro crassiorē. Aeg. Sic. 3. minimè acre,  
coq; in multos vsus accommodatur.

δρῦς

Chefne

Q V E R C V S & folia & fructus siccante  
& tepida vi pollent: quamobrem vulnera re-  
centia glutinant, inflammationibus incipi-  
entibus medentur. at quod sub glandis corio  
& circa fructus carnem membranę simile in-  
cluditur, valentius astringit: coq; ad fluxum  
muliebrem, aliósque fluidos morbos exhibe-  
tur. Aeg.

## R

ρῥοιθιον

Herbeau

fouillon

off. sapo-

naria.

## R

A D I C V L A seu struthiũ herbã  
vulgò nota, qua purgandis lanis  
vtuntur, qui eas eluunt. Gale. Ra-  
dicis vsus est præcipuus. Acris est, cal. sic. 4.  
Abstergit, irritat: hinc est quod sternutatio-  
nes cit similiter aliis, quorumcunq; cum acri-  
monia calidum temperamentum est.

ῥαφανος.

Rue re

forũ, ra-

phan.

R A D I X, quæ græcis raphanus dicitur:  
syluestris raphani, quam Romani armora-  
ciam vocant, folia satiuo similia, sed magis  
lapsanam imitantur. radix gracilis, tenera,  
subacris. Tam foliũ quàm radix in olera re-  
cipitur. sed hæc excalfacit, vrinam concitat,  
æstuosa est. Aegineta. Radicula cal. 3. sic. 2.  
Syluestris efficacior est in ambobus. Semen

utriusque planta ipsa vehementius, itaq; sugillata aliósq; liuores difficiliter.

**RADIX** Hippocrati nominatur quoddam genus sati, sine flore, sine semine, tribus duntaxat foliis, sed proceris, & in terra stratis, duorum digitorum magnitudine, similibus anchusæ, radice purgadi viribus, sed exiliter. (Eadem mihi Dioscoridis Onosma videtur.

**RANUNCULI** complura sunt genera. vis tamen omnibus vna, acris, & vehemēter exulcerans. Nam vnum coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis, pinguib; flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitū alto: radice alba, exigua, amarāq; multis capillamentis, hellebori modo fibrata, nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorū incisuris, plerunque in Sardinia proueniens, quā acerrimum, quod sylvestre apium appellāt. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo, Aegineta, Omnia ranunculi genera excellenter sunt calida, sicca, acria, vrentia, adeò vt vlcus cū dolore excitent: quibus si modicè utaris, cutis vitia tantum exterūt. Radix autem arida sternutamentis ciendis est medicamentum. (De altero ranūculi genere multa leges in Sardonix mentione.)

**RAPI** radix & semen flatulenta, & semi-

βίσα.

βατράχιον.

Apiū rusticū, & Apiū rissus herb.

σπογγυλίσ Rabe.

ni creando sunt, veneremq; excitant. Aeg.

γογγυλίσ  
ἀγρία.

Reponce  
of. rapha  
nus sylue  
stris.

Syluestre R A P V M in aruis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, læue, in cacumine folia fert leuia, digitali latitudine, aut maiora: & fructū in siliquis calyculatis. cūmq; eorum inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totòq; corpore utimur, præsertim quæ ex lupini, aut erui tritici, aut lolii farina fieri solent.

ἐν τίνῃ.

Liquida R E S I N A è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuechi solet. atq; olim à Colophone petebatur: hinc Colophonix sibi cognomētum vendicauit. A Gallia quoq; subalpina quam vernaculo nomine laricem appellant incolæ, ea in linctu, & per se magnopere prodest tusci veteri. Colore inter se distant. siquidem alia cādida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinā, quæ ad eadem pollet. Quæ verò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, trāslucens, non retorrida, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete resinæ ceteras antecedunt: odo-

ratę enim sunt, atq; thus odore imitatur. Prestantiores à Pityusa insula deferuntur, quę secundum Hispaniam sita est. Sed quę è picea, nucibus pineis & cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorū & illę sumi solent. Lentiscina terebinthinę respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplę capacitatis ad humorem qui infunditur. Itaque resinę congius in duobus aquę pluvię coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat. cæterum vbi refrixit, in fictile non pictum, quod aconitum vocant, id est, non illitum, recoditur. Fiet etiã eximii cãdoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò fæculenta sordes excernatur. Vritur quoq; sine aqua, primū lento igne: & vbi coire cœperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissione discoquantur, vsq; dum antedictas naturę suę notas exuerint, mox, vt dictum est, reponuntur. Aridas vnus diei spatio decoxisse satis est. Aeg. Resinę omnes calefaciunt & desiccant, verū terebinthina principatum obtinet, discutientis naturę, emollientis, tenuis, & abstersorię, eaque scabiem corrigit. & larix huiusmodi est. Quę verò è teda destillaucrit, atque hac magis adhuc pinea, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut attrahit.

medium inter ipsas locum tenet, & quæ de  
piicea & quæ de abiete raditur.

ῥάμνος.

Burgaspi  
na ou ne  
prum.

RHAMNVS fruticat in sepibus, ramos  
ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ mo-  
dum, foliis parvis, oblongis, suppinguibus,  
teneris. Alterum ei genus candidius. tertium  
nigrioribus latioribusque foliis constat, &  
quadatenus rubentibus. cuius rami quinûm  
cubitorum longitudinem implent, spinosio-  
res quidem, sed infirmioribus minúsque rigen-  
tibus aculeis. Fructum edit latum, cādīdum,  
tenuem, follicularii specie, verticillo simi-  
lem. Aegineta, Siccatur 2. frig. primo, Qua-  
re herpetibus & erysipelatis non admodum  
calidis medetur. sed teneris eius foliis vten-  
dum est.

ῥάπον-  
νον.

Reubar-  
be. offic.  
rhaponti-  
cum.

RHAPHANVM in Radice habes.

RHA, aliqui rheum, Latini rhaponticū  
vocant, prouenit in iis quæ supra Bosporū  
sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix  
nigra, centauro magno similis, sed minor  
& ruffior, fungosa, aliquantum læuis, sine  
odore. Optimum habetur quod terebines  
non sensit, si gustatu cum remissa adstrictio-  
ne lentescat, manducaturumque colorem red-  
dat pallidum, aut ad crocum inclinantem.  
Aegin. Compositum est ex terrestri frigida  
& tenui substantia, aër. aque calida & leni-  
ter acri: eamque ob causam conuulsis, ruptis,  
recta ceruice spirantibus opitulatur. Quod



discutiendi vim habet, liuores emēdat. quod  
astrictoriam, cruētas excreationes, cœliacos,  
& intestinorum tormina sanat: vtraque verò  
facultate iocinorosos iuuat.

Gignitur RHODIA radix in Macedo-  
nia, costo similis, leuior, inæquabilis, quæ cō-  
trita rosas redolet. Vtilissima capitis dolori-  
bus, si madefacta fronti & temporibus cum  
rosacei momento imponatur. Aegineta. Ca-  
lescit secundo, tenui & discutiente vi præ-  
dita.

RHVS, quæ obsoniis aspergitur, ab ali-  
quibus erythros appellata, semen est coria-  
rii fruticis: sic vocati, quoniam coriorum in-  
fectores eo vtantur ad inspissandas pelles. ar-  
buscula in petris nascens, binū cubitorum  
altitudine, foliis oblongis, subrubentibus, in  
ambitu serratis, acino vuarum gracilium dē-  
so, magnitudine terebinthi, quadam tenuis  
lato. Cuius corticosa tunica perquàm utilis  
est. Aegineta, Rhu coriariæ à medicis dictæ  
fructus præcipuè, & succus, magno in vsu  
sunt: astringit enim, & sic. 3. frig. 2. (Emen-  
dauimus ῥυπτικοῦ, vt iuxta Galenum ῥυκ-  
τικοῦ legatur.

RHVS herba syluestris Plinio, colico-  
lis breuibus, foliis myrti, tineas & venena  
pellit.

CICI, aut croton, nomen accepit à ricini  
animalis similitudine. arbor prouenit parua

ῥοδία ρι-  
φα.  
Rosaceū  
lignum.

ῥῥς.  
rur. viur-  
ne.

κρότων

Herb.ca- ficus altitudine : folio, platani, sed maiore,  
 taputia læuiore, & nigriore : ramis, caudicibus-  
 maior.of que cauis, in arundinis morem : semine in  
 fi.etvulg. uuis asperis, quod corticibus exutum, ricinū  
 palma animal repræsentat: ex quo oleum, nomine  
 Christi. cicinum, exprimitur, cibis fœdum, lucernis  
 emplastrisque vtile. Aegineta. Ricini fructus  
 quæadmodum purgat, abstergit, digerit: sic  
 etiam folium, sed imbecillius.

R O D O R A Gallis appellata herba, vt in-  
 quit Plinius, iuxta viduas populos prouenit,  
 caule instar ficulneæ virgæ articulado, foliis  
 vrticæ in medio exalbidis, quæ processu tem-  
 poris tota rubent, flore argenteo. Præcipua  
 contra tumores feruorésque & collectiones  
 per se, vel cum axungia veteri tusa.

ῥόδον.  
 Rose.

R O S A refrigerat & altringit, sed sicca  
 multò magis. Succus recentibus foliis expri-  
 mitur, defectis forfice vnguibus (sic appellan-  
 tur candidæ foliorum partes) reliquum in pi-  
 la premi & teri debet in vmbra donec coga-  
 tur: & ita ad oculorum circumlitiones recon-  
 di. Siccantur etiamnum folia rosarum, conti-  
 nuò versata ne muceant, néve situs in iis insi-  
 deat. Aegineta, Rosq; mixta constant substan-  
 tia, aquosa scilicet, calida, astringenti & ama-  
 ra: flos autem ipsarum magis adhuc astringit,  
 eoque desiccat.

ῥοσμάριον.  
 ris.

Duo R O S M A R I N I genera, vnum fœ-  
 cundum frugiferumque, cuius semē cachrys

vocatur. folia foeniculi habet, crassiora & la- Incēsariā  
tiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè ou Ros-  
olentia. caulem cubiti altitudine, aut maio- marin.  
rem, multis concavum alis. in cacumine um-  
bellam, in qua semen copiosum, candidum,  
sphondylo simile, rotundum, angulosum, resi-  
naceum, quod in mādendo linguam exurit.  
radix thus redolet, candida, prægrandis. Est  
& alterum omnino consimile, semen ferens  
latum, nigrum vti sphondylion, odoratum,  
minimè exurens, radice foris nigra, intus si  
frangatur alba. Verū id quod sterile dicitur,  
illorum planè similitudinem refert: sed neq;  
caulem, neq; florem, neq; semen promit. na-  
scitur in saxosis & asperis. Rosmarinum cū  
erica nasci, foliis lactucæ sylvestris amaræ a-  
superioribus, candidioribúsq; radice breui.  
Theophrastus author est. potúque id ipsum  
alterutra parte purgare.

ROSMARINVM, quo coronarii vtun- λιβανω-  
tur, ramos mittit tenues, & circa eos folia τίς σιφα  
minuta, dēsa, longa, exilia, subter incana, su- νωματι-  
pernè virentia, graui odore. Aegineta, Liba- κή  
notis vna sterilis est, duæ fructum ferentes.  
Vires illis extergendi, incidendi, discutien-  
di, & emolliendi. Succus earum oculis ex  
humorum crassitie hebetibus salutariter ex  
melle imponitur. Coronariæ verò libanoti-  
dis decoctum, regio morbo laborantibus re-  
ctè bibitur.

ῥυθροῖδα  
 nov. **E R Y T H R O D A N V M** radix rubra  
 off. rubia est, qua tinguntur lanæ. vna sponte proue-  
 tinctorū. nit, altera seritur, vt in Thebana Gallia, &  
 vulg. ga. Rauenna Italia, in Caria inter oleas, vt in  
 ranse. aruis, solo creditur. hanc non sine quæstu fe-  
 runt. nanque maximū ex ea sentiunt prouen-  
 tum. asperi caules & quadranguli, longi, a-  
 parinae non dissimiles, robustiores, & multo  
 prorsus maiores: foliis per intervalla certa  
 circum articulos stellatim decussatis. Semen  
 eius rotundum, inter initia viride, mox ru-  
 brum, postea cum ematurit nigrū: radix te-  
 nuis, longa, rubra. Aeg. Radix acerba ama-  
 ráque est. Lienem iecur, & renes ita purgat,  
 vt cruenta quoq; per vrinam & menses cuo-  
 cet. Cutis vitia rancida abstergit.

ῥυθος  
 rubunc, ca **R V B V S**, notitiæ vulgaris. Aegi. Rubi  
 therine, fruticosum abundè astringit & siccat, qua de  
 ou franc- causa & vulnera cōmittit, & defluxiones si-  
 bosier. stit. Radix autem præter astrictionē, non pa-  
 rū etiam subtilis est, vnde renum calculos cō-  
 fringere est idonea. Fructus si maturus est,  
 magis calefacit, simulque mediocriter astringit,  
 ac ideo cibo idoneus est: immaturus autē,  
 & acerbus est, & validè siccat, præsertim ari-  
 dus. Eadem etiam flos efficit. (Chamæbatū  
 rubi genus humile suprà diximus.)

ῥυθος  
 ἰδαῖος, idæus **R V B V S** appellatus est, quoniā pas-  
 sim in Ida proueniat. Est autē longè tenerior  
 priore, ac minoribus spinis horrés: quanquā  
 & sine

& sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat quæ supradictus. Aeg. non recensuit.

R V B V S canis frutex est arboris instar, rubo longè maior. folia fert multò latiora myrto, firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Aegineta, Rubi canini fructus non instrenuè astringit: folia id præstant mediocriter. At quod in fructu lanæ speciem præ se fert, ceu arteriæ inimicum caueri debet.

R V M E X, vide Lapathum.

Syluestris M Y R T V S, aliquibus oxymyr sine, aut myrtacantha, Latinis ruscum appellatur. folium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum. baccae per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modò lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis simili, acerbæ, & subamara. Folia & baccae in vino potæ urinam cient, menses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio urinæ medentur, dolores capitis sanant, & regiū morbum. In asperis & præcipitibus locis nascitur. Decoctum radice in vino potum, eodem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinā mouent. (Galenus & Aegineta nullam fecere mentionem.

κυνόσβη  
τος.  
englétiæ

ὄξυμυρσί  
ν.  
Hou ou  
housee.

πύκνον  
Ruc.

R V T A mōtana syluestrisq; satiuā & hor-  
tensi acrior est, & in cibis damnata. satiuā ve-  
rò quæ sub ficu arbore enascitur, magis in ci-  
bos admittitur.

πύκνον  
ἀγριον.  
offi. har-  
mela &  
syluestris  
ruta.

vocat etiamnum syluestem rutam, quod  
in Cappadocia & Galatia Asiæ finitima mo-  
ly dicitur. Frutex est qui ab vna radice mul-  
tos emittit cauliculos: foliis multò quàm al-  
terius rutæ longioribus, tenerioribúsq; odo-  
re graui: flore candido: capitulis in cacumi-  
ne paulo maioribus quàm satiuæ rutæ, quæ  
tribus maximè partibus constat: in quibus  
triangulum semen, subrufum, gustu amarū  
recluditur, cuius est vsus. semen autumnō ma-  
turefcit. quod cum melle, vino, croco & fœ-  
niculi succo, ac gallinaceo felle teritur cōtra  
retusam oculorum aciem. Sunt qui eam har-  
malam vocent, Syri besasan. qui Cappado-  
ciam incolunt moly, quoniā quandam cum  
moly seruet similitudinem: radice nigra, flo-  
re cādido. In collibus & lato solo prouenit.  
Aeg. Ruta syluestris calefacit, siccatur quarto.  
Satiua vsq; ad tertium. Vis eius est crassos len-  
tósque humores incidere, & dissipare, vrinā  
mouere, attenuare, & flatu discutere, vnde &  
venerem coërcet. Alio loco in moly, quæ  
etiam ruta syluestris est, substantia tenuem  
esse prodit, calefacit 3. & reliqua cum supe-  
rioribus eadem.

## S

ABINA duorum generum est. *βράθυ*  
 S Vna foliis cupresso similis, spinis *lauiniere*

horridior, grauiter olens, acris & ferues. arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. huius foliis nōnulli pro suffitu vtuntur. Altera ramarici folio similis est. Aeg. Cal. sic. 3. tenuissimâque est, extenuat, & digerit pota, tum in putredines cupresso similiter efficax est.

SACRA herba, quæ & peristereon nomi *λεροβολε*  
 natur, ramulos emittit cubitales, aut maius- *vn.*  
 culos, angulosos, in quibus ex interuallis folia quercus, sed minora angustiorâque, cisdē diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæscio. radix longa, tenuis. flores purpurei, graciles. Galen. & Aeg. tacitâ præterierunt. Dioscorides serpentibus aduersari scribit: morbo regio cum aliis quibusdâ succurrere. Veteres tumores & inflammationes illitam lenire, sordida purgare vlcera, tonsillarum crustas cum vino erumpere: oris depascentia vlcera compescere.

SAGAPENIVM ferulaceæ herbe succus *σαγάπη*  
 est, quæ in Media nascitur. Optimū est trāslu- *νον.*  
 cēs, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanū redolēs, gustu *offi. sera-*  
 acri. Aeg. Liquor est calidus & tenuis, cui etiā *pinum.*  
 absterforia quedā vis inest, qua & oculorum cicatricibus & suffusionibus prodest.

ἰτιά.  
Saulx.

**SALIX** vulgò nota est. Aegineta. Salicis & folia & flos facultate cōstant quæ citra ro-  
sionem siccet, tum quæ nonnihil etiam astrin-  
gat. Cortex autē paulo siccior est, cuius peru-  
sti cinis ex iis habetur quæ vehementer exic-  
cent, quippe clauos & myrmecias cum ace-  
to exerit.

ἑλελίσφα  
κος.  
Saulge.

**SALVIA** siue elelisphton, frutex est ra-  
mosus, longus, virgas, habens quadrāgulas,  
& canas: folia mali cotonei effigie, sed lon-  
giora, asperiora, crassiora, & quæ sensim at-  
tritarū quasi vestium scabritiem referant, hir-  
suta, subalbida, perquàm iucundo odore, sed  
gravi. semen summis in caulibus sylvestri or-  
mino simile gerit. In asperis nascitur. Aegin.  
Euidenter calfacit, & leuiter astringit.

ἄκτῆ.  
Sus, ou  
suin.

**SAMBUCI** duo genera. Vnum in arbo-  
rem assurgit, surculos spargēs arundinaceos,  
teretes, cauos, candicantes, proceros. folia iu-  
glandis, terna quaternave, ex interuallis cir-  
ca ramos exeunt; gravi odore, minutim in  
ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus  
cauliculisque circinnatæ umbellæ, quæ flo-  
rem candidum pariūt, mox acinum terebin-  
tho similem, in nigredine suppurpureum, ra-  
cemosum, succo madentem, vinosumque.

Alterū genus chamæactæ vocatur, Roma-  
nis ebulum, longè humilius est, magisq; her-  
baceo generi assignandum, caule quadrā-  
gulo, geniculato: foliis amygdalæ, ex inter-



uallo longioribus, geniculatim expāsis, pin-  
natísq; graueolētibus, in ambitu ferratis, mu-  
scario sambuci: flore & acino eiusdem. radi-  
ce nititur longa, crassitudine digitali. Aegi-  
neta: Sambucus pariter & ebulus desiccant,  
modicè digerunt & conglutinant. Potu autē  
esive per aluum aquam educunt.

SAMPSECVUM in Cypro & Cyziceno σαμψυ-  
laudatissimū, secundum sibi locum vendica-  
uit Aegyptum. Amaracū gens Sicula & Cy-  
zicena appellat. Herba est ramosa, per terrā  
repens, foliis eius calaminthæ quæ tenui fo-  
lio constat, leptophyllos appellatur, hirsutis  
& rotūdis. suauissimum odorem spirat: ideo  
coronis inseritur. Aeg. Cal. sic. 3. Est etiam te-  
nuis naturæ & discussoriæ.

SANGVINARIA, vel polygonū mas-  
ramos habet teneros & molles, frequentibus  
geniculis cinctos, qui per terram, vt gramē,  
repunt: folia rutę, sed molliora longioraque:  
semine sub omnibus foliis turgescente: vnde  
marem appellari volunt. flos ei cādidus, aut  
puniceus. Sanguinaria fœmina fruticat vno  
caule arundini teneræ simili, dēsis geniculis,  
& in se tubarū modo fartēis. articulos in or-  
bē cingunt. apices foliolis piceæ similes. radi-  
cis nullus vsus. nascitur in riguis. Aeg. Habet  
sanè vim quandā astringendi, sed humiditas  
in secūdo ordine frigida in ea præpollet. Sto-  
machi feruori frigida inspergitur vtiliter, sa-

χος.  
Mario-  
laine.

σαλνγ-  
νος.  
offi. corri-  
giola, &  
centino-  
dia.

cris ignibus inflātionibúsq; calidis illinī-  
tur, ac talis quū sit, fluxiones repellit, atq; hac  
ratione siccatoria esse putatur. Fœmina autē  
mas vehemētior est. (De tertio quodam eius  
genere in polygono sylvestri iam diximus)

σαντα-  
λον.

SANTALVM Græcis recentioribus li-  
gnum est, quod India mittit. Luteum præfer-  
tur, si pingui quodam scatet. Secundas partes  
obtinct rubrum, & frigidius aliquanto cate-  
ris existimatur. Tertio loco reponitur albū.  
Cal. 3. sic. 2. Excalfactis auxilio sunt, imbecil-  
litatē stomachi leuant, itémq; cardiacos effe-  
ctus, quos irrepens bilis excitauerit. Ex albo  
oui liquore fronti imposita defluxionum im-  
petus quæ ad oculos decumbunt, cohibent.  
Trita ex stillatitio rosarum liquore, & illita  
temporibus adiecto caphuræ momento, ar-  
dētes capitis cruciatus mitigāt. Incandescēti-  
bus articulorū inflātionibus, podagrísq;  
ex succo solani, aut sedi, vel portulacæ, lenti-  
culæve palustris illinūtur, repelluntq; humo-  
res, qui eò loci se conferunt, præcipuè rubrū.  
(Nunc nullæ non ferè medicorū potiones vt  
gratiam odore suo à sumentibus ineant, iis  
imbuuntur santalis.)

σαρκο-  
κόλλα

SARCOCOLLA lachryma est arboris  
in Perside nascentis, pollini thuris similis, ru-  
fa, gustu amara. Vulnera glutinat, oculorum  
fluxiones inhibet. emplastris inseritur. A-  
dulteratur admisto gummi. Aegineta, Op-

plet, citra rofionem fccat, ideóque vulnera glutinat.

**SARDONIA** vel sardoa herba pro altero ranūculi genere intelligitur, copiofiffimū in Sardinia, guftus acerrimi, priuatim apium ruficum cognomināt. Sunt qui apiaftro, id eft, fylueftri apio fimilem faciant. Meminit Diofcorides libro fexto. hac vefcentibus mētem adimi, & quadam neruorum diftēctione dehifcere in rictus ora cogi, ita vt ridentium imaginem præbeant. Inde Homerus & pofteri rifum nullo falubri fenfu dignum, fardonium nominant. Strabo ex hac herba toxici genus Hispanos confeciffe prodidit, hauftu cuius vrgente vi maiore citra dolorem ipfi fibi mortem confeifcebant. Nafcitur fecus fontes, nullum tamen virus peftilens aquis impereitur, Pausanias apud Sardos eam gigni fcripfit.

**SATYRIVM** aliqui trifolium vocant, quoniā tria fert folia, ad terrā infracta, rumici aut lilio fimilia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalē, nudum: florē lilii effigie, cādidū: radicem bulbofam, mali magnitudine, fuluā, intus, vt ouū, candidam, guftanti dulcē, & ori non ingratam. Eft & alterū satyriū erythroniū fiue erythraicon, id eft, rubrū femine lini, maiore, duro, læui, fplendente, quod fertur, nō fecus atq; fcincus, libidinem excitare. cortice radicis gracili, rufo, intus

σατυριον  
testicul<sup>2</sup>  
facerdo-  
tis.

ερυθρόν  
viov

autē album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. in mōtosis & apricis enascitur. Aegineta. Satyrion humidum est & calidū, item flatuosum, vnde veneris appetentiam facit. Nonnulli opisthotonis cum vino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in comētario de theriaca, trifolium ait hyacintho simile, quum aëre inturgescens, semen sylvestri cnico æquale habet: decocti ipsius ius superfusum, phalāgii aut viperae morsus sanare: sano idem potui datum, similem animalium horum icibus affectum conciliare.

σατύριον  
βασιλικόν.

SATYRION basilicum Græcis nominatur, foliis nigra plumbagine maculosis, reliqua superficie cynosorchi similis. radix subest lutea, ac instar manus effigie ramosa. Cum erugat, ad neruorū dolores, & contra noxia medicamenta datur. Semen ex vino sumptum nouem diebus comitiales sanat. In eundem effectum vinū diluitur herbae decocto. Scobs radice propinatur in vino ad arcendā quartanam, quam & vomitione curat, paulo ante accessionem pota. Fertur & amuletum esse radix gestata. ( Herbam quoque illam satyrion Indam appellauerim, Theophrasto allatam ex India: incredibili neque fanda ad libidinis motus potestate vel cōtactu: nō tamen speciē eius aut nomen aliud reddidit Theophrastus.) Habent hodie & Syri herbam simili effectū, bucheidénq; nominant,

& Indicum satyrion, radice candida & dura, commendatiore quo crassior, rugosior & albior fuerit, podagrís vtili.

SATYRIEA triuialis notitiæ est. gigni *βύμβρεος* Saricte  
 tur in asperis locis, & tenui solo, thymo simi  
 lis, minor tamen & tenerior. defert spicâ flo-  
 rum plenam, coloris herbacei. Eadem potest  
 quæ thymum, si modo cõsimili sumptitetur.  
 Aptus sanis vsus. Est etiamnum quædam sati-  
 ua, syluestri prorsus minor, quæ propter mi-  
 tiorem acrimoniam, commodius in cibos re-  
 cepta est. Aeg. Thymbra agrestis quidem ea-  
 dem quæ thymus præstat: hortensis autem in  
 omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum  
 laudatior.

SAXIPHRAGA seu saxiphrages vrinã  
 mouet, & calculos conterit. Aeg.

SCAMMONIA, ramos ab vna radice e-  
 mittit trium cubitorum, multos, pingues, & *σκαμμο-  
 νία.*  
 helxing, aut hederaceis, mollioribus tamen, *Diagre-  
 don me-  
 dici nũc  
 appellat*  
 hirsutis, & triangulis: flore cãdido, rotundo,  
 in calathi modum cauo, graueolente: radice  
 prælonga, crassitudine cubitali, candida, gra-  
 ui odore, succo grauida. Legitur ad hunc mo-  
 dum succus, Capite exempto, radix in testu-  
 dinis speciem cultro excuatur, quo fit vt in  
 cauum confluat succus, qui conchis demum  
 excipitur. Alij scrobes in terra concamerato  
 sinu fodiunt, in quos, subiectis iuglandium

foliis, profundunt succum, siccaturumque extrahunt. Laudatur autem scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat ( hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit tithymali lacte ) sed longe magis antea narratis. item si non vehementer linguam exurat, id quod misti tithymali argumentum est. natione autem Syriacum & ludæicum deterrima habentur, grauias, densas, erui farina & tithymalo vitiata. Aegin. Scammonia calfacit, digerit, & biliosa extergit, magisq; eius liquor qui iam & phymata dissipat, foetus appositu corrumpit, lepras exterrit, in diuturno capitis dolore cum oxyrhodino vtiliter respergitur. Radix autem tum ipsa, tum decoctum eius potui, purgat. Cum aceto & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus illinitur.

σκανδιξ.

SCANDIX syluestre olus est, amarum, subacre. quod crudum coctumve manditur. stomacho & ventri vtile. Aeg. Cal. sic. 2. Vrinam pellit, viscera obstructione liberat.

σκιλλ.

Scipoul-

le. offic.

squilla

Charpen

taire

SCYLLA incidit, calefacit, & desiccatur, in secundo ordine. præstat autem eam assam aut elixam sumere.

SCOPA regia Plinio viola est violentum spirans odorem, sed hoc foliis, non floribus.

(fortassis eadem fuerit viola flammea, cuius ramuli & folia odorata describuntur, flos inodorus. Vere statim post purpuream emicat, sylvestris duntaxat: interdum tepidioribus locis, ubi cælum aridet clementius, nondum exacta hyeme, colore commendabili, odore nullo femine proueniens coronis. Plurimum durat tempus. Græcis phlox & phlogion appellatur.) Diosc. bunion suum Latinis scopam regiam scribit appellari. Plinio similiter appellatur sideritis, quæ sit latissimo folio, vulneribus præcipua, quæ etiam præcisos nervos glutinare possit.

SCORDIVM in montibus & palustribus nascitur, foliis trifaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis. aliquantum allia redolentibus, gustu amaris & astringentibus: quadrangulis caulibus: subrubro flore. inter priora efficaax Ponticum natione, Creticumque. Aeg. Variis pollet facultatibus, ut quod amarum, acerbum, & acre sit. purgat igitur simul & calfacit viscera. urinas & menstrua concitat, refrigerata omnia excalfacit, vulnera glutinat, repurgatque: aridum illitum cicatricem inducit.

σκορδιον  
Herb.  
chamæ-  
dryspalū  
stris rur.  
chamara  
Non est  
hæc alliū  
sylvestre  
seu allia-  
ria

SCORDION alterius generis methastro simile à Plinio traditur.

SCORPIOIDES herbula est, quæ semen habet ad similitudinem caudæ scorpionis, foliis paucis. illitum valet aduersus animal

σκορδιον  
ἑπείρον.  
σκορπιον  
δίο.

Non est sui nominis. (Plinius herbam scorpium vocalédula cauit, quanquam & aliis idem nomen con- nec sol tribuat.)

sequia S C O R P I V S siue nepa nullum folium habet Plinio, sed in cacumine aculeum, sub cuius extremo in carne protuberante, florem profert per initia cādidum, postea leniter accedentem ad purpuram. Post æquinoctium autumnii floret, radice singulari eadēmq; breui cohæret. Spina est in totum, asparagi caule. Nomen ab aculeo suo traxit. (Eadem arbor cum Dioscoridis trago herba. Describit & alium scorpium Plinius cyclamini folio, aconiti generibus adnumerandum.)

S E B A S T I, vide Myxa.

σκόροδο-

πρασον.

S C O R O D O P R A S V M magnitudine porrum æquat, qualitatum porri & allij particeps. vnde promiscuas sibi vires ex utroque vendicauit, effectus allij & porri præbens, inefficacius tamen. coctum, porri modò, dulcescit, & in olerum vicem transit. Aeg. Porri & allii mixtas habet vires, & gustatum.

Scgle

S E C A L E Plinio farraginis genus, occari tantum desiderat. Taurini sub alpibus asiam vocant. deterrimum & tantum ad arcendam famam vtile, fœcunda, sed gracili stipula, nigritia triste, pondere præcipuum. Admiserit huic far vt mitiget amaritudinem eius, & tamen sic quoque ingratissimum vëtri est. Nasceatur qualicunq; solo cum cetero grano,



ipsumque pro latamine est.

HEDYSARON, vnguentarij pelecini, *πυλέκι*  
id est, securidacam vocant, fruticosa est, foliis *vos.*  
ciceris. semen rufum in siliquis fert, cornicu. Feue do  
lorum modò aduncis, quod ancipitem secu loup, her  
rim æmulatur, vnde nomen accepit. amarum bue ou  
gustu. Nascitur in segetibus & hordeis. Aeg. graue  
Amarum est, leuitérq; astringit, vnde potum ou cor  
stomacho gratū redditur, viscera obstructa nocte  
repurgat.

SELAGO similis herbæ Sabinæ est. Hâc  
contra omnem perniciem habendam prodi  
dere Druidę Gallorum, & contra omnia ocu  
lorum vitia fumum eius prodesse.

SEMPERVIVVM magnū ideo nomi  
natur, quoniam perpetuò folia vireant. cuius  
caules cubiti altitudinem implent, interdum  
excedunt, pingues, crassitudine pollicari, vi  
rentes, characiæ tithymali modo insecti: fo  
lia pingua, carnosâ, lōgitudine pollicari, in  
cacumine linguæ similia, alia in terram con  
uexa, alia in capite stantia inuicem, ita vt am  
bitu effigiē imitentur oculi. nascitur in mon  
tibus, & testaceis. supra domicilia etiam scri  
tur. Semperuium paruum in petris, parie- *ἀειζων.*  
tinis, & maceriis, necnō scrobibus opacis na- *Iōbarde*  
scitur, caulibus ab vna radice multis, tenui- *ou Iou-*  
bus, crebrò foliatis: exilibus foliis, rotundis, *barde*  
pinguibus, mucronatis: caule à medio emi  
cante, palmum alto, ymbellam herbidósque *Vermicu*  
*laris &*  
*cauda*  
*muris*

**Menu** flores & tenues gerente. Folia eisdem cū pri-  
**pourpier** ore viribus prædita sunt. Tertiū videtur sem-  
**sausage** peruiui genus, quam aliqui andrachnen a-  
 griam, aut thelephion vocauerunt, Romani  
 illecebram, pusillis, crassioribúsq; foliis, hirsutis, portulacæ proximis. nascitur in faxis. Vis ei excalectoría, acris, exulcerans. illita cum axungia strumas discutit. Aeg. Aizoon vtrunque frig. 3. siccat autem astringitq; mediocriter. Valet erysipelatis, & ad herpetas, inflammationesque ex fluxione concitatas conuenit.

**νερίων** **SENECIO** cauliculo est cubitali, subrubro, foliis continuis, diuisura crucæ, sed minoribus multo: luteis floribus, qui celeriter dissecti vaneſcunt in pappos. nomē verò sibi vendicauit, quoniam flores capillorum ritu vere canescāt, radice superuacua. nascitur maximè in maceris, & circum oppida. Aegine. Mixtas habet vires, refrigerat, & modicè discutit.

**σις** **SERICA** in Zizíphis leguntur.  
**cichoree** **SERIS** duūm generum est. altera sylvestris, quæ picris & cichorion vocatur, altera satíua, latioribus foliis cōstat. stomacho quàm hortensis vtilior, quæ iterum in duas species digeritur. vna folio latiore prodit, lactucarū simillima. altera angustiore est folio, & gustu amara. Aegineta; Subamarum olus est, admodum refrigerans humectansque, cum

astriictione nonnulla.

SERPILLVM duorū generum est. Hor- ἑρπυλλον  
tense odore sampsuchum imitatur, atq; in co Serpillet  
ronas addi solet, cui à serpendo nomen indi-  
tum est: quoniam si qua eius particula terrā  
attingat, inibi radices demittet. folia & ramu-  
los origani habet, sed candidiores. in mace-  
riis multo procerius assurgit. Sylvestre, zy-  
gis appellatum, non serpit, sed in altitudi-  
nem increscit, ramulos edens tenues, surcu-  
losos, foliis refertos longioribus quàm rutæ,  
& durioribus, angustius. flores iucundè olēt,  
gustāti acres. radicis nullus vsus. Nascitur in  
petris, satiuo efficacius, atque magis excalfa-  
ciens, & ad medendi vsū aptius. Aeg. Serpil-  
lum calefacit, vt & vrinam & menstrua com-  
moueat.

SESAMMA stomacho inutilis cibus. Aeg. σησαμον  
Sesamū non parum lentoris, pinguisq; obti- offic. fisa  
net: idcirco opplere, mollire, & mediocriter mum  
calefacere idoneum est.

SESAMOIDES magnū, in Anticyra el- σησαμον  
leborum vocant, quoniam albo veratro in εδίς μέ-  
purgationibus misceatur. simile est senccio. γα.  
ni aut rutæ: longo folio: flore candido: radi-  
ce gracili, ignaua: semen gustu amaro, cæte-  
ra sesamæ simile. Ventrem detrahit. datur  
eritum ad bilis pituitæque deiectiones, quan-  
tum tribus digitis capitur, addito verati al-  
bi sesquiobolo, ex aqua mulsa.

σησαμο- Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes:  
 ειδ'ες μι- folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cau-  
 κρόν, liculorum cacumine capitula, florū penè pur-  
 pureorum, medio eorū albo: semen sesama,  
 fuluum, amarū: radix tenuis. Detrahit bilem  
 pituitasque, semen ex aqua malsa potum di-  
 midio acetabulo. illitum ex aqua, tumores  
 ac tubercula discutit. nascitur in asperis. Aeg.  
 Sesamoides albi (aut potius parui, mendum  
 enim interpretor λευκοῦ pro λεπτοῦ.) semen  
 calefacit, detergit, & rumpit. Maius autem ve-  
 ratri vires sequitur. Galen.

τορδύλ-  
 λεον.  
 λεον

T O R D Y L I V M, quod aliqui Creticum  
 feseli vocant, iuxta Ciliciam in Amano mon-  
 te nascitur, herbula surculosa, semine duplici  
 rotundo, scutulorum effigie, odorato, suba-  
 cri. Aegineta, Gordylon alii feseli appellant,  
 calidum est, vrinae & mensibus educendis ha-  
 bile. Radix ipsius cum melle lincta, quæ in  
 thorace hærent, educit.

σισιλι-  
 offic. &  
 herb. fa-  
 xifraga  
 maior

S E S E L I Massiliense folia fœniculi habet,  
 crassiora: caulem vegetiorem: vmbellā ane-  
 thi, in qua semen oblōgum, angulosum, de-  
 gustanti statim acre. radix longa est, iucundi  
 odoris. Aethiopicum feseli, folia habet hede-  
 ræ, minora, & ad periclymeni modum ob-  
 longa. frutex nigricat: palmitibus in bina cu-  
 bita extensis: ramis sesquipedalibus: capitu-  
 lo anethi: semine in tritici morem denso, ni-  
 gro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acrio-

re, multum suavi. Peloponnesse folia ha πλωπιν  
 bet cicutæ. latiora, & crassiora: caulem supra νκσιανόν  
 Massiliensis magnitudinē, ferulaceum, & la-  
 tum in cacumine umbellam, in qua semen la-  
 tius, odoratum, & carnosum pendet. Eisdem  
 viribus præditum est. nascitur in asperis, ri-  
 guis & collibus. inuenitur etiamnum in insu-  
 lis. Aeg. Sesehus radix magisq; semen insigni-  
 ter calefacit, tenuisq; substantiæ est, urinam  
 quoq; ciet, comitialibus & recta ceruice spi-  
 rantibus accommodatum.

SEVTLOMALACHON recens Græ. σιντλο-  
 cia fecit olus, quasi dicas maluaceam be- μάλαχον  
 tam ( fortè quod figura & denticulato semi-  
 nis habitu betam, & mollitia maluā menti-  
 retur.)

SYCOMORVM aliqui etiam syca συνκόμω  
 minum, id est, morum vocant cuius fructus ρος.  
 sycomorum etiam propter inefficacem gu-  
 stum appellatur. arbor est magna, fico simi-  
 lis, frondosa, multo lacte abundans. foliis  
 mori. pomum ter aut quater anno fert: non  
 ramis, vt ficus, sed caudice ipso, caprifico nō  
 dissimile. dulcius grossis, sine granis interio-  
 ribus. quod nō maturescit, nisi ungue aut fer-  
 ro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria,  
 Rhodo, locisque non multi tritici feracibus:  
 vbi prouentu fœcundo astibilique iuuamen-  
 tum adfert, cum amonæ caritas premit. Gi-  
 gnitur & in Cypro arbor genere distās, quæ

cum sit vlmus, prædita tamen est foliis sycomorî, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis. Aegin. Sycomorî fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius. Liquor arboris vi pollet emolliendi, glutinatoria vulnerû, discussoria tumorû: bibitur inungiturq; ad serpétium morsus, lienes induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores.

**S I D E** planta lacustris est in Orchomenio lacu frequēs, papaueri similis, roseo flore, vasculo mali amplitudine, cãdidis membranis obducto: semine intus rubro, gustu triticum æmulãte. Caput & folia super vndas emicãt, mox cum defloruit inclinatur in vadum, seménque spargit. Plin. & Theo.

*σιδῆρι-*

*τις.*

Herb. &  
off. tetra-  
hil, ou  
herbe Lu  
daice.

**S I D E R I T I N** aliqui heracleam vocant. folia habet marrubii, sed longiora, satis ad frondẽ quercus, aut saluix accedentia, minorã tamen, & aspera. caules edit quadratos, palmum sæpe excedentes, nõ iniucundi gustus, aliquantũmq; substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ vertebrae, vt in marrubio, spectantur, & semen in cis nigrum, nascitur, in petrosis. Illita folia, suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

Lunaria  
maior

Altera sideritis binũm cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, numeroso, vtrinque per oras diuiso: pediculo longo, prodeuntibus è summo alarum sinu furculis, longis, te-

nuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen cōtinetur, quàm betæ rotundius aliquāto, ac durius. Huius vis, foliorumque, ad vulnera, præcipua est. Sideritim aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam vocat, in maceriis & vineis nascētem, foliis coriani, à radice numerosis: dodrantalibus cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus: flore purpureo, paruo, gustanti amaro & lento. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimit. Galenus, Habet quidem & abstergēs aliquid, sed amplius humidū & mediocriter frigidum, cum adstrictione pauca, hinc inflammationib⁹ resistit, vulnera glutinat. De Achillea sideriti alibi diximus.

Mille  
feuille

SIDERITIS Plinii latissimo folio in scoparia regia habetur.

SILER frutex est, qui nonnunquam arbor rescat, vt baculos rustici ex eo faciāt, in aquaticis nascens quasi pumila salix, cuius etiam generibus annumerari creditur. Eius folia illita fronti capitis dolores sedant. Semen tritū in oleo phthiriasis coërcet. Serpentes hunc fruticem refugiunt, baculūque ob id ex eo rustici conficiunt.

SYLIBON, lata spina est, folia ferēs chamaeleonis albi. Hæc recēs cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus, vomitiones ciet. Aegineta, Succum

σὺλίσον

cum mulsa bibendum adiicit.

ὄλυρα.  
Arinca  
gallis  
olim

**E I D E M** generi filigo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit. in panes, vt zea, cogitur. Fit quoq; è filigine crassior farina, quā Græci crimon vocitant. Galenus, Olyræ naturam inter triticum & hordeum est media, siue vt nutrimentum consideres, siue vt medicamentum.

κερατώρα.  
νία.

**S I L I Q V A E** fructus arboris ceratonix ficcandi & (Galen. astringendi) refrigerandi virtutis, nonnullius etiam dulcedinis participes est. Aegineta.

σύμφυτον  
πετραίον.  
Bugle, nō  
est Cōsolida  
medicaria  
officinarum.  
σύμφυτον  
πετραίον  
cōsolida  
de ou cō  
syre

**S Y M P H Y T O N** petræon, id est, alus. nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, organo similibus: capitulis thymi: surculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluā ciens: longa radice, subrufa, digitali crassitudine. carnes autē cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterum symphyton quod aliqui petron vocant: id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, vt sonchi inanem, circa quem breni interuallante spacio, folia exeunt angusta, linguæ bubulæ proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: foliis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. tam caulis quam folia, aspera lanugine horrēt. tactūq; pruriturum concitant. Radices demittuntur foris nigrae, in-



eus candidæ, viscosæ, quarū est vsus. Carnes quoque, si concoquantur, cogunt additæ. Aegineta, Petræum contrariis cōstat viribus. habet enim aliquid quod incidat, idēoque pus in thorace & pulmonibus collectum expurget, itēque renes. Habet etiam aliquam contrahendi virtutem, qua sanguinis excreationibus medeatur. conuulsis, ruptis, mulierum fluxionibus rubris, intestinorum ramicibus. Item calida quædā humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriæ asperitates sanat. Symphytum alterum viscosum quippiam & mordax repræsentat, scillæ simile. Utuntur eo ad quæ superiori.

SYPHONAM, quam alij crumphenam, Fortè hæc Plinius repræsentat alternis viridibus roseisq; genesis per caulem foliis, eamque in posca sanguinē seu helereiicientibus mederi. fia Gall.

SINAPI hortense, aliqui napi vocāt. Eli- νάπυ,  
gi debet adultū, valde rufum, nō magnopere σίνηται.  
ficcum, sed quod fractum internè vire scat, & Seneue  
veluti quodam succo madeat, cēsum colore.  
siquidem recēs id genus, tempestiuum habetur. Aeg. Cal. sic. 4. σίσαρον.

SISER vulgò cognitum. Cuius radix de- Serulle  
cocta ori grata est, & stomacho utilis, vrinā seruile,  
ciet, & appetentiam inuitat. Aeg. Radix cal. ou escher  
2. (aliās enim perperam legitur. 3.) uille

SISYMBRIVM, alii serpillū syluestre σισύμυ  
vocant, in solo inculto nascitur, mēthæ hor. βριονο

offic. na- tensis similitudine, odoratius, latiore folio.  
 sturcium Inferitur coronis. Alterum sisymbrii genus,  
 aquaticū quod aliqui cardaminam, alii sion appellāt.  
 vulg. cres ea herba riguis gaudet, & eisdē in locis qui-  
 son. bus sion prouenit. quæ ideo nonnullis carda-  
 mina nominatur, quòd gustu cardamum, id  
 est, nasturtium repræsentet. folia primum  
 rotunda prodeunt. adulta crucæ modo fin-  
 duntur. Galenus, Sisymbrium est subtile, dis-  
 cutit, calefacit, siccatur 3. semen eius tenue cali-  
 dūque est, vnde cum vino ad singultus &  
 tormina exhibetur. Cardamina vero arida  
 calefacit siccatur tertio. Viridis calefacit siccatur  
 secundo.

σιων. s i s o n exiguum semen est, in Syria na-  
 Menthe tum, apio simile, nigrum, feruens, oblon-  
 aquati q̄ gum, quo in condimentis, cum cucurbita,  
 outhym- & aceto, indigenæ vtuntur. in cacumine gra-  
 bree ou nula multa gerit. Aegineta, Sinon calidus &  
 balsami subamarus est, vrinam mouet, concoctio-  
 ta. nem adiuuat, menses educit, & viscera ob-  
 structa aperit.

s i v m, quære Lauer.

σμίλαξ.

s m i l a x à Græcis, taxus à Latinis  
 appellatur, arbor abietis magnitudine, & fo-  
 liorum eiusdem figura, in Italia & Narbo-  
 nensi Gallia Hispaniæ contermina nascens.  
 Auiculæ quæ Italicæ taxi baccas deuorant,  
 denigrantur: & qui ederint easdem homines,

alui profluuiio corripuntur. Narbone tam  
 præsentis est veneni, vt si qui dormiant sub  
 ea, aut in eius vmbra subsideant, lædantur,  
 & sæpenumero moriantur. quare de taxo  
 hæc traduntur, vt ab ea caueamus. Aegine-  
 ta, Smilax, vel cactus arbor est virosæ virtu-  
 tis. (Sed pro κακὸς malim legere τᾶξος.) σμίλαξ

Hortensis S M I L A X, frutex, cuius se- κηπαῖος  
 men à nonnullis lobia vocatur. folia habet  
 hederæ, molliora tamen: tenues caules, &  
 capreolos vicinis fruticibus circumuolutos:  
 qui tantum adolefcunt, vt topiarias scenas  
 repræsentare videantur. siliquas fœnigræci  
 profert, longiores & torosiores. in quibus se-  
 mina renum similia, sed inæquali colore re-  
 cluduntur: quæ quadam ex parte fuluescunt.  
 Siliqua cocta, cū semine in oleribus, aspara-  
 gi modo, estur. urinā ciet, & tumultuosa so-  
 mnia facit. Vide plura in Phaselis. σμίλαξ

S M I L A X aspera, folia habet peri- τραχίαια  
 clymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi mo-  
 do, aut paliuri aculeata. arbores scandit ab  
 imo ad summa perreptans, se conuoluens  
 eis. fert racemos exiles, qui maturi rubescūt,  
 gustumque leniter mordent. nascitur in palu-  
 stribus & asperis: radice dura, crassaque. σμίλαξ.

Læuis S M I L A C I S folia hederæ similitu λεία.  
 dinē habent, molliora, læuiora, tenuiora. hu-  
 ius sarmenta nullis horrent spinis. conuolui.

tur arboribus, vt prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria cōtra æstus molestiam faciuntur. folia per autumnum decidua. Aegin Milax tam læuis quàm aspera, arbores amplexa, calidam acrimque facultatem possidet.

σμύλα

vior.

Leuechia

ou lues-

che

S M Y R N I V N, quod in Cilicia petroseli nū vocāt, passim in Amano monte gignitur. caulem habet apij, & stolones multos: folia latiora, suppinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda, colore in luteum languescente. capitibus caulium orbiculatis, vt anethi. femine brassicæ, rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore, ita vt alterum alterius loco cedat. radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus atque squallidis, & limitibus terrenis. Aegineta, Quidam hipposelinum, quidam apium syluestre nominant. Cal. sic. 3. apio duntaxat fortius, petroselino inualidius. vrinæ & mensibus educendis accommodatum.

σπύλινος

κνέκος.

Morille

solatrum

Hortense S O L A N V M, frutex cibus idoneus, exilis, pusillius, multis concavus alis: folio nigro, maiore quàm ocimi, & latiores solatrum fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem

nigricat, aut fuluescit. herba innocentis gustus. Aeg. Astringit, & frige facit secundo.

Est & aliud **SOLANVM**, quod peculari nomine halicacabon, id est, vesicariā, aut physalida vocāt, foliis antedictis latioribus. cuius caules, posteaquam adoleuerunt, pronā terram spectant, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, vesiculis simili, rotundo, laevi. quo coronarii vtuntur, & corollas faciunt. Vim vsuq; hertenfis solani habet: verū cibis nequaquam expetitur. Aegineta, Vrinæ ciendæ idoneum fructum habet, acino vuæ æqualem.

**SOLANVM** manicon, aliqui persion, alii thryon appellauere. huic folium erucę simile, maius aliquanto, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens. caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolēcentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed vt platani pilulæ, hirtutius, verum maius, latiūsq; florem nigrum. postquam eo exuitur, racemus exit rotundius, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt vuæ mollibus. radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. gignitur in montibus vento perflatis, & platanetis. Aegineta, Intus assumptū inutile est: à foris illitum vlcera depascentia curat. Frig. sic. 2.

**SOLANVM** somniferum, aliqui etiam

σφύχνος  
ἀλικάκ-  
καβος.  
offic. alca-  
quengi.  
rur. cocre-  
tum:

σφύχνος  
μανικός.  
offic. sola-  
trū. mo-  
rille.

σφύχνος  
ὑπνωτι-  
κός.

her. & of. halicacabon appellât, fruticat multis ramis,  
 solarium densis, caudicosis, fractu contumacibus, pin  
 dormito guium foliorum, cotoneæq; mali similium  
 riū ou ma plenis: flore grandi rubro: fructu in follicu-  
 rinum. lis crocato: radice longa, subrubro cortice ve-  
 stita nascitur in saxis, non procul à mari. Ae-  
 gineta, Radicis cortex cū vino denarii pon-  
 dere potus, somnum conciliat. Semen urinā  
 mouet, frig. 3. Vnde corymbi ei<sup>9</sup> plures duo-  
 decim epoti, furorem accersunt.

σόμφος. S O M P H V S cucurbitæ genus sylvestris  
 est, cui nomen, quia sit inanis, digitali crassi-  
 tudine, non nisi in saxosis nascens.

σόνχος. S O N C H I duo genera. sylvestrior qui-  
 dā est, & magis spinis horret. alter teneritate  
 aliis pa- quadam mollescit, cibis expetitus, angulo-  
 lais au lie fo caule, inani, interdū rubente: foliis in am-  
 ure. nō ē bitu per interualla dissectis. Alter sonchus  
 hęc scari- tenerior, arboris instar, latis constans foliis.  
 ola offici caulē in ramos exeūtem folia distingunt, sed  
 uarum. ad eadem pollet. Aegineta, Astringit & ma-  
 nifestè refrigerat, tum corpori admotus, tū  
 manducatus: exarefactus autem mediocri-  
 ter calefacit.

δῶα. S O R B A colorem luteum referentia pri-  
 Sorbe ou us quàm maturescant, dissecta & sole siccata  
 corme. manduntur, vt aluum sistant. eadem est fun-  
 ctio molitorum farinae, si polentę loco suma-  
 tur, quod & decoctū eorum in potu præstat.  
 Aegineta, Sorbus arbor, cuius fructus oa, à

nonnullis  $\delta\tilde{\nu}\alpha$  dicitur, adstringendi vim obtinet, sed minorem mespilo.

**SPANACIAM** olus recentiores Græci  $\sigma\pi\alpha\nu\alpha\kappa\iota\alpha$  dixerunt, vt putant nonnulli ab oleris raritate: vel ab aliis (vt est simile veri) nationibus Spinage: emendicato spinaceo nomine.

**SPARGANION**, aliqui xiphidion vocant. folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia. in summo caule veluti pilulæ prominent, in quibus semen  $\sigma\pi\alpha\rho\gamma\acute{\alpha}\nu\iota\omicron\nu$ . off. spatula fœtida. Contra serpentis venena, radix cum vino datur. Aegineta. Vim habet exiccantem.

**SPARTION** frutex est, longas ferens virgas, sine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur: semen lenticulæ, in folliculis phasiolorum modo nascens: florē, vt albę violæ, luteum. Aeg. Sparti & semen & flos cum mulsâ instar quinq; obolorum pota, per superiora purgant veratri modo sine periculo. Semen per inferiora quoque purgat. Virgulæ ipsius ad coxenditum dolores proficiunt.  $\sigma\pi\alpha\rho\gamma\iota\omicron\nu$

**SPHONDYLIVM** folia quadam tenus  $\sigma\phi\omicron\nu\delta\tilde{\nu}\lambda\iota\omicron\nu$ . platani & panacis habet. caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, fœseli simile, sed latius, cãdidius, & magis paleaceū, grauis odoris. flores eius albi, aut pallescentes: radice raphani, candida. nascitur in palustribus & aquosis. Aegineta, Fructus eius  $\text{Panaiz saulage}$

& radix virtute acri & incisoria suspiriosis, comitialibus, & arquatis succurrunt. Radix autem circumrasa, fistulisque imposita, illarum callos tollit. Succus è flore ipsius expressus antiquis aurium vlceribus instillatur.

SPINA acuta, vide Acuta spina.

ἄκανθα  
λευκή.

SPINA alba nascitur in montibus & syluosis, folia fert albi chamæleonis, angustiora. & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum. in cacumine capitulū inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicū, sed rotundius. Aeg. Eius radix siccatur, & modicè astringit, cōq; & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiūmque doloribus succurrit. Semen tenue calidūmque est, hinc conuulsioni quoque medetur.

ἄκανθα  
ἄραβική.

Arabicam SPINAM natura albæ spinę similem esse cōstat. ipsa siquidem stringit ad sanguinis reiectiones, mēsum abundantia, cæterasque fluxiones radix etiamnum valet.

στάχυς.  
Μότana  
& mollis  
saliua her-  
ba. nauicula,  
ou corona-  
ria herba

Prouenit in asperis. Aeg. Aegyptia vel Arabica spina astringit, siccaturq; impense, vnde sanguinem, & alias defluxiones retinet.

STACHYS frutex est marrubio similis, sed longior. folia ferēs numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures virgas ab radice exeuntes, marrubio can-



didiores. nascitur in mōtibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acré. foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas. Aeg. Cal. 3. menses excitat, interimit fœtus, secundas pellit.

STAPHYLODENDROS arbor trans alpes simillima aceri, alba in materia, fert siliquas, & in iis nucleos sapore nucis auellanae. Plinius. (Sunt qui eandem Theophrasti colyceam interpretantur.) σαφύλη-  
δενδρως

STAPHIS agria, siue herba pedicularis, σαφίς &  
γρία.  
offic. sta-  
phis a-  
gria. folia habet labruscae diuisa: & cauliculos re-ctos, molles nigrosque. fert florem glasti: & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Aegineta, Acris adeò est vt pituitam per os educat, & vehementer abstergat.

STYRAX lachryma est arboris malo cotoneae similis. Præfertur sordescēs, flauus, resinosus, albicātibus grumis, quàm plurimum rax & Cain sua odoris gratia permanens. qui dū mol- σύραξ.  
offic. sto-  
nosus, albicātibus grumis, quàm plurimum rax & Ca  
in sua odoris gratia permanens. qui dū mol- lamītha. litur, melleum liquorem reddit, qualis è Cathaballis, Pisidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, furfurosus, friabilis, canóque situ obductus. Cæterū lachryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & myrrhæ emula. verum perpauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserūt, melle, & iridis sedimēto, & quibusdam aliis.

Alii ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis foliis cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua vermiculos exprimunt, venundantq;. Styra- cem hunc, quoniam in vermiculorum speciē contrahatur, scoleciten cognominant, quem tanquam sincerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Aeg. Styrax calefacit, emollit, & cōcoquit. Tussi, destillationi in nares, & grauedini utilis. Menses idem potus appositusve trahit.

στοιβή.  
Non est  
vulg. sca-  
biofa.

STOEBAE semen & folia sic. 3. ordine, principio viribus donata astrictioris, eamq; ob causam vulnera magna conglutināt. Decoctum ipsorum intestinorum torminibus, sanguinis eruptionibus, auribus purulentis auxiliatur: folia illita oculis ex ictu suffusis conferunt.

στοιχάς.

STOECHAS, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur, vnde cognomētum accepit. herba tenuibus furculis, coma thymi, lōgiore folio, subamara gustu, & aliquantū acris. Aeg. Aperit, extenuat, detergit, & confirmat viscera omnia, totūmq; corporis habitum.

στρατίων  
cumī, ou-  
aneth sau-  
uage, ali-  
is afini-  
nusdauc<sup>9</sup>

STRATIOTES millefolium exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. foliis auicularū pennas imitantibus, bre-

ui admodum dissectioque foliorum exortu. folia sylvestre cuminum simulant, præsertim breuitate atq; scabritia, breuiora paulò, densiore umbella, & plenior. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximii vsus ad vlcera vetera, recentiaque, profluentè sanguinem, & fistulas. Aeg. Astringit, vlcera committit: nonnulli eo & ad sanguinis eruptiones, & ad fistulas vtuntur.

STRATIOTES in aquis nascens, iisdè *στρατίωτης* supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomentum traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Aegineta: Humidus & frigidus est natura.

STRUTHIVM in Radicula quære.

T

AXVM arborem habes in similitudine descriptam.

T

TELEPHIVM herba portulacæ *τηλέφιον* similis & caule & foliis, habes gemina tuber vineatica cula, à singulis radicum geniculis enascètia, sèpuiua, à quibus rami seni septème fruticant, à radice referti cœruleis foliis, crassis, lentis, carnosus: flore luteo, aut cādido. Nascitur in cultis, & maximè inter vites. Tempore verno folia senis horis illita albam vitiliginem faciunt: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiā in sole vitiligi-  
prinsc.

nem tollunt. sed vbi inaruerunt, absterguntur. Aeg. Cal. 1. sic 2. Est itidem absterforiū, quapropter vlcibus putredinem expertis conuenit: & vitilignes, tum leucas, tum alphas cum aceto abolet.

τέρμιν-  
θος.

**T E R E B I N T H V S** cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadem ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaque. Aegineta, Cal. 2. viridis sic. 1. aridus sic. 2. fructus vbi inaruerit sic. 3. hac igitur ratione & urinam mouet, & lienes adiuuat.

**T E S T I C V L V M** herbam in Orchi quære.

τένκρίον  
Nō est q̃  
vul. Tun-  
sa faba.

**T E V C R I O N**, siue vt aliis placet, tencris, herba est virgæ referens effigiem, trifaginis similitudine. tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissadēmq; vbertim prouenit. Aegineta, Cal. facit 2. siccatur 3. Vi incisoria tenuique lienis medetur.

θαλίετρον  
Argentine

**T H A L I E T R O N** folia coriandri habet, pinguiora paulò: caulem ruscæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricē perducunt. Nascitur maxime in cypriis. Aeg. Coriandri in line rosæbus habet. Line vlcera inueterata cicatrice obducit.

θαψία.

**T H A P S I A** nomen ideo accepit, quod in Tapso eiusdem nominis insula, primum inuenta sit. tota verò natura ferulæ similis est: gra-

est: graciliore caule: foliis fœniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis surculis erūpēte, flore luteo. semē quale ferulæ, latū, sed aliquāto minus. radix foris nigra, intus cādida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahēdi ratio hæc est: Facto in ambitu scrobe cortices inciduntur: aut radix in fornicis specie in se excavata, cooperitur, quo merus succus confluat. oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallū expressus fictili crasso insolatur. Aliqui folium vnà terunt: sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manuit, grauius olet, & humidus permanet: è foliis autem extractus, exiccatur, atque teredinum iniuriam sentit. Qui succū colligit, stare debet non obuersus vëto, aut potius cū dies apricus est, & à flatu filer: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulæ: ob id prius liquido cerato & astringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedūt. Aegineta: Tapfia acris est, & valenter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit insigniter, attractūque discutit.

THE RIONARCA inde nomen inuenit, quod serpentibus torporem inferat. frutex est foliis subherbaceis, roseo flore. Ser-

θησιονάρχη

HHo

pentes necat cuicumque admota fuerit.

*θυμλαία*  
oliuella,  
leo rerre,  
oulin sau  
uage.

**T H Y M E L A E A** est, qua granum gnidiū, quod est semen ipsius, colligitur. hoc Syri apolinum vocāt, quoniā sativi lini frutex suapte natura, similitudinem referat. virgas edit perpulchras, multas, tenues, trepidancas: foliis chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisq; si mordeantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia viret, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Nasctur in montibus & asperis. Hallucinantur qui coccon gnidium fructū esse chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine. Aegineta: Thymelæa, vnde granum gnidium fit, similes ei vires obtinet. Habet autem granum id acrem & adurentem facultatem, aluum cum aqua potum purgat.

*θύμος*  
Thyn.

**T H Y M V M** ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus foliis, multis & angustis circūdatus capitulis in cacumine, flore purpureo refertis. Gracili solo & petroso prouenit. Aeg. Calefacit, siccāt. 3. Glutinosos crassosq; humores incidit.

*θλάσπι.*  
Seneuc  
sauuage  
herb. na-  
sturtiū te-  
ctorū.

**T H L A S P I**, herbula angustis foliis, digitali lōgitudine, in terrā versis, suppinguibus, in cacumine diuisis: binūm dodrantū cauliculo, tenui, non sine adnascētibus ramis. fructu circa ipsum totū, ab extremo in latius se

pandente: semine nasturtii incluso, lenticule  
 vasis effigie, nisi quod infringitur, vnde no-  
 men accepit. flos albicat. Nascitur in semi-  
 tis, & sepibus fossisque. Alterum thlaspi **Nō ē hęc**  
 tradit Crateuas, quod aliqui Persicon sinapi **bursa pa-**  
 vocant, latis foliis, radicibus magnis. vtile **storis.**  
 ischiadicorū infusioni. Aegineta: Thlaspi se-  
 men est viribus acre, intestinos abscessus po-  
 tu rumpit, menses prouocat. ab inferioribus  
 partibus iniectū, coxarum dolores finit, cruē-  
 ta vacuat. suprā infrāq; biliosa, instar aceta-  
 buli potum, expurgat.

**T H V S** in ea gignitur Arabia, quæ thu- **λίβανος**  
 rifera cognominatur. Primatum tenet in eo **τός.**  
 genere masculum, stagonias appellatum, su- **Encens**  
 apte natura rotundum. Tale autem indivi-  
 duum est, candidū cum frangitur, intus pin-  
 gue, in suffitu statim ardens. Indicū verò ful-  
 uescit, & colore liuet, sed rotūdum industria  
 facit ant. nā in quadrangulares formas disse-  
 ctum scilicet versant, donec rotunditatem  
 contrahit. verum huiusmodi thus tempore  
 flauescit, quod atomum aut syagrum appel-  
 lant. Secundum locum habet Arabicum, &  
 in Smilo nascens, quod aliqui copiscum vo-  
 cant, minus multò & fuluius. Est & genus a-  
 liud, cui ammitæ cognomen est, alioqui can-  
 didū: quod dum mollitur, mastiche more di-  
 gitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina  
 & gummi. quod facile deprehendi potest.

siquidem suffitum gummi flammam nō eiaculatur, & resina in fumum evanescit, thus verò statim ardet. idem maleficium odor prodit.

λίβανω-  
του  
φλοιός.

Præfertur **THURIS** cortex crassus, pin-  
guis, odoratus, recens, lævis, minime scaber,  
sine mēbranis. Adulteratur admisto pini aut  
nucis eius cortice. sed horum index ignis est.  
siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam  
incendantur, sed sine odore fumum eruclāt.  
thuris verò cortex ardet, & cū odoris fragran-  
tia vaporem eiaculatur.

μάννα λε-  
βάου.

**MANNA** thuris probatur candore mica-  
rum frequētia, & puritate. Vim habet eandē  
quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui  
cribrata pini resina, ac polline, aut cortice  
thuris contusi adulterant. sed hæc igne depre-  
henduntur. Neq; enim æquē suffitu aëriū va-  
porē, sed fuliginosum & impurum expuit, &  
permistū suaucolentiæ halitus virus habet.  
Aegineta, Lachryma thuris calfacit secundo  
sic. 1. Habet & modicam quandam vim leui-  
ter astringentem. Cortex ipsius manifestò a-  
stringit, & siccāt 2. absolutē, crassior thure &  
minus acris: hinc sanguinē spuētibus, dysen-  
tericis, coeliacis, & stomachicis, tum foris im-  
positus, tū intro assumptus salutaris est. Sur-  
culus ipsius calefacit siccāt 3. atque nonihil  
extergit: quocirca oculorum vlcera & pur-  
gat & explet.



**TILIA** Græcis philura dicitur, folio hederaceo, molliore, & in angulum acutiorem rotundiore & prolixiore, & in orbem lentè crispo atque ferrato, flore tantisper dum calyculo continetur herbaceo, vbi emerfi flavo: fructus magnitudine fabæ, similis acinis hederæ, in quo semen prætenue quantum atriplicis, omnibus animalibus ingratum, cum foliorum pabulo maximè ducatur, eorumq; mira dulcedine, quæ in cortice intelligitur. Materies maris dura, nodosa, odorati-  
or. (Theophrasto tamen scæminæ odoratior est) ruffior, cortex quoque crassior, ac detra-  
ctus inflexibilis, nec semen fert aut florem vt scæmina. Tilia vertit folium confecti sideris signum. Multi corticem commanducatū vul-  
neribus putant vtilissimum: folia trita asper-  
sa pedum tumori. Humor è medulla castrate arboris effluēs capillum reddit capiti illitus, defluentemque continet.

**TYPHA** foliū edit cyperidi simile: cau-  
lem album, læuem, æquabilem: florem in ca-  
cumine ambientem, densum, qui in pappos  
soluitur, quod paniculam aliqui nominant.  
Huius herbæ flos, suillo adipe eloto exce-  
ptus, ambustis medetur. Gignitur in palustri-  
bus & aquis stagnantibus. Galenus & Aegi-  
neta non meminerunt.

**TYPHA** vel tipha cerealis specie filigi-  
ni non dissimilis, simplici culmo assurgens,

φιλύρα  
Tilet, Ti  
leul, teil

τύφη, vel  
τίφη.  
Masses.

τύφη σι-  
τώδης

grano multiplici, tunica velato atq; leuifsi-  
mo, radice numerosa, tritico perquam simi-  
lis traditur, & in id quoq; mutari si pista se-  
ratur, nec protinus, sed anno tertio.

πιθὺμαλ-  
λοι.

Espurge.

Reueille  
matin.

χαρῶν

μυρσιν-  
οειδής.

παράλιος

T I T H Y M A L I genera septem, quo-  
rū masculus characias appellatur, ab aliqui-  
bus amygdaloides. Alter myrtites, qui foemi-  
na existimatur, cūmque myrsiniten, aut ca-  
ryiten vocant. Tertius, paralius, quem tithy-  
malida appellarunt. Alius, helioscopius.  
Quintus, cyparissias. Sextus, dendroides.  
Septimus, platyphyllos dicitur. Characiæ  
caules supra cubiti altitudinem attolluntur,  
rubri, lacteo succo atque acri madentes: fo-  
liis oleæ circum ramos, angustioribus, & lon-  
gioribus: radice crassa, lignosa. pendet in  
cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua  
caueolæ foliolis balnearum similes, in qui-  
bus semen continetur. nascitur in asperis &  
montibus. Foemina, quam myrsiniten,  
aut caryiten vocarunt, similis suapte natura  
daphnoidi: foliis myrti, sed maioribus, fir-  
mis, in cacumine acutis, & pungētibus: ramu-  
los ab radice mittit dodrantaes. fructum fert  
alternis annis nuci similem, mordaci gustu.  
nascitur in asperis. Aliud tithymali genus di-  
citur paralius, quem tithymalida, aut meco-  
na aliqui appellauēre. nascitur in maritimis,  
ramis subrubentibus, palmū altis, quinis se-  
nīsve à radice exeūtib; foliis lini, angustis,

paruis, oblongis, in versus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semen, ut eruum, vario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget, similes ad usus reconditur. Heliosco- *ἡλίσκος* pius dicitur, foliis potulacæ, tenuioribus, rotundioribusque: ramulis, prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitulis incluso. Helioscopi nomē accepit, quoniam comas cum sole circumagat. circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus semenque, ut aliorum. Eadem quæ superioribus vires, non tamen usque, adeo validæ.

Cyparissias in caulem exit dodrantalem, *κυπαρισσας* vel maiorem, subrubrum: ex quo folia piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & in totum nascentē piceam æmulatur, unde nomen traxit. candido succo madet, cui eadem vis quæ superioribus.

In petris nascens, dendroides cognominatur, ampliter opacat. in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo pregnans, canaliculis rubentibus: foliis myrti tenuioris: fructu characiæ. Eiusdem effectus, cuius superiores, similique modo reconditur. *πιτροφύης, δινδρος, δής.*

Platyphyllos, verbasco similis est. Radix, *πλατύφυλλος* succus & folia per inferna trahunt aquas. Pifces necat, tusus, & aquæ inspersus. Reli-

qua tithymalorum genera quę suprà scribuntur, idem efficiunt. Aegineta, Tithymali omnes cal. 4. acrimonię, & validę amaritudinis participes, sed radix quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta dentium erosorum dolores finit. Liquores vehemētiore donati virtute dentium cauis imponuntur, reliquū corpus si attingant, adurunt. Quare etiā pilos modicē delitos auferunt, item myrmecias, verrucas, & huius generis alia. Cutis labe abstergunt, maligna vlcera phagedenica curant. Cæterum ex septenario ipsorum numero validissimi sunt appellati, characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur. hos sequitur qui verbasco similis est, & cyparissias, deinde paralius, quasi dicas maritimus, postremo helioscopius.

τραγάκη  
& αἶθα.

TRAGACANTHAE radix lata & lignosa, summo cespite nititur, vnde furculos humiles, robustos, latissimē fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquā tenuia exoriuntur, quę sub se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiamnum tragacantha, lachryma quę vulnerata radice manans, concrevit. Præstat pellucens, gracilis, lævis, syncera & subdulcis. Aegineta, Tragacantha per similes gummi representat.

τραγίον

TRAGIVM nascitur in creta tantum insula, lentisco semine, folio & ramis simile, singulis tamen minoribus. succus ei lacteus,

gummi non dissimilis. Est & alterū tragiū, Bursa pā quod tragoceros aliqui vocant, folia scolofloris esse pendrii habet, & radicem sylvestris rapha videtur ni, tenuem, candidam. Aeg. Tragiū cal. 3. attrahit, discutit, cum tenui substantia. Aculos igitur educit, calculos comminuit, mensesq; citat instar denarii potum. Sed alterū tragiū hoc minus (lego enim non μικρότρονον, sed μικρότρονον, è Galeno) scolopendrio affimile, nascitur multis in locis, tanta astringendi virtute præditū, vt fluidis affectibus commo- de faciat.

τραγοπό-  
γων.  
Herbape-  
træ.

TRAGOPOGON, id est, hirci barbula. Nascitur in aruis sua sponte. Radice longa, dulci, folio croci, longiore, caule paruo, super quem calyx latus, & barbula quæ summo vertice incana & proluxa funditur, vnde nomen accepit. Herba edendo est, flore luteo. (Quæ vero altius in hortis crescit, folio est latiusculo, flore purpureo. Radices in altū agit, quæ hybernis diebus acetaria dulcedine sua commendant.) (Apud Galenum ladanum quoque ἀπὸ τραγοπόγων vocatur, quia colligitur ab hircorum barbis.) Quantum hirci barbula à senili distet, ex eius in gerontopogone descriptione colligitur.) Aegineta non recē-  
suit. (Est etiam superius descripta in hirci bar-  
bula.)

τραγοπέ-  
γων.

TRAGORIGANVM tenuis frutex est, Mastichi sylvestri serpillio aut origano similis, folio & na.

zamus. quibusdam in locis lætius virentiusque inuenitur, & latioribus foliis, satis glutinosum, alterum exilibus surculis, ac tenuibus foliis, quod aliqui prasium vocauerunt. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Cooque proueniens. Aegineta, Origani virtutes habet, & nonnullam etiam astrictionem.

τραγος  
πώδης.

**T R A G O S** quandam halicæ frugis figuram gerit. multo minus quam zea nutrit, quod multum aceris habeat. quare ægrius conficitur, aluumque magis emollit.

τραγος.

Herb. iū.  
cus mari  
nus

Est etiam herba **T R A G O S**, quam aliqui scorpion aut traganon vocant, maximè in maritimis nascentes, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine foliis, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici acuto cacumine, gustu multum astrigente. (Confer hanc ad scorpionem siue nepam Plinii, supra nobis commemoratam, & eandem existimabis.)

τριβλος.

Chaulce  
treppeou  
calcetrep  
pe.

Trenfle,  
ou cha-  
staignes  
aquati-  
ques.

**T R I B V L I** genus vnum terrestre, foliis ad effigiem portulacæ, tenuioribus viticulis, in terra stratis. spinis secundum folia rigidis, præduris. iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam excrit, aculeos condens: foliis latis, & pediculo longo. caule parte summa quam ima crassiori. capillamenta quædam indidem exorta spicantur. semen

durum, ab altero non abhorrēs. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos sagināt, & ē dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt. Aeg. Aquaticus mediocriter refrigerat: terrestris autem siccando valentior est, alter etiam humectat leuiter. Vterque contra inflammationum generationes, omnesque influxus cōuenit. Terrestris fructus cum tenuis existat renum calculos conterit. Trichomanes, in fidicula descriptum est.

TRIFOLIUM, Græci, triphyllon, alii τρίφυλλον.  
oxy triphyllon, alii menyantes, alii asphal. λόν.  
cion vocant. frutex supra cubiti altitudinem Treusle.  
attollitur, virgas habens tenues, iunceas & ni herb. tri.  
gras, vnde ramulares enascuntur appendicu. foliū aci.  
læ, in quibus terna singulis germinationibus dū. vulg.  
exeunt folia, loto arbori similia. iis recenter pain de  
enatis rutæ odor inest. vbi autem adoluerūt, cucule  
bitumen olent, florē ædit purpureum, semen offi. alle.  
quadam tenuis latū, subhirsutū, ex altera ex- luya  
tremite exertum, antennę modo corniculū  
gerēs. radix tenuis, longa, valida. Gal. Trifo-  
lium, asphaltiū & oxytriphyllon appellatur,  
ob res quas ei contigisse apparet. Menyāthes  
autem & cnicion haud scio vnde. Vis eius est  
calida & sicca instar bituminis, cuius odorem  
imitatur. Vtrūq; vero præstat abscessu tertio,  
idcōq; laterum ex obstructione dolores po-  
tu iuuat, vrinas ac menses ducit.

τριπό-  
λιον.  
Curbit

**TRIPOLIUM** in marinis nascitur locis, quæ allidit vnda, recedensq; dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio glasti crassiflore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius ut tradunt, flores colorem ter die mutât, mane cãdidi, meridie purpurei, sero punicei cõspiciuntur. radice alba, odorata, calidi gustus. Aeg. Radix eius cal. 3. acris est.

χαμαί-  
δρυσ.  
Chesnet-  
te & serra-  
tula ou-  
german-  
dree

**CHAMAEDRYS** Græcis, aliis chamædrops, Latinis trifago dicitur. sunt qui eam teucrion appellauere, propter eam quã cum teucrion seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. frutex dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Aeg. Cal. sic. 3. Lienes igitur consumit, vrinæ & menstrua elicit, viscerum obstructions expurgat.

τρυῖς.

**TRITICUM** cal. 1. medium inter sic. & humid. nonnihil etiã glutinosum & obstruendi efficax obtinet. Elixum coctu difficile est, & inflationes creat: concoctum tamẽ alimentum præbet valentissimum. in panẽ autem coactũ, minus inflat, minúsq; ægrè concoquitur, vtpote fermenti & salis particeps.

**TUBERA** rotundæ radices sunt, sine caule, sine foliis flauescetes. vere fodiuntur. cruda & cocta eduntur. Aegineta, Terrestris constant substantia cum modica quadam virtute tenui.



**T V S S I L A G I N I** folia sunt maiuscula *θύχιον*,  
quàm hederæ, sex aut septem à radice, subal- offic. &  
bida à terra, supernè virentia, in plures angu herb. vna  
los exeuntia : caulis palmū altus, flos luteus. gula ca  
in vere, flore & caule cōfestim exuitur. inde ballina,  
nonnulli his vacare existimauerūt. radix te- & vulg.  
nuis est & superuacua. nascitur in amœnis & pata equi  
riguis. Aegin. Iuuat tusses suffitu, & recta cer- na.  
uice spirantes. Constat ex calida aquosaque  
substantia.

## V

**V E N E R I S** pecten herba repræ- off. herb.  
sentatur radice candida, colicu rura, ra-  
lis semipedē altis, aut paulo ma stellū ou  
ioribus, foliis pastinacæ, sed tenuioribus, flo falcetum  
re albo, exili, depēdentibus summatim com-  
pluribus rostellis, in mucronem turbinatis,  
& pectinatim inter se disiunctis, inde nomē.  
Radix cum malua tusa, omnia corpori infi-  
xa extrahit.

**HELLEBORVM** album, Latini vera- *ἡλίβο-  
trum* album vocāt, fert folia plantaginis aut *φορ λυ-  
betæ* syluestris similia, sed breuiora, & nigri- *κός*.  
ora, rubescētia: caulem cauum, quadrantālē, verart ou  
tunicis conuolutum cum arescere cœpit. radi ellebore  
cibus nititur multis, tenuibus, ab oblōgo & blanc.  
exiguo capite exeuntibus, ceparum modo  
fibratis. nascitur in montibus & asperis. radi-  
ces messibus colligendæ, Optimum habetur

candidum, friabile, carnosum, modicè exten-  
tum, nec tamen iunci modo mucronatum,  
quod frangēdo puluerem emittit, & tenuem  
habet medullam, gustu non admodum fer-  
uens, neq; saluam subinde ciēs. huiuscemodi  
autem strangulat. primatum Cyrenaicum te-  
net. Galaticum autem & Cappadociū, can-  
didiora & puluere quodā obfita, celerius strā-  
gulatus mouent.

Ἰαίβο-  
ρος μέλας  
Allebore  
noir

HELLEBORVM nigrum, appellatur  
melampodion, quoniam caprarum pastor,  
nomine Melampus, furētes in se Proetidas,  
primus purgasse & sanasse fertur. folia ei viri-  
dia, platani similia, minora, foliis sphondylii  
proxima, subaspera, nigriora, pluribus diui-  
suris incisa: caulis asper: flores purpurei, can-  
didi, racematim cohærentes: semen cnici,  
quod in Anticyra sesamoides vocāt: quo de-  
iectiones moliūtur. radicibus coheret nigris,  
tenuibus, à capitulo cepæ simili confibratis.  
quarum est vsus. in collibus, asperis, & sitien-  
tibus locis enascitur. Optimum est quod ex  
huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Ni-  
grum inibi probatissimū gignitur. Eligi de-  
bet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit  
medulla, acre gustu, feruensque: cuiusmodi  
est in Helicone, Parnaso, & Actolia natum.  
attamen Heliconium præcellit. Aegin. Vera-  
trum vtrunque cal. sic. 3. item acre est abster-  
sorium, vnde etiam ad leprosa cutis vitia cō-

uenit. Nigrū vero si fistulis inferatur, tribus diebus callum exerit.

VERBASCUM differentias summas habet duas, hoc nigrum, illud albū. in quo mas & foemina intelligitur. Foeminæ igitur folia sunt brassicæ pilosiora multo, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior: subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallescētes: semen nigrū radix lōga, gustu acerba, crassitudine digiti: nascitur in cāpestribus. Verbasum, qui mas appellatur, oblongius, albis foliis, & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latiorēq; cōstaret folio. Sylvestre, folia fert saluē, altas virgas & lignosas, & circa eas ramulos quales marrubiū: flores luteos, auri æmulos. Sunt & phlomides duæ, hirsutæ, rotundis foliis humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab aliis autem thryallis, foliis ternis aut quaternis, vel paulò pluribus, asperis, crassis, pinguibusq;: apta ad lucernarum lumina. Acg. Verbasci genera plura sunt, inter quæ est & dicta thryallis. Cæterum folia omnium siccātem & mediocriter astrictoriam vim referunt, præcipuè eius quod aurei coloris est, & acerbū: fluidis conferunt affectibus. nonnulli & dentes eis colluunt.

VERBENACA. vide Peristereon.

VERBENACAE genus alterum. vide Sacra herba.

VIBURNI mentionem fecit Virgilius,  
Quantum lenta solent inter viburna cu-  
pressi.

V I O L A flaminea in Scopa regia con-  
tingitur.

Ἰονμέλαν V I O L A purpurea foliū habet hedera mi-  
Violette nus, tenuius ac nigrius, nec multo dissimile.  
de mars cauliculus à radice medius prodit, in quo flo-  
sculus, suauiter olens, purpureus. opacis & a-  
speris nascitur. Aeg. Violæ folia aquea frigi-  
dāque substantia præpollenti constant.

Ἰξός. V I S C U M optimum est recens, intus por-  
Du gluy raceum, extrà fuluum, quod asperi nihil, aut  
furfurosi conceperit. Fit acinis in robore na-  
scentibus, buxco fruticis folio. contusum aci-  
num lauant, & postea in aqua decoquūt. sunt  
qui commanducando ipsum efficiant. gigni-  
tur quoque in malo, pyro & plerisq; aliis ar-  
boribus, quin etiam inuenitur in quorūdam  
fruticum radicibus. Aegineta. Calefacit cum  
acrimonia, humores ex alto validè elicit, &  
thapsiæ modo discutit, hac tamen multo est  
ignauius.

ἄγνος. V I T E X, siue lygos, frutex est in arbore  
Herb. assurgēs, nascitur in fluminum ripis, asperis-  
agnus ca que locis, ac torrentium alueis. ramos gerit  
stus. prælongos, fractu peruicaces: folia oliuæ, sed  
molliora. Duo genera eius. vna harū album  
florem mittit, cum purpureo: altera tantum  
purpureum, & semen, vt piper. Aegin. Agnus

calcfacit, fccat tertio. Subftantia tenuis eft, eoque flatus abolet. Ad caftitatem conſeruãdam conferre creditur, non modò com mandatus potùſque, verumetiã in cubile ſubſtratus. Semen ipſius iccori lienique obſtruetis ſuccurrit. Fructus vitex minus inflat, & facile digeritur.

VITEM albam aliqui bryoniam vocãt. ἄμπιλος. Folis, viticulis, pampinisque, fatiuam vitem λιωνή. imitatur, ſed hirsutiora ſunt omnia. ea quos offic. & prope ſe naſta ſit frutices, ſuis clauiculis com herb. bry plectitur. fructus rubẽs in vua dependet, quo onia & vi coria pilis ſpoliantur. Ex ea aſparagi, qui pri tis alba. ma germinatione exeũt, decocti in cibo, al- vulgo uum & vrinam ciẽt. Succus ẽ radice vere ex- coulcu- primitur. Aegin. Appellãt & pſilothrum. ger uree. mina ſanẽ ceu ſtomacho grata eduntur, vri- nãq; ciendã ſunt. radix abſtergit, tenuis na- turã, mediocriter calida, vnde fit vt lienes e- tiam potu conſumat, extrinſecus autem cum ficis illita ſcabiei & leprã medetur.

Nigra vitis, quam aliqui nigrã bryoniam ἄμπιλος vocant, folia fert hederã, ſed maiora, ſmila- μέλαινα- ceis proxima: caules etiam cognatos. capreo- Tamarũ lis ſuis arbores, quaſi adminicula, comprehẽ- ou hou- dit. fructus racematim coherẽt, qui inter prin blon cipia virent, & poſt maturitatem nigreſcunt. radix foris nigra, intus buxco colore nĩter. viticulã, quã primo germinum partu erum- punt, in olera recipiuntur. Aegin. Hęc etiam

bryonia appellatur:superiori confimilis est,  
sed inefficacior.

ἄμπιλος

ἀγρία.

Vigne

faulUAGE

viORNE ou

hardie

V I T I S syluestris sarmenta vitis modo  
praelonga emittit,aspera,lignosa,rimoso cor  
tice,folius hortensis solani,longioribus ac la  
tioribus:muscoflo flore,&capillaceo,fructu  
exiguus vuis simili,post maturitatem rubēte.  
rotunda est acinorum facies. Enascētes viti  
culæ cibi gratia sale cōdiuntur.

ἄμπιλος

V I T I S fatiux facultas respondet sylue  
stri,sed imbecillior est.

πτελιά.

Orme.

V L M V S ficcare valet,&abstergere,vul  
nera glutinare:præcipuè cortex,si recens fa  
sciolæ modò vulneribus circūdetur: idem cū  
aceto lepras tollit. Ossa fracta radicū deco  
cto perfusa,solidantur.

κοτυλη

δών.

offi.Vm.

bilicus

veneris

κοτυλη

δώνιτέ

ρα.

C O T Y L E D O N, siue vmbilicus Veneris  
folio est in acetabuli formā tornato, inui  
denter cōcauo, breui in medio cauliculo, in  
quo semen inest:radice oliuæ modo rotūda.

Est & alterum genus eiusdem,cymbalion  
aliqui vocant,pinguibus foliis,latioribus, li  
gularum modo densis,circa radicem mediū  
oculi ambitū describētibus vt in maiore sem  
peruiuo,astringentis gustus:cauliculo tenui,  
in quo flores & semina hyperici: radice ma  
iuscula.Facit eadem quæ semperuiuum. Aeg.  
Refrigerat,repellit,abstergit,& dissipat. fo  
lia ipsius cum radice commāducata calculos  
comminuere,& vrinam ciere creduntur.

DUO V R T I C A E genera. sylueſtris, aſpe- ἄκαλήφρα  
rior, latioribus nigrioribúſque foliis: ſemine Vrtic  
lini, ſed minore. altera non æquè aſpera, mi-  
nuto ſemine. Aeg. Vrticæ & fructus & folia  
tenuem habēt ſubſtantiam, citráque roſionē  
ſiccant, tumores diſcutiunt, abſtergunt, ven-  
trem ſubducunt, mediocriter flatulenta, qua-  
re etiam ad Venerem incitant. (Aeg.

V V A paſſa cōcoquit, aſtringit. leuiter diſ- ἀσαφής  
cutit.

## X

A N T H I V M naſcitur leto & pin Herb. lap  
X gui ſolo & lacubus exiccatis, cau- pa minor  
le cubitali, anguloſo, pingui, pro- aut inuer  
deſcētibz ex eo crebris aliſ. folia atriplicis ha- ſa.  
bet, inſecta, naſturtium odore imitantia: fru-  
ctum grandis oliuæ modo, rotundum, & vt  
platani pilula, ſpinoſum, qui contactu veſti-  
bus adhæreſcit. Aeg. Xanthiū, pharſganiūm- ξάνθιον  
ve fructum fert diſcutientem.

X Y L O N, quem aliqui goſſipion nomi-  
nāt, frutex eſt exiguus, laniger, palmæ folio, ξύλον  
ſimilem barbatae nuci gignens fructū, cuius cottonū  
in exteriori bombyce lanugonetur in linum ou cotton  
candiſſimū molliſſimūmq;. Gignitur & in  
quadam arbore, cuius folia ni maiora eſſent,  
vitium planè poterāt videri, cucurbitis coto-  
nei mali amplitudine, quæ maturitate oſten-  
dūt lanuginis pilas, ex quibus veſtes precio-  
ſo linteo texūt. Theophrast. lanigeras Indiæ

arbores demonstrat mori folio, corpore autē cynorrhodi. foliorum succus medetur infantiū torminibus, semen tussi & pectoris vitiis. oleo eius emaculantur lentigines.

*gveis.*

offic. &  
herb. iris  
fyluestris  
rur. glaiu  
fauluage

X Y R I S, folia habet iridis, latiora & in turbinem mucronata: quorum medio caulis erūpit crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triangulares dependēt, in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis: rotundum, rubrum, acre: radix lōga, geniculata, rufa. Aeg. Xiris. aut xyris, naturæ tenuis est, discussoriæ & extrahentis, ac nimirum ficcatoriæ, præcipue semen, quod & vrinam cit, & lieni indurato medetur.

## Z

*gadvopa*  
offic. &  
med. ze-  
doaria

## Z

A D V R A, aliis ziduara, radix est teres, aristolochiæ nō absimilis, sapore & colore gingiberis. Hāc ad nos India mittit. Cal. sic. 2. Corpus latiore sagina reficit, flatus discutit. graue virus animæ quod aliū, cepa, vel vinum excitauit, abigit. venenatis moribus opitulatur. Crassiorē ventris spiritū digerit: aluū retinet, abscessus vteri soluit: vomitiones cohibet, & colicos mulcet cruciatus (Nunc ferè nostræ ætatis medici cōtra pestilentis cœli contagia vtuntur.

Z A R N A B V M, vel zarnabadium, est Arnabo.

*gax.*

espeltre

Z E A duorū generum est. vna simplex, altera in geminis putaminib⁹ grana bina iun-



Etā gerit. ob id dicoccos appellat. plus quā  
hordeū alit. ori grata. digeritur in panificia,  
winus quā triticum alens. Aeg. Zea tritico  
viribus respondet, medium inter calorem &  
siccitatem obtinens, leuiter exiccat, nec non  
obstruit.

ZIZIPHA Pampinius Italiæ primus in-  
uexit, baccis similia quā malis, & intacta  
iam syluæ ascendunt, flore oleæ, sed odorato  
magis, corni baccis simile pomum. Quo am-  
plius & maturius, eo innocentius, cū alioqui  
difficile perficiatur, & lienem offendat. itaq;  
decocto potius vtendum cēsent. Aedescina  
vocant quā grādissima, calore & humore  
temperata, teste Actio: idē sanguinis acri-  
moniam edomant, probum succum creant,  
serosum sanguinis humorem eliciunt. Deco-  
ctum eorum tussim & difficultatem spirandi  
lenit: pectori, renibus vesicæ prodest. Vomi-  
tionem acri concitatam humore sedant. Serica  
ea vocat Galenus, parui succi poma, nec  
concoctioni, nec stomacho facilia. Nanque,  
vt idē testatur, insolentibus & effrenatis pue-  
ris & mulieribus cibi gratia tantum expetun-  
tur, exiguumque præbent alimentum. Ruti-  
lum & album ziziphum probatissimum ad  
apum passionē Columella scripsit.

Σιζιφά  
off. iuu-  
bes ou-  
guindo-  
les.

*[Faint handwritten signature]*

PARISIIS

EXCVDEBAT IOANNES LODOI.

CVS TILITANVS.

M. D. XLI.

℞ Oculi galbani ammoniaci ℥ 3 ℞  
agrostis asperis et galline ℥ 3 ℞  
medicæ scem et vituli ℥ 3 ℞ oleum liliorum  
3 ℞ Lana putrida et teri quatinus possit  
fieri emplastrum scdm artem.

[illegible]

Quæstio, quæ autem est in  
Epistola, de omni et  
lingua, est in partibus.



Ex. resistentis et multificatis  
Ex. idell. gallina amonari in  
asimone insens et gallina in  
medulle seu et dunt in  
oleo silvum in una frigida  
in hoc qd sufficit fiat plus  
frem dunt

Mund vult debne morez que  
Cet yomes si desso estrope dubni  
tampes de une mil en for  
Vingre















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01147 5746

